



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

07 тиждень
(09-15.02.2026)

Дата випуску:
17.02.2026

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 07 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 488,9 на 100 000 населення, що відповідає середньому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 4,9% більше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 242 пацієнти, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 403,0 на 100 000 населення, що на 11,7% менше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстрований 271 пацієнт, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 5,5%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 103 особи, із них 78 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- У 21 області та місті Києві (88%) встановлено циркуляцію вірусів грипу, що свідчить про їх широке географічне поширення на території України.
- Зареєстровано 9 летальних випадків серед пацієнтів із ГРВІ у рутинній системі епідеміологічного нагляду. За результатами лабораторних досліджень у зразках клінічного матеріалу визначено фрагменти РНК вірусів грипу типу А (несубтипований), А(Н3) та SARS-CoV-2. На поточному тижні зареєстровано 1 летальний випадок дитини віком 2 роки з пневмонією, що була зумовлена RS-вірусами.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня 2025 року по 15 лютого 2026 року, на ГРВІ перехворіло 2 539 811 осіб (7,2% від населення країни), що на 4,3% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлений 20 750 випадків захворювання на COVID-19 – 0,8% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 164 випадки.
- Станом на 15 лютого проти грипу вакциновано 78 389 осіб, з них 44 255 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,54% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 07 тиждень 2026 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	2 539 811 7 151,7	168 030 488,9	160 255 466,3	+4,9 %
	із них дітей, інтенсивний показник	1 399 879 21 375,5	85 384 1 357,2	82 203 1 291,5	+5,1 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	76 125 42 256	5 685 3 143	5 660 3 115	+25 вип. +28 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок ГРВІ, в тому числі грипу, із них дітей	52/49 8/3	7/6 1/0	11/10 3/2	-4 вип. -2 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	78 389 44 255	103 78	124 82	-21 осіб -4 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	40 775	2 559	2 378	+181 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	6 248 15,3%	489 19,1%	461 19,4%	+28 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	2 555	157	154	+3 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	1 371 53,7%	109 69,4%	111 72,1%	-2 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	20 750 3 350	225 64	239 84	-14 % -20 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	6 533 1 319	77 15	101 23	-24 вип. -8 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	112, в т.ч. 8 0	2, в т.ч. 0 0	0, в т.ч. 0 0	+2 вип.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (06 тиждень 2026 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру профілактики і контролю захворювань (<https://erviss.org>) середній рівень інтенсивності епідемічного процесу зареєстрований у Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії. В той же час у Білорусії та Молдові зафіксовано низьку інтенсивність епідемічного процесу.

Інформація про широке географічне поширення вірусів грипу надійшла з Білорусії, Молдови, Угорщини та Румунії, тоді як із Польщі та Словаччині повідомлено про регіональне поширення (рис. 1).




Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 06 тиждень 2026 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За даними щотижневих звітів EuroMOMO – Європейської системи моніторингу надлишкової смертності, до якої на 06 тижні 2026 року долучилися 26 країн Європейського регіону, зафіксовано підвищення рівня смертності. Це зростання зумовлене підвищенням смертності в окремих країнах як загалом, так і у вікових групах старше 45 років.

Зокрема, в Португалії (Z-показник 3,64) зареєстровано помірний рівень надлишкової смертності від усіх причин, що може свідчити про вплив інтенсивних епідеміологічних чинників таких як сезонного підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, а також несприятливих погодних факторів.

Низький рівень надлишкової смертності від усіх причин зафіксовано у Бельгії, Данії, Греції, Іспанії, Нідерландах та Німеччині рівень надлишкової смертності оцінюється як низький.

В інших країнах Європейського регіону не зареєстровано перевищення загальної смертності з усіх причин після завершення тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності, пов'язаного з пандемією COVID-19 (рис. 2).




Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи з щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 06 тиждень 2026 року

Слід зазначити, що результати аналізу можуть змінюватися залежно від переліку країн, включених до щотижневого звіту, а також з урахуванням затримок у реєстрації випадків смерті, що є типовим для систем оперативного моніторингу смертності.

¹ Z-показник надлишкової смертності – стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами або регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 07 тиждень 2026 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 168 030 осіб, із них 86 384 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 51,4%.

Кількість зареєстрованих випадків ГРВІ та COVID-19 та померлих від ускладнень у розрізі регіонів наведено в додатку 1.

Найбільша кількість випадків зафіксована у місті Києві (12 290 випадків), Київській (18 335 випадків), Дніпропетровській (15 144 випадки) та Львівській (10 593 випадки) областях. Такий розподіл випадків значною мірою обґрунтовується високою чисельністю та щільністю населення в зазначених територіально-адміністративних одиницях.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 488,9 на 100 000 населення, що відповідає середньому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 4,9% більше аналогічного показника минулого тижня (рис. 3).




Рис. 3. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 07 тиждень 2026 року

Епідемічна ситуація з ГРВІ в Україні залишається неоднорідною за територіальним розподілом, що зумовлено поєднанням демографічних, соціально-побутових, міграційних та зовнішніх чинників. У лютому 2026 року на перебіг епідемічного процесу продовжують впливати наслідки масованих ракетних обстрілів, зокрема перебої з електро- та теплопостачанням, обмежений доступ до належних умов проживання та перебування населення в укриттях і пунктах тимчасового розміщення, що потенційно підвищує вразливість окремих груп населення до респіраторних інфекцій у низці регіонів. Динаміка реєстрації випадків захворювання на ГРВІ та кількості госпіталізованих осіб в розрізі регіонів наведені в додатку 2.

На рисунку 4 представлений розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. Перевищення епідемічного порогу середнього рівня спостерігалось в Волинській, Київській, Полтавській, Рівненській та Хмельницькій областях. В той же час у Закарпатській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях зареєстровано низький рівень. В інших областях України та місті Києві ситуація з епідемічної активності стабільна та відповідає передепідемічному рівню.




Рис. 4. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 07 тиждень 2026 року

З 09 по 15 лютого 2026 року було госпіталізовано 5 685 осіб (3,4% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 3 143 – діти віком до 17 років, що становить 55,3% серед госпіталізованих.

Протягом звітного тижня в системі рутинного епіднагляду зареєстровано 6 летальних випадків внаслідок грипу. Летальні випадки сталися у Львівській (2), Сумській (1) та Хмельницькій (1) областях та місті Києві (2). За результатами лабораторних досліджень виявлено фрагменти РНК вірусів грипу типу А(Н3) та А (не субтипований). Всі померлі не були вакциновані проти грипу до початку епідемічного сезону. Крім того, у Львівській області стався летальний випадок із дитиною віком 2 роки унаслідок пневмонії, спричиненої RS-вірусами.

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епіднагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 225 пацієнтів, які мали позитивні результати тесту на COVID-19, що на 7,1% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,1%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 77 (34,2%) осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Запорізькій області (рис. 5).



Рис. 5. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 07 тиждень 2026 року

Серед дітей віком до 17 років зареєстровано 64 підтверджені випадки COVID-19. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримали 15 дітей віком до 17 років, що становить 19,5% від загальної кількості госпіталізованих осіб із COVID-19.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду, протягом звітного тижня зареєстровані летальні випадки серед дорослих осіб із підтвердженням COVID-19 у Полтавській (1) області та місті Києві (1). Всі померлі не мали щеплень проти COVID-19 упродовж останніх 12 місяців.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 2 559 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 489 (19,1%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 55 (11,3%) випадках встановлено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 07 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	773	6993
Кількість позитивних результатів, (%)	336 43,5%	2033 29,1%
А не субтипований	248	1385
А(Н1)рdm09	3	4
А(Н3)	84	622
В	1	22
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1786	33782
Кількість позитивних результатів, (%)	153 8,6%	4215 12,5%
Парагрип	3	60
Аденовіруси	44	434
RS-віруси	17	107
Риновіруси	16	249
Бокавіруси	5	27
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	3	17
Метапневмовіруси	10	73
SARS-CoV-2	55	3238

При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в місті Києві та 18 областях України визначені фрагменти РНК вірусів грипу типів А та В (табл. 3).

Таблиця 3. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі по областях України за 07 тиждень 2026 року

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)рdm09	Грип А(Н3)	В
Вінницька	1	1			1	
Волинська	15	15	15			
Дніпропетровська	67	67	67			
Житомирська	33	33	28		5	
Закарпатська	2	2	2			
Запорізька	22	22	12		10	
Київська	10	10	4		6	
Миколаївська	9	9	7		2	
Одеська	1	1	1			
Полтавська	18	17	17			1
Рівненська	1	1			1	
Сумська	7	7			7	
Тернопільська	4	4	4			
Харківська	16	16	16			
Херсонська	9	9	9			
Хмельницька	40	40	33		7	
Черкаська	10	10	10			

Чернівецька	2	2	2			
м.Київ	69	69	21	3	45	
Україна	336	335	248	3	84	1

В системі рутинного епіднагляду продовжуються дослідження зразків матеріалів на респіраторну групу інфекцій. На звітному тижні визначені фрагменти РНК RS-вірусів у 7 областях України (табл.4).

Таблиця 4. Визначення RS-вірусів в розподілі по областях України за 07 тиждень 2026 року

Область	Визначено RS-віруси						Усього, осіб
	0 – 4 роки	5 – 14 років	15 – 17 років	18 – 29 років	30 – 64 роки	65 років та старше	
Дніпропетровська	1	0	0	0	2	0	3
Житомирська	1	0	0	0	0	0	1
Запорізька	1	0	1	0	0	0	2
Миколаївська	0	0	0	0	2	0	2
Полтавська	0	0	0	0	1	0	1
Херсонська	1	2	0	0	0	0	3
Хмельницька	3	2	0	0	0	0	5
Україна	7	4	1	0	5	0	17

4. Вакцинація проти грипу

За 07 тиждень 2026 року проти грипу вакциновано 103 особи, зокрема 78 (75,7%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 6).




Рис. 6. Питова вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 07 тиждень 2026 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипоподібними захворюваннями

Дозорний епіднагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 18 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, наданою 15 закладами ПМСД, протягом 07 тижня 2026 року зареєстровано 242 пацієнта, клінічний стан яких відповідав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становив 253,7 на 100 000 населення, що на 11,9% менше порівняно з попереднім тижнем. Серед дітей віком до 17 років рівень захворюваності також зменшився на 13,3% та становив 861,9 на 100 000 населення.

З-поміж 242 пацієнтів із ГПЗ у 77 (31,8%) осіб було відібрано зразки клінічних матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 77 зразків клінічного матеріалу у 54 (70,1%) випадках отримано позитивні результати (табл. 7).

Позитивні результати на визначення фрагментів РНК вірусів грипу типу А отримано з ПМСД 10 дозорних міст (табл. 5).

Таблиця 5. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 07 тиждень 2026 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)pdм09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	3	3			3	
Дніпро	4	4	4			
Запоріжжя	3	3			3	
Львів	4	4	2		2	
Одеса	12	12	12			
Суми	3	3	2		1	
Харків	5	5			5	
Чернівці	1	1	1			
Чернігів	5	5	1		4	
Київ	2	2	1		1	
Україна	42	42	23	0	19	0

У межах дозорного епіднагляду триває дослідження зразків на збудники респіраторних інфекцій. Протягом звітного тижня виявлено фрагменти РНК RS-вірусів в зразку клінічного матеріалу від одного пацієнта з ГПЗ у місті Запоріжжя.

З початку епідемічного сезону від 3 222 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено

1 213 (37,7%) зразків клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 594 (49%) випадках (рис. 7).




Рис. 7. Результати обстеження осіб із ГПІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 07 тиждень 2026 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 18 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстрований 217 пацієнт, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 127 (46,9%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 5,5%.

З-поміж 271 випадка ТГРІ у 86 (31,7%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 80 зразків клінічного матеріалу у 55 (68,8%) випадках отримано позитивні результати (табл. 7).

В 10 дозорних містах України під час дослідження зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ТГРІ, виявлено фрагменти РНК вірусів грипу типу А (табл. 6).

Таблиця 6. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 07 тиждень 2026 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)рdm09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	4	4	4			
Дніпро	1	1	1			
Запоріжжя	6	6			6	
Кропивницький	4	4			4	
Львів	3	3	3			
Одеса	1	1	1			
Рівне	6	6			6	
Харків	8	8			8	
Чернігів	5	5	1		4	
м.Київ	6	6	3		3	
Україна	44	44	13	0	31	0

З початку епідемічного сезону з-поміж 3 961 пацієнта, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 1 342 (33,9%) зразки клінічних матеріалів. Отримано позитивні результати на визначення вірусів респіраторної групи інфекцій в 777 (57,9%) випадках (рис. 8).




Рис. 8. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 07 тиждень 2026 року

Таблиця 7. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 07 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2025/2026		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	77	80	157	1213	1342	2555
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	54 70,1%	55 68,8%	109 69,4%	595 49,1%	779 58,1%	1374 53,8%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	42 77,8%	44 80%	86 78,9%	300 50,5%	318 40,9%	618 45,1%
А, всього	42	44	86	300	317	617
А не субтиповані	23	13	36	191	165	356
А(Н1)pdм09	0	0	0	1	3	4
А(Н3)	19	31	50	108	149	257
В	0	0	0	0	1	1
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	12 22,2%	11 20%	23 21,1%	295 49,7%	461 59,3%	756 55,1%
Парагрип	0	0	0	40	47	87
Аденовіруси	3	5	8	31	130	161
RS-віруси	1	1	2	10	12	22
Риновіруси	2	2	4	94	96	190
Бокавіруси	0	1	1	5	10	15
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	2	0	2	5	1	6
Метапневмовіруси	3	2	5	29	20	49
SARS-CoV-2	1	0	1	41	80	121
Інші респіраторні збудники	0	0	0	40	65	105

Звіт про секвенування (07 тиждень)

З метою подальшого вивчення виявлених вірусів грипу проводиться їх дослідження шляхом повногеномного секвенування.

Станом на 15 лютого 2026 року опрацьовано 594 зразків, відібраних у пацієнтів з діагнозами грип та ГРВІ, які мали позитивний результат при дослідженні методом ПЛР. Всього секвеновано 85 зразків. З них – 72 зразків вірусу грипу, що надійшли з наступних областей: Київської – 10, Рівненської – 10, Чернівецької – 8, Вінницької – 7, Запорізької – 6, Львівської – 5, Харківської – 5, Одеської – 5, Сумської – 4, Житомирської – 3, Хмельницької – 3, Кіровоградської – 1, Волинської – 1 та м. Києва – 4.

Також проведено секвенування щодо 13 зразків, які належать до негрипозних респіраторних вірусів: 3 - аденовірус (AdV) B, 3 - риновірус (HRV) A, 2 - метапневмовірус (MPV), 2 - віруси парагрипу (PIV) 3, 1 - AdV C, 1 - HRV C та 1 - PIV 4.

Результати секвенування штамів вірусів грипу завантажено до Всесвітньої бази даних вірусних геномів GISAID для подальшого епідеміологічного аналізу на глобальному рівні.

Отримані дані свідчать про те, що секвеновані в Україні циркулюючі штами вірусів грипу генетично подібні до референсних штамів, наведених у таблиці 1.

Таблиця 8. Генетична характеристика вірусів грипу

Субтип/лінія	Референс	Клада	Субклада	Кількість
H3N2	A/Croatia/10136RV/2023	3C.2a1b.2a.2a.3a.1	K	34
H3N2	A/Croatia/10136RV/2023	3C.2a1b.2a.2a.3a.1	J.2.2	4
H3N2	A/Croatia/10136RV/2023	3C.2a1b.2a.2a.3a.1	J.2.3	3
H1N1	A/Victoria/4897/2022	6B.1A.5a.2a.1	D.3.1.1	25
H1N1	A/Victoria/4897/2022	6B.1A.5a.2a.1	D.3.1	2
H1N1	A/Victoria/4897/2022	6B.1A.5a.2a.1	-	2
H1N1	A/Victoria/4897/2022	6B.1A.5a.2a.1	C.1	1
B/Victoria	B/Austria/1359417/2021	V1A.3a.2	C.3	1

**Зареєстровані випадки ГРВІ та COVID-19, та померлі від ускладнень у розрізі
регіонів України, 07 тиждень 2026 року**

Регіон	Кількість зареєстрованих випадків, абс.ч.					
	COVID-19			ГРВІ, у т.ч. грип (без COVID-19)		
	Кількість осіб з позитивним результатом тесту на COVID-19	Кількість померлих	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	Випадки за попереднім діагнозом	Кількість померлих	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я
Вінницька	5	0	0	5377	0	0
Волинська	2	0	0	7712	0	0
Дніпропетровська	28	0	0	15116	0	0
Донецька	0	0	0	810	0	0
Житомирська	20	0	0	8255	0	0
Закарпатська	4	0	0	4975	0	0
Запорізька	21	0	0	3933	0	0
Івано-Франківська	6	0	0	4956	0	0
Київська	10	0	0	18325	0	0
Кіровоградська	2	0	0	4328	0	0
Луганська						
Львівська	7	0	0	10586	3	3
Миколаївська	1	0	0	4422	0	0
Одеська	46	0	0	9745	0	0
Полтавська	8	1	1	8592	0	0
Рівненська	3	0	0	9779	0	0
Сумська	4	0	0	4925	1	1
Тернопільська	1	0	0	4727	0	0
Харківська	11	0	0	4652	0	0
Херсонська	0	0	0	360	0	0
Хмельницька	3	0	0	8524	1	1
Черкаська	3	0	0	6894	0	0
Чернівецька	15	0	0	3877	0	0
Чернігівська	1	0	0	4669	0	0
м. Київ	24	1	1	12266	2	2
Україна	225	2	2	167805	7	7

Динаміка реєстрації випадків захворювання на ГРВІ та кількості госпіталізацій в розрізі регіонів України,
40 тиждень 2025 – 07 тиждень 2026 років

