



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

43 тиждень

(19-25.10.2026)

Дата випуску:
27.10.2026

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 43 тиждень по Україні

- Упродовж 43 тижня 2026 року в Україні зареєстровано 109 202 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), із них 61,2% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник становив 317,7 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню (табл. 1).
- Протягом звітного тижня госпіталізовано 2 042 особи, що становить 1,9 % від усіх зареєстрованих випадків ГРВІ. Переважну частку госпіталізованих становили діти (62,2 %).
- У межах дозорного епідеміологічного нагляду зареєстровано 125 випадків грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 104 випадки тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). Частка пацієнтів із ТГРІ становила 2,1 % від загальної кількості госпіталізованих у дозорних лікарнях.
- У Рівненській області в межах рутинного епідеміологічного нагляду визначено віруси грипу типу А не субтипований, спорадичне географічне поширення вірусів грипу в Україні продовжується.
- Серед ідентифікованих респіраторних вірусів у рутинній системі епіднагляду переважали SARS-CoV-2, тоді як у дозорній – найчастіше виявляли риновіруси.
- Летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.

Епідемічна ситуація щодо респіраторних вірусів в Європейському регіоні (42 тиждень 2026 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру профілактики і контролю захворювань (<https://erviss.org>) на 42-му тижні 2026 року в Європейському регіоні ВООЗ не спостерігалось ознак епідемічного підйому грипу, хоча в окремих країнах за результатами дозорного епідеміологічного нагляду на рівні первинної медичної допомоги вже реєструвався встановлений у системі ERVISS 10% поріг позитивності (Північна Ірландія - 13%, Данія та Ірландія - по 12%, Уельс - 10%). У структурі типованих вірусів грипу переважали віруси типу А (90%). Серед субтипваних вірусів грипу А домінував А(Н1)pdм09 (89%), тоді як частка А(Н3) становила 11%.

Циркуляція SARS-CoV-2 залишалася більш вираженою порівняно з іншими респіраторними вірусами. Частка позитивних результатів тестування серед пацієнтів із ГПЗ становила 12%, що відповідало показнику попереднього тижня. За даними дозорного нагляду за ТГРІ, позитивність тестування на SARS-CoV-2 зросла з 8% до 11%. Найбільше значення SARS-CoV-2 для тяжких форм респіраторних захворювань відзначалося серед осіб віком 65 років і старше.

За даними щотижневих звітів EuroMOMO – Європейської системи моніторингу надлишкової смертності, рівень смертності від усіх причин у 27 країнах та субнаціональних регіонах Європи, що надали дані, залишався на очікуваних рівнях у всіх вікових групах. Ознак надлишкової загальної смертності на регіональному рівні не виявлено.

Таблиця 1. Основні показники за 43 тиждень 2026 року та з початку епідемічного сезону, Україна

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ, всього					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	416 645 1 211,4	109 202 317,7	106 384 309,5	+ 2,6%
	із них дітей, інтенсивний показник	254 495 3 965,7	66 818 1 047,1	64 684 1 013,7	+ 3,3%
2	Госпіталізовано, із них дітей	7 650 4 745	2 042 1 270	2 043 1 229	- 1 вип. +41 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок ГРВІ, із них дітей	1 0	0 0	1 0	-1 вип. 0
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	0 0	0 0	0 0	
в тому числі COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	316 60	99 20	92 16	+ 7,4% + 24%
2	Госпіталізовано, із них дітей	161 21	46 8	54 8	-8 вип. 0 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19, із них дітей	1 0	0 0	1 0	-1 вип. 0
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	2 709	618	689	-71 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	293 10,8%	65 10,5%	88 12,8%	-23 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	459	104	117	-13 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	124 27%	29 27,9%	28 23,9%	+1 досл.

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції

Дані рутинного епідеміологічного нагляду за 43 тиждень 2026 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Інтенсивний показник захворюваності розраховано на основі загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ, включно з грипом, COVID-19 та іншими ГРВІ, зумовленими аденовірусами, риновірусами, вірусами парагрипу та іншими респіраторними вірусами.

Упродовж звітного тижня зареєстровано 109 202 випадки ГРВІ, із них 66 818 – серед дітей віком до 17 років. Частка дітей у загальній структурі захворюваності становила 61,2%.

Інтенсивний показник захворюваності становив 317,7 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності епідемічного процесу, визначеному для України. Порівняно з попереднім тижнем показник зріс на 2,6%.

Протягом звітного тижня лабораторно підтверджено 99 випадків COVID-19, зокрема 20 серед дітей. Частка підтверджених випадків COVID-19 у загальній кількості зареєстрованих випадків ГРВІ становила близько 0,09%.

За результатами оцінки інтенсивності епідемічного процесу перевищення епідемічного порогу на національному рівні не зареєстровано (рис. 1).




Рис. 1. Динаміка захворюваності на грип і ГРВІ та епідемічний поріг, сезони 2024/2025 – 2026/2027

За результатами регіонального аналізу ознак високої або дуже високої інтенсивності епідемічного процесу не виявлено (рис. 2).



Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 43 тиждень 2026 року

Упродовж 19 - 25 жовтня госпіталізовано 2 042 пацієнта з ГРВІ, що становить 1,9% від загальної кількості зареєстрованих випадків. Серед госпіталізованих 1 270 (62,2%) – діти віком до 17 років.

Загальна кількість зареєстрованих випадків ГРВІ, померлих від ускладнень, динаміка реєстрації випадків ГРВІ і госпіталізацій у розрізі регіонів наведені у додатках 1, 2. Летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.

2. Лабораторний моніторинг у системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

Упродовж 43 тижня 2026 року досліджено зразки клінічного матеріалу від 618 пацієнтів. Віруси респіраторної групи виявлено у 65 (10,5%) обстежених (табл. 2).

На віруси грипу обстежено 113 осіб. При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в Рівненській області визначені фрагменти РНК вірусів грипу типів А не субтипований (табл. 2).

Серед інших респіраторних вірусів найчастіше ідентифікували SARS-CoV-2 (28), риновіруси та парагрипу (по 15).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 43 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	113	468
Кількість позитивних результатів, (%)	1 0,9%	2 0,4%
А не субтипований	1	2
А(Н1)рdm09	0	0
А(Н3)	0	0
В	0	0
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	505	2 241
Кількість позитивних результатів, (%)	64 12,7%	291 13%

Парагрип	15	41
Аденовіруси	6	32
RS-віруси	0	0
Риновіруси	15	87
Бокавіруси	0	3
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0
Метапневмовіруси	0	1
SARS-CoV-2	28	127

Звіт про секвенування (41 тиждень)

З метою подальшого вивчення виявлених респіраторних вірусів проводиться їх дослідження шляхом повногеномного секвенування.

Станом на 26.10.2026 року опрацьовано 79 зразків, відібраних у пацієнтів з діагнозами грип та ГРВІ, які мали позитивний результат при дослідженні методом ПЛР. Всього секвеновано 30 зразків, які належать до негрипозних респіраторних вірусів: 15 – аденовірус (AdV) B, 8 – HRV A, 4 – SARS-CoV-2 ХНА, 2 – HRV B, 1 – RSV A.

Результати секвенування штаму RSV завантажено до всесвітньої бази даних вірусних геномів GISAID для подальшого епідеміологічного аналізу на глобальному рівні.

За результатами секвенування в Україні вперше виявили варіант коронавірусу SARS-CoV-2 P.2.1, зразок було відібрано від хворого у місті Києві. P.2.1 — це високомутований варіант, що походить від лінії MC.10.1.7, спорідненої з JN.1. Вперше його виявили у травні 2026 року в провінції Онтаріо (Канада), після чого він поширився в інших країнах, зокрема у США, Іспанії та Сінгапурі.

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ здійснюється у 12 регіонах України (м.м. Київ, Суми, Чернігів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса, Львів, Рівне, Чернівці, Кропивницький та Вінниця). До мережі дозорного нагляду входять 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 18 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

1. Грипоподібні захворювання

Упродовж 43 тижня в дозорних закладах ПМСД зареєстровано 125 випадків ГПЗ. Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зменшився на 19%. Серед дітей віком до 17 років показник захворюваності зменшився на 37,2% і становив 431,6 на 100 000 населення, серед дорослого населення показник становив 138,5 на 100 000 населення, що на 8,8% більше минулого тижня.

Зразки клінічних матеріалів для ПЛР-дослідження відібрано у 49 (39,2%) пацієнтів із ГПЗ. За результатами лабораторного дослідження 49 зразків у 14 (28,6%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3). Результати досліджень свідчать, що на початку сезону в циркуляції респіраторних вірусів продовжують домінувати риновіруси.

З початку епідемічного сезону від 571 пацієнта із ГПЗ лабораторно досліджено 235 (41,2%) зразків клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 66 (28,1%) випадках (рис. 3).




Рис. 3. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 43 тиждень 2026 року

2. Тяжка гостра респіраторна інфекція

У 18 дозорних лікарнях протягом звітного тижня зареєстровано 104 випадки ТГРІ, із них 42 (40,4%) – серед дітей віком до 17 років. Частка ТГРІ серед усіх госпіталізацій у дозорних лікарнях становила 2,1%. Летальних випадків серед пацієнтів із ТГРІ не зареєстровано.

Зразки клінічних матеріалів відібрано у 58 (55,8%) пацієнтів із ТГРІ. За результатами лабораторного дослідження 55 зразків у 15 (27,3%) випадках отримано позитивні результати серед яких визначено лише віруси респіраторної групи інфекцій (табл. 3).

З початку епідемічного сезону з-поміж 406 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 224 (55,2%) зразки клінічних матеріалів. Отримано позитивні результати на визначення вірусів респіраторної групи інфекцій в 58 (25,9%) випадках (рис. 4).




Рис. 4. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 43 тиждень 2026 року

Таблиця 3. Результати лабораторних досліджень зразків матеріалів із дозорних лікарень, 43 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2026/2027		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	49	55	104	235	224	459
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	14 28,6%	15 27,3%	29 27,9%	66 28,1%	58 25,9%	124 27%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
А, всього	0	0	0	0	0	0
А не субтиповані	0	0	0	0	0	0
А(Н1)рdm09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	14 100%	15 100%	29 100%	66 100%	58 100%	124 100%
Парагрип	2	4	6	7	8	15
Аденовіруси	1	1	2	5	15	20
RS-віруси	0	0	0	0	0	0
Риновіруси	7	9	16	47	31	78
Бокавіруси	1	0	1	2	1	3
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0	0	0	0
SARS-CoV-2	3	1	4	5	2	7
Інші респіраторні збудники	0	0	0	0	1	1

Загальна оцінка епідемічної ситуації

За результатами 43-го тижня 2026 року епідемічна ситуація щодо ГРВІ в Україні залишається стабільною, захворюваність перебуває на фоновому рівні, перевищення епідемічного порогу на національному рівні не зареєстровано. Порівняно з попереднім тижнем інтенсивний показник захворюваності зріс на 2,6%. Активність вірусів грипу залишається низькою: у системі рутинного епідеміологічного нагляду лабораторно підтверджено один випадок грипу А без визначення субтипу.

Водночас потребує уваги циркуляція SARS-CoV-2 та зростання захворюваності на COVID-19. Доцільно продовжувати моніторинг динаміки захворюваності на ГРВІ, циркуляції респіраторних вірусів, зокрема SARS-CoV-2, та своєчасно оцінювати можливі зміни епідемічної ситуації.

**Кількість зареєстрованих випадків ГРВІ та COVID-19 і померлих від ускладнень
у розрізі регіонів України, 43 тиждень 2026 року**

	COVID-19				ГРВІ, у т.ч. грип (без COVID-19)			
	Кількість осіб з позитивним результатом тесту на COVID-19	Кількість померлих			Випадки за попереднім діагнозом	Кількість померлих		
		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років
Вінницька	1				4637			
Волинська					3729			
Дніпропетровська	3				8294			
Донецька					342			
Житомирська	23				6616			
Закарпатська	1				3118			
Запорізька	1				2306			
Івано-Франківська	22				4695			
Київська	3				9206			
Кіровоградська					2916			
Луганська					0			
Львівська	2				10134			
Миколаївська					3324			
Одеська	5				6373			
Полтавська	11				5536			
Рівненська					4300			
Сумська					3420			
Тернопільська	2				3953			
Харківська	2				2585			
Херсонська					145			
Хмельницька	11				5216			
Черкаська	2				4146			
Чернівецька					3357			
Чернігівська	1				3194			
м. Київ	9				7561			
Україна	99	0	0	0	109103	0	0	0

**Реєстрація випадків захворювання на ГРВІ та кількості госпіталізацій в розрізі регіонів України,
43 тиждень 2026 року**

Регіон	Динаміка реєстрації випадків ГРВІ, абс.ч.	Динаміка госпіталізації пацієнтів із ГРВІ, абс.ч.
Вінницька		
Волинська		
Дніпропетровська		
Донецька		
Житомирська		
Закарпатська		
Запорізька		
Івано-Франківська		
Київська		
Кіровоградська		
Луганська		
Львівська		
м. Київ		
Миколаївська		
Одеська		
Полтавська		
Рівненська		
Сумська		
Тернопільська		
Харківська		
Херсонська		
Хмельницька		
Черкаська		
Чернівецька		
Чернігівська		
Україна, всього		