



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

05 тиждень

(26.01-01.02.2026)

Дата випуску:
03.02.2026

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 05 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 410,6 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 10,6% більше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 248 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 432,7 на 100 000 населення, що на 34,7% більше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 305 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 5,9%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 240 осіб, із них 169 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- У 19 областях та місті Києві (80%) встановлено циркуляцію вірусів грипу, що свідчить про їх широке географічне поширення на території України.
- Зареєстровано 6 летальних випадків серед пацієнтів із підозрою на грип, з яких 5 випадків сталося в рутинної та 1 – у системі дозорного епідеміологічного нагляду. За результатами лабораторних досліджень у зразках клінічного матеріалу визначено фрагменти РНК вірусів грипу типу А (несубтипований) та А(Н3). На поточному тижні зареєстровано 1 летальний випадок особи із пневмонією, що була зумовлена аденовірусами.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня 2025 року по 01 лютого 2026 року, на ГРВІ перехворіла 2 211 526 осіб (6,2% від населення країни), що на 7,3% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлений 20 286 випадків захворювання на COVID-19 – 1,0% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 144 випадки.
- Станом на 01 лютого проти грипу вакциновано 78 162 особи, з них 44 095 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,54% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 05 тиждень 2026 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	2 211 526 6 227,3	141 127 410,6	127 141 369,9	+10,6 %
	із них дітей, інтенсивний показник	1 231 292 18 801,3	70 199 1 102,9	59 098 928,5	+17,9 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	64 780 35 998	5 479 3 096	4718 2391	+761 вип. +705 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок ГРВІ, в тому числі грипу, із них дітей	34/33 4	7/6 0	11 2	-4 вип. -2 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	78 162 44 095	240 169	1312 506	-1 072 особи -337 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	35 628	3 124	2 272	+852 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	5 262 14,8%	519 16,6%	446 19,6%	+73 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	2 238	175	149	+26 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	1 147 51,3%	129 73,7%	95 63,8%	+34 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	20 286 3 202	208 36	234 36	-9 % 0 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	6 355 1 281	120 25	131 26	-11 вип. -1 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	110, в т.ч. 8 0	0, в т.ч. 0 0	10, в т.ч. 0 0	-10 вип.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (04 тиждень 2026 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру профілактики і контролю захворювань (<https://erviss.org>) високий рівень інтенсивності епідемічного процесу зареєстрований у Білорусі. В той же час у Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині зафіксовано середню інтенсивність епідемічного процесу. З Молдови повідомлено про низьку інтенсивність.

Інформація про широке географічне поширення вірусів грипу надійшла з Білорусі, Молдови, Угорщини та Румунії, тоді як із Польщі повідомлено про регіональне поширення. Локальне географічне поширення вірусів грипу зареєстровано у Словаччині (рис. 1).




Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 04 тиждень 2026 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За даними щотижневих звітів EuroMOMO – Європейської системи моніторингу надлишкової смертності, до якої на 04 тижні 2026 року долучилися 26 країн Європейського регіону, зафіксовано підвищення рівня смертності. Це зростання зумовлене підвищенням смертності в окремих країнах серед осіб віком 65 років і старше.

Зокрема, у Франції зареєстровано високий рівень надлишкової смертності (Z-показник = 8,6), що є нетиповим для цього періоду року та може свідчити про вплив інтенсивних епідеміологічних чинників таких як сезонного підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, а також несприятливих погодних факторів.

У Іспанії, Італії та Португалії зафіксовано помірний рівень надлишкової смертності від усіх причин, тоді як у Бельгії, Греції, Нідерландах та Швейцарії рівень надлишкової смертності оцінюється як низький.

В інших країнах Європейського регіону не зареєстровано перевищення загальної смертності з усіх причин після завершення тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності, пов'язаного з пандемією COVID-19 (рис. 2).




Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи з щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 04 тиждень 2026 року

Слід зазначити, що результати аналізу можуть змінюватися залежно від переліку країн, включених до щотижневого звіту, а також з урахуванням затримок у реєстрації випадків смерті, що є типовим для систем оперативного моніторингу смертності.

¹ Z-показник надлишкової смертності – стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами або регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 05 тиждень 2026 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 141 127 осіб, із них 70 199 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 49,7%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 410,6 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 10,6% більше аналогічного показника минулого тижня (рис. 3).




Рис. 3. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 05 тиждень 2026 року

Епідемічна ситуація з ГРВІ в Україні залишається неоднорідною за територіальним розподілом, що зумовлено поєднанням демографічних, соціально-побутових та зовнішніх чинників. У січні 2026 року додатковий вплив на перебіг епідемічного процесу мали наслідки масованих ракетних обстрілів, зокрема перебої з електро- та теплопостачанням, що потенційно підвищувало вразливість населення до респіраторних інфекцій у низці регіонів. Особливості динаміки реєстрації випадків захворюваності на ГРВІ та кількості госпіталізованих наведені в додатку 1.

На рисунку 4 представлений розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. У всіх регіонах країни епідемічна ситуація залишається стабільною та відповідає передепідемічному (фоновому) рівню. Найвищий інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ зафіксовано у Київській області – 730,1 на 100 000 населення.




Рис. 4. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 05 тиждень 2026 року

З 26 січня по 01 лютого 2026 року було госпіталізовано 5 479 осіб (3,9% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 3 096 – діти віком до 17 років, що становить 56,5% серед госпіталізованих.

Протягом звітного тижня в системі рутинного епідеміологічного нагляду зареєстровано 5 летальних випадків, пов'язаних із грипом. Випадки сталися у Львівській (3) та Харківській (1) областях та місті Києві (1). За результатами лабораторних досліджень виявлено фрагменти РНК вірусу грипу типу А(Н3) та А (не субтипований). Всі померлі не були вакциновані проти грипу до початку епідемічного сезону. Крім того, в Черкаській області стався летальний випадок внаслідок пневмонії, зумовленої аденовірусами.

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 208 пацієнтів, які мали позитивні результати тесту на COVID-19, що на 9% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,1%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізована 120 (57,7%) осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Херсонській області (рис. 5).



Рис. 5. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 05 тиждень 2026 року

Другий тиждень поспіль серед дітей віком до 17 років зареєстровано 36 підтверджених випадків COVID-19. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримали 25 дітей віком до 17 років, що становить 20,8% від загальної кількості госпіталізованих осіб із COVID-19 та 69,4% від усіх зареєстрованих випадків серед дітей. Четверо дітей віком до 14 років перебували на лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня летальних випадків не зареєстровано.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 3 124 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 519 (16,6%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 81 (16,6%) випадках встановлено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 05 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	954	5 480
Кількість позитивних результатів, (%)	367 35,5%	1 306 23,8%
А не субтипований	253	828
А(Н1)pdм09	0	1
А(Н3)	114	456
В	0	21
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	2 170	30 148
Кількість позитивних результатів, (%)	152 7%	3 956 13,1%
Парагрип	0	53
Аденовіруси	36	373
RS-віруси	23	75
Риновіруси	8	224
Бокавіруси	1	30
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	1	12
Метапневмовіруси	2	54
SARS-CoV-2	81	3 135

При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в місті Києві та 16 областях України визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А та В (табл. 3).

Таблиця 3. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі по областях України за 05 тиждень 2026 року

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)рdm09	Грип А(Н3)	В
Вінницька	6	6			6	
Волинська	12	12	6		6	
Дніпропетровська	58	58	38		20	
Житомирська	53	53	45		8	
Запорізька	20	20	15		5	
Київська	5	5	5			
Львівська	7	7	5		2	
Миколаївська	8	8	8			
Одеська	53	53	43		10	
Полтавська	25	25	12		13	
Сумська	1	1	1			
Харківська	18	18	18			
Херсонська	10	10	9		1	
Хмельницька	24	24	24			
Черкаська	18	18	18			
Чернівецька	1	1	1			
м.Київ	48	48	5		43	
Україна	367	367	253	0	114	

В системі рутинного епіднагляду продовжуються дослідження зразків матеріалів на респіраторну групу інфекцій. На звітному тижні визначені фрагменти РНК RS-вірусів у 9 областях України (табл.4).

Таблиця 4. Визначення RS-вірусів в розподілі по областях України за 05 тиждень 2026 року

Область	Визначено RS-віруси						
	0 – 4 роки	5 – 14 років	15 – 17 років	18 – 29 років	30 – 64 роки	65 років та старше	Усього, осіб
Вінницька	2	0	0	0	0	0	2
Дніпропетровська	0	0	0	0	2	2	4
Запорізька	0	1	0	0	0	0	1
Львівська	0	1	0	0	0	0	1
Миколаївськ	0	0	0	0	1	0	1
Одеська	2	0	0	0	2	3	7
Полтавська	0	0	0	0	0	1	1
Херсонська	2	0	0	0	0	0	2
Черкаська	0	0	0	0	3	1	4
Україна	6	2	0	0	8	7	23

4. Вакцинація проти грипу

За 05 тиждень 2026 року проти грипу вакциновано 240 осіб, зокрема 169 (70,4%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 6).




Рис. 6. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 05 тиждень 2026 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епідгляд за грипозоподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 18 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, наданою 15 закладами ПМСД, протягом 05 тижня 2026 року зареєстровано 248 пацієнтів, клінічний стан яких відповідав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становив 281,1 на 100 000 населення, що на 15,1% більше порівняно з попереднім тижнем. Навпаки, серед дітей віком до 17 років рівень захворюваності збільшився на 64,5% та становив 906,1 на 100 000 населення.

З-поміж 248 пацієнтів із ГПЗ у 88 (35,5%) осіб було відібрано зразки клінічних матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 86 зразків клінічного матеріалу у 63 (73,3%) випадках отримано позитивні результати (табл. 7).

Позитивні результати на визначення фрагментів РНК вірусів грипу типу А отримано із ПМСД 11 дозорних міст (табл. 5).

Таблиця 5. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 05 тиждень 2026 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)pdм09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	7	7			7	
Дніпро	4	4	4			
Запоріжжя	8	8	1		7	
Львів	4	4	4			
Одеса	9	9	9			
Рівне	2	2			2	
Суми	5	5	5			
Харків	5	5			5	
Чернівці	2	2	2			
Чернігів	5	5	3	1	1	
м.Київ	1	1			1	
Україна	52	52	28	1	23	0

У межах дозорного епіднагляду триває дослідження зразків на збудники респіраторних інфекцій. Протягом звітного тижня виявлено фрагменти РНК RS-вірусів в зразках клінічних матеріалів від двох пацієнтів із ГПЗ у місті Одеса.

З початку епідемічного сезону від 2 701 пацієнта з ГПЗ лабораторно досліджено 1 057 (39,1%) зразків клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 486 (46%) випадках (рис. 7).




Рис. 7. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 05 тиждень 2026 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 18 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 305 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 127 (41,6%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 5,9%.

У закладі охорони здоров'я міста Запоріжжя, визначеного для проведення дозорного епідеміологічного нагляду, у зразках клінічного матеріалу від пацієнта із ТГРІ, який помер внаслідок ускладнень перебігу захворювання на тлі наявних супутніх патологій, за результатами лабораторних досліджень виявлено фрагменти РНК вірусу грипу типу А(Н3).

З-поміж 305 випадків ТГРІ у 94 (30,8%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 89 зразків клінічного матеріалу у 66 (74,2%) випадках отримано позитивні результати (табл. 7).

В 11 дозорних містах України під час дослідження зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ТГРІ, виявлено фрагменти РНК вірусів грипу типу А (табл. 6).

Таблиця 6. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 05 тиждень 2026 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)рdm09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	5	5			5	
Дніпро	2	2	2			
Запоріжжя	7	7			7	
Кропивницький	6	6	3		3	
Львів	3	3	2		1	
Рівне	1	1	1			
Суми	3	3	3			
Харків	7	7			7	
Чернівці	1	1	1			
Чернігів	8	8	4		4	
м.Київ	8	8			8	
Україна	51	51	16	0	35	0

З початку епідемічного сезону з-поміж 3 320 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 1 181 (35,6%) зразок клінічних матеріалів. Отримано позитивні результати на визначення вірусів респіраторної групи інфекцій в 664 (56,2%) випадках (рис. 8).




Рис. 8. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 05 тиждень 2026 року

Таблиця 7. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 05 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2025/2026		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	86	89	175	1 057	1 181	2 238
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	63 73,3%	66 74,2%	129 73,7%	486 46%	664 56,2%	1150 51,4%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	52 82,5%	51 77,3%	103 79,8%	215 44,3%	231 34,9%	446 38,9%
А, всього	52	51	103	215	230	445
А не субтиповані	28	16	44	149	132	281
А(Н1)рdm09	1	0	1	1	3	4
А(Н3)	23	35	58	65	95	160
В	0	0	0	0	1	1
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	11 17,5%	15 22,7%	26 20,2%	271 55,9%	433 65,4%	704 61,4%
Парагрип	0	0	0	37	46	83
Аденовіруси	0	11	11	27	119	146
RS-віруси	2	0	2	7	9	16
Риновіруси	4	2	6	90	89	179
Бокавіруси	0	0	0	5	9	14
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	2	0	2	2	0	2
Метапневмовіруси	1	1	2	25	17	42
SARS-CoV-2	1	0	1	38	80	118
Інші респіраторні збудники	1	1	2	40	64	104

Динаміка реєстрації випадків захворювання на ГРВІ та кількості госпіталізацій в розрізі регіонів України,
40 тиждень 2025 – 05 тиждень 2026 років

