

Інформаційний бюлетень
«ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ»
32 - 35 тижні
(03-30.08.2026)

Дата випуску:
01.09.2026

www.phc.org.ua

Резюме за 32-35 тижні по Україні:

- за даними дозорного епідеміологічного нагляду в Україні інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ з 03 до 30 серпня 2026 року знаходилися на міжсезонному рівні;
- зареєстровано 218 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), та 201 пацієнт, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин знаходився в межах 1,1%;
- за результатами лабораторних досліджень клінічних зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ та ТГРІ було визначено віруси SARS-CoV-2, парагрипу, аденовіруси, риновіруси, RS-віруси;
- протягом звітного періоду в системі дозорного епідеміологічного нагляду не зареєстровано летальних випадків унаслідок грипу та серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Захворюваність на грип і ГРВІ та моніторинг рівня підвищеної смертності в Європейському регіоні

За даними Європейського регіонального бюро ВООЗ (ERVISS), протягом останнього місяця протягом останнього місяця епідемічна ситуація щодо грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій у Європейському регіоні залишалася стабільною та відповідала міжсезонному періоду. Всі країни, що подали звітність, не повідомили про перевищення фонових рівнів захворюваності на грипоподібні захворювання (ГПЗ) або гострі респіраторні вірусні інфекції. Активність грипу та SARS-CoV-2 у регіоні загалом залишається низькою. За результатами лабораторного моніторингу серед пацієнтів із ГПЗ у дозорних закладах частка позитивних зразків на грип становила 6%, усі субтиповані віруси грипу А належали до підтипу А(Н3). Позитивність на SARS-CoV-2 зросла до 11% проти 4% тижнями раніше. Активність RSV відповідає міжсезонному рівню, позитивних результатів на RSV не зареєстровано.

Систематичний дозорний епіднагляд за грипом, RSV, SARS-CoV-2 та іншими респіраторними вірусами має ключове значення для своєчасного виявлення початку сезонного підйому, оцінки тяжкості захворювання та підготовки системи охорони здоров'я.

Станом на 35 тиждень 2026 року за результатами аналізу даних 27 країн Європи, що долучилися до Європейського проекту моніторингу надлишкової смертності для підтримки прийняття рішень у сфері громадського здоров'я (EuroMOMO), найвищі значення Z-показника смертності від усіх причин у віковій групі 65 років і старше відзначено в Іспанії (6,67).

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та іншими респіраторними патогенами (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом звітного періоду 2026 року зареєстровано 218 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ, із них 116 (53,2%) – діти віком до 17 років. З-поміж 218 пацієнтів із ГПЗ у 120 (55,1%) осіб було відібрано зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій (рис.1).




Рисунок 1. Розподіл випадків ГПЗ та позитивних результатів серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), 32-35 тижні 2026 року

За результатами лабораторного дослідження 120 клінічних зразків матеріалів в 9 (7,5%) випадках отримано позитивні результати (табл. 1).

Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ
за 32-35 тижні 2026 року

	Відібрано зразків матеріалів	Грип А не субтип	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS- CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій
Вінниця	27						
Дніпро	17						
Запоріжжя	0						
Кропивницький	0						
Львів	15						
Одеса	19						8
Рівне	3						1
Суми	33						
Харків	0						
Чернівці	1						
Чернігів	3						
Київ	2						
Всього	120	0	0	0	0	0	9

За інформацією, що надали 19 дозорних лікарень, упродовж звітнього періоду зареєстрований 201 пацієнт, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 100 (49,8%) – діти віком до 17 років. Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин знаходився в межах 1,1% (рис.2).




Рисунок 2. Розподіл випадків ТГРІ та позитивних результатів серед дозорних закладів охорони здоров'я України (агреговано), 32-35 тижні 2026 року

З-поміж 201 випадка ТГРІ у 125 (62,1%) пацієнтів було взято зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження в 22 (17,6%) випадках отримано позитивні результати (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ТГРІ за 32-35 тижні 2026 року

	Відібрано зразків матеріалів	Грип А не субтип	Грип А(Н1) pdm09	Грип А(Н3)	Грип В	SARS-CoV-2	Інші віруси респіраторної групи інфекцій
Вінниця	17					1	0
Дніпро	7					0	0
Запоріжжя	5					0	0
Кропивницький	8					0	1
Львів	11					0	0
Одеса	6					0	2
Рівне	19					0	9
Суми	7					0	0
Харків	8					1	2
Чернівці	3					0	0
Чернігів	16					0	1
Київ	18					0	5
Всього	125	0	0	0	0	2	20