



Дослідження «ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО РИЗИКІВ ФЕТАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО СПЕКТРУ ПОРУШЕНЬ (ФАСП) ТА ОЦІНКА БАР'ЄРІВ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ФАСП».

Анкета для збору даних

Профілактика фетального алкогольного спектру порушень (ФАСП) – зниження споживання алкоголю вагітними

Опитування проводиться анонімно. Результати можуть бути опубліковані у всіх формах комунікації, відповіді обробляються таким чином, щоб унеможливити ідентифікацію окремих респондентів.

1. Будь ласка, вкажіть область, де розташоване Ваше місце роботи
2. Вкажіть вашу посаду
 - A) Лікар первинної медичної допомоги
 - B) Лікар акушер-гінеколог
 - C) Медична сестра
 - D) Неонатолог, педіатр, дитячий лікар
 - E) Адміністративний персонал
 - F) Лікарі інших спеціальностей
3. Як Ви оцінюєте актуальність проблеми фетального алкогольного спектру порушень (ФАСП) у Вашому регіоні?
 - A) Дуже актуальна
 - B) Актуальна
 - C) Не дуже актуальна
 - D) не має значення
4. Чи вважаєте Ви, що проблема ФАСП отримує достатню увагу в Україні?
 - A) Так
 - B) Ні
 - C) Не впевнений(а)
5. Чи брали Ви участь у тренінгах або семінарах та/або інформаційних кампаніях присвячених профілактиці ФАСП?
 - A) Так
 - B) Ні



6. Які заходи, на Вашу думку, є найефективнішими для профілактики ФАСП? (оберіть до трьох варіантів)

- A) Інформаційні кампанії для населення
- B) Навчальні тренінги для медичних працівників
- C) Розробка протоколів з профілактики та ведення пацієнтів з ФАСП для медичних закладів
- D) Посилення співпраці між організаціями
- E) Розробка програм соціальної підтримки для вагітних

7. Що, на Вашу думку, найбільше перешкоджає зменшенню поширеності ФАСП?

- A) Недостатня обізнаність серед вагітних
- B) Соціально-економічні фактори
- C) Культура толерантного ставлення до вживання алкоголю
- D) Недостатнє інформування медичних працівників
- E) Відсутність національних кампаній із профілактики

8. Як Ви оцінюєте рівень обізнаності медичних працівників у Вашому регіоні щодо діагностики ФАСП?

- A) Дуже високий
- B) Високий
- C) Середній
- D) Низький
- E) Дуже низький

9. Які основні труднощі у діагностиці ФАСП Ви бачите у Вашому регіоні? (оберіть до трьох варіантів)

- A) Відсутність обізнаності серед медичних працівників
- B) Відсутність стандартних протоколів діагностики
- C) Недостатнє фінансування
- D) Відсутність спеціалізованого обладнання
- E) Небажання пацієнтів надавати інформацію про вживання алкоголю