



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

46 тиждень
(10-16.11.2025)

Дата випуску:
18.11.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Резюме за 46 тиждень по Україні

- Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 319,0 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2,7% більше аналогічного показника минулого тижня.
- В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 117 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 203,9 на 100 000 населення, що на 7,6% менше показника минулого тижня.
- Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 113 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,7%.
- На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 3 309 осіб, із них 1 908 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).
- У 1 (4%) регіоні встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про спорадичне географічне поширення вірусів грипу в Україні.
- Протягом звітного тижня зареєстровано 3 летальні випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Резюме з початку сезону по Україні

- Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 16 листопада 2025 року, на ГРВІ перехворіло 835 850 осіб (2,4% від населення країни), що на 3,3% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 16 320 випадків захворювання на COVID-19 – 2,0% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).
- З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 71 випадок; всі випадки сталися серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.
- Станом на 16 листопада проти грипу вакциновано 51 064 особи, з них 24 790 особи з групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,3% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 46 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	835 850 2 353,6	109 645 319,0	106 789 310,7	+2,7 %
	із них дітей, інтенсивний показник	482 664 7 370,1	62 698 957,4	58 753 923,1	+6,7 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	20 830 11 174	2 712 1 584	2 676 1 412	+36 вип. +172 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19	0 0	0 0	0 0	0 вип. 0 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, із них осіб груп ризику	51 064 24 790	3 309 1 908	4 736 2 197	-1 427 осіб -289 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	13 359	1397	1591	-194 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	2 315 18,5%	107 7,7%	250 15,7%	-143 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	682	90	113	-23 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	293 43%	39 43,3%	51 45,1%	-12 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	16 320 2 523	735 127	959 141	-23,3 % -9,9 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	4 289 911	317 69	339 57	-22 вип. +12 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	71, в т.ч. 6 0	3, в т.ч. 0 0	9, в т.ч. 0 0	-6 вип.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (45 тиждень 2025 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (<https://erviss.org>) у Румунії та Словаччині зареєстрована низька інтенсивність епідемічного процесу, інші країни доповіли про фонову.

Про відсутність географічного поширення вірусів грипу доповіли з Угорщини, щодо локального поширення повідомила Молдова. В інших країнах спорадична циркуляція вірусів грипу (рис. 1).




Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (<https://erviss.org>) за 45 тиждень 2025 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За результатами звітів 26 країн Європи, що на 45 тижні 2025 року взяли участь у Європейському проєкті моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO) лише у Словенії у віковій групі старше 65 років визначено низький рівень надлишкової смертності.

Після тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності через пандемію COVID-19 перевищення рівня смертності з усіх причин в інших країнах Європейського регіону не зареєстровано (рис. 2). Треба врахувати, що результати аналізу можуть відрізнятися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, та затримки реєстрації випадків.




Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи з щотижневим Z-показником¹ для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 45 тиждень 2025 року

¹ Z-показник надлишкової смертності – стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами або регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 46 тиждень 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 109 645 осіб, із них 62 698 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 57,2%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 319,0 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2,7% більше аналогічного показника минулого тижня (рис. 3).




Рис. 3. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 46 тиждень 2025 року

На рисунку 4 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. У всіх регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.




Рис. 4. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 46 тиждень 2025 року

З 10 по 16 листопада було госпіталізовано 2 712 осіб (2,5% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 1 584 – діти віком до 17 років, що становить 58,4% серед госпіталізованих.

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 735 пацієнтів, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 23,3% менше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,7%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізовано 317 (43,1%) осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Херсонській області (рис. 5).



Рис. 5. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 46 тиждень 2025 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 127 підтверджених випадків COVID-19, що на 9,9% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 69 дітей віком до 17 років, це становить 21,8% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 54,3% серед зареєстрованих випадків серед дітей.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня у Полтавській області зареєстрований один летальний випадок серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, одночасно у Харківській області сталося 2 летальні випадки. Померлі старше 72 років, жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 397 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 107 (7,7%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 83 (77,6%) випадках визначено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2). У Волинській області в одному випадку виявилися позитивні знахідки на визначення фрагментів РНК грипу типу А не субтипований.

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 46 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	81	586
Кількість позитивних результатів, (%)	1 1,2%	5 0,9%
А не субтипований	1	2
A(H1)pdm09	0	0
A(H3)	0	0
В	0	3
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1 316	12 773
Кількість позитивних результатів, (%)	106 8,1%	2 310 18,1%
Парагрип	3	11
Аденовіруси	5	22
RS-віруси	0	1
Риновіруси	14	65
Бокавіруси	1	8
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	2
Метапневмовіруси	0	4
SARS-CoV-2	83	2 197

4. Вакцинація проти грипу

За 46 тиждень 2025 року проти грипу вакциновано 3 309 осіб, зокрема 1 908 (57,7%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 6).




Рис. 6. Питомі ваги представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 46 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипоподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 46 тижня 2025 року зареєстровано 117 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 119,9 на 100 000 населення, що на 34% менше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності збільшився на 9,5% і становить 464,0 на 100 000 населення.

З-поміж 117 пацієнтів із ГПЗ у 49 (41,9%) осіб було відібрано зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 48 зразків матеріалів у 16 (33,3%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3).

Фрагменти РНК вірусів грипу та RS-вірусів не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ГПЗ.

З початку епідемічного сезону від 885 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 339 (38,3%) зразків матеріалів, отримано позитивні результати у 112 (33%) випадках (рис. 7).




Рис. 7. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 46 тиждень 2025 року

2. Дозорний епідгляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 113 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 51 (45,1%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 2,7%.

З-поміж 113 випадків ТГРІ у 45 (39,8%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 42 зразків матеріалів у 23 (54,8%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3).

Фрагменти РНК вірусів грипу, метапневмовірусів та RS-вірусів не визначено в жодному з зразків клінічних матеріалів від пацієнтів із ТГРІ.

З початку епідемічного сезону з-поміж 800 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 343 (42,9%) клінічні зразки матеріалів. Отримано позитивні результати на віруси респіраторної групи інфекцій в 181 (52,8%) випадку (рис. 8).




Рис. 8. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 46 тиждень 2025 року

Таблиця 3. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 46 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	48	42	90	339	343	682
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	16 33,3%	23 54,8%	39 43,3%	112 33%	181 52,8%	293 43%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	0 0%	0 0%	0 0%	1 0,9%	2 1,1%	3 1%
А, всього	0	0	0	1	1	2
А не субтиповані	0	0	0	1	1	2
А(Н1)pdм09	0	0	0	0	0	0
А(Н3)	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	1	1
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	16 100%	23 100%	39 100%	111 99,1%	179 98,9%	290 99%
Парагрип	3	5	8	23	28	51
Аденовіруси	3	4	7	6	22	28
RS-віруси	0	0	0	1	2	3
Риновіруси	6	6	12	38	47	85
Бокавіруси	1	1	2	2	7	9
Коронавіруси OC43, 229Е, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0	3	3	6
SARS-CoV-2	0	5	5	29	58	87
Інші респіраторні збудники	3	2	5	9	12	21

Звіт про секвенування SARS-CoV-2 (45–46 тижні)

За 45–46 тижні до вірусологічної референс-лабораторії Центру надійшло 45 зразків носоглоткових змивів, позитивних на SARS-CoV-2.

За цей самий період було завершено тестування методом повногеномного секвенування та отримано результати для 81 зразка (табл. 4). Ці зразки надійшли з таких областей: Тернопільська (16), Харківська (17), Запорізька (10), Рівненська (10), Київська (8), м. Київ (8), Одеська (7), Сумська (5).

Серед досліджених зразків понад 97% (79) належали до варіанта XFG. Крім цього, було виявлено варіанти LF.7.7 та PQ.11.

Частка варіанта XFG серед секвенованих зразків зростає: у міжепідемічний період вона становила близько 87%, за 45–46 тижні вона зростає до 97%.

Це свідчить про подальше посилення домінування варіанта XFG у популяції вірусу.

Таблиця 4. Розподіл SARS-CoV-2 за областями та варіантами

Назва регіону	Всього зразків	Секвенування SARS-CoV-2								
		Носоглоткові змиви								
		LF.7.7.1	PQ.11	XFG	XFG.3	XFG.30	XFG.4	XFG.5.1	XFG.7.1	XFG.9.1
Запорізька	10				4	4	2			
м. Київ	8				3	2		3		
Київська	8				4	4				
Одеська	7				1	4	2			
Рівненська	10				5	4		1		
Сумська	5				1	4				
Тернопільська	16	1	1		3	10				1
Харківська	17			1	2	12	1		1	
	81	1	1	1	23	44	5	4	1	1