

ДОПОМОГА В РОБОТІ: ПІДГОТОВКА, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРЕПАРАТУ

Оральна PrEP на основі TDF

Форма та застосування



Пероральна PrEP на основі TDF — це таблетки, які приймають перорально. Можна використовувати два види пероральної PrEP на основі TDF:

- 300mg TDF + 200mg emtricitabine (FTC)
- 300mg TDF + 300mg lamivudine (3TC)

Зберігання

Пероральний PrEP упаковується в пластикові флакони і повинен видаватися в оригінальній упаковці. Флакони слід зберігати при температурі 25 °C/77 °F. Холодильне зберігання не потрібне.

ВАГІНАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ (DVR)

Форма та застосування



Вагінальне кільце з дапівірином (DVR) — це гнучке силіконове кільце, яке вставляється у піхву.

- Кожне силіконове кільце містить 25 мг дапівірину.

Зберігання

DVR поставляється в фольгованому пакеті, упакованому в картонну коробку. Коробки з DVR слід зберігати при температурі не вище 30 °C/86 °F. Холодильне зберігання не потрібне.

КАБОТЕГРАВІР ПРОЛОНГОВАНОЇ ДІЇ (CAB-LA)

Форма та застосування



CAB-LA — це рідка суспензія у флаконі, що містить 3 мл/600 мг каботегравіру, яка вводиться внутрішньом'язово.

Зберігання

Флакони (або коробки з флаконами) CAB-LA слід зберігати при температурі 2-25 °C (36-77 °F), допускається температура до 30 °C/86 °F. Не заморожуйте флакони. Холодильне зберігання не потрібне.

ЛЕНАКАПІВІР (LEN)

Форма та застосування



LEN доступний у двох формах.

- Рідкий розчин у флаконі, що містить 1,5 мл/463,5 мг LEN, вводиться підшкірно
- Таблетка для перорального прийому, що містить 300 мг LEN

Зберігання

Таблетки LEN упаковані в пластикові флакони і повинні видаватися в оригінальній упаковці. Флакони та таблетки LEN (в упаковці) слід зберігати при температурі 20-25 °C (68-77 °F), [допускається температура до 30 °C/86 °F]. Не заморожуйте і не зберігайте LEN в