ІБПД ЛВНІ 2023. Додаток

Результати для міста: Вінниця




Рис. А. Мережа рекрутингу RDS у місті Вінниця

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	500	40.9	(40.2–41.6)	40	(36–45)
Вік першого неін'єкційного вживання наркотиків	476	16.7	(16.3–17.1)	16	(14–18)
Років з початку неін'єкційного вживання наркотиків	476	24.0	(23.2–24.7)	24	(19–29)
Вік першого ін'єкційного вживання наркотиків	500	22.1	(21.5–22.7)	20	(18–25)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків	500	18.8	(17.9–19.6)	19	(12–25)
Особистий місячний дохід, грн	473	10,716.1	(9774.7–11657.6)	9,000	(5000–15000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

	Сайт	n	%	ДІ
Стать				
чоловік	Вінниця	435	87.1	(83.7–89.9)
жінка	Вінниця	65	12.9	(10.1–16.3)
Вікова категорія 4				
<25	Вінниця	8	1.6	(0.8–3.3)
25-34	Вінниця	75	15.3	(12.3–18.9)
35-44	Вінниця	280	55.4	(50.8–59.9)
45+	Вінниця	137	27.7	(23.7–32.0)
Сімейний стан				
одружений або проживають разом	Вінниця	74	15.9	(12.7–19.7)
одружений, але має іншого партнера	Вінниця	30	5.7	(4.0–8.2)
не одружений, але є партнер	Вінниця	118	24.4	(20.6–28.7)
одружений, але не живуть разом	Вінниця	19	3.6	(2.3–5.7)
не одружений та не мають партнера	Вінниця	259	50.3	(45.8–54.9)
Партнерський статус				
живе сам	Вінниця	278	54.0	(49.4–58.5)
живе з партнером	Вінниця	222	46.0	(41.5–50.6)
Освіта 3 категорії				
незак. середня школа	Вінниця	50	9.9	(7.5–12.9)
середня школа	Вінниця	172	34.7	(30.4–39.2)
> середня школа	Вінниця	278	55.5	(50.8–60.0)
Поточна професія				
учень школи	Вінниця	0	0.0	
студент коледжу/університету	Вінниця	2	0.4	(0.1–1.7)
постійна робота	Вінниця	152	31.9	(27.7–36.4)
непостійна робота	Вінниця	239	46.8	(42.2–51.4)
безробітний	Вінниця	36	7.3	(5.2–10.1)
домогосподарка	Вінниця	20	3.9	(2.5–6.1)
інвалідність	Вінниця	45	8.7	(6.5–11.5)
військовий	Вінниця	2	0.4	(0.1–1.4)
інші	Вінниця	4	0.7	(0.3–1.9)
Безхатченко				
ніколи	Вінниця	440	87.4	(83.9–90.2)

	Сайт	n	%	ДІ
так, 12м+ тому	Вінниця	53	10.8	(8.3–14.0)
так, за останні 12м	Вінниця	7	1.8	(0.8–4.0)
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Вінниця	53	85.7	(71.9–93.3)
так	Вінниця	7	14.3	(6.7–28.1)
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Вінниця	54	11.1	(8.5–14.4)
3-10 тис	Вінниця	187	39.5	(35.0–44.2)
10-20 тис	Вінниця	169	35.7	(31.3–40.3)
≥20 тис	Вінниця	63	13.7	(10.7–17.4)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Вінниця	47	9.7	(7.2–12.9)
≥2684	Вінниця	426	90.3	(87.1–92.8)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Вінниця	17	3.5	(2.2–5.6)
3-5	Вінниця	20	4.2	(2.7–6.6)
6-10	Вінниця	69	13.5	(10.7–16.9)
≥11	Вінниця	394	78.8	(74.9–82.3)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Сайт	n	%	ДІ
власне житло	Вінниця	265	52.8	(48.2–57.4)
у друзів або родичів	Вінниця	183	36.3	(32.0–40.8)
оренда	Вінниця	36	7.6	(5.5–10.4)
різне	Вінниця	12	2.5	(1.4–4.6)
на вулиці (безхатько)	Вінниця	7	1.8	(0.8–4.0)
у притулку для біженців	Вінниця	1	0.2	(0.0–1.4)




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)



Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)



Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)



Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії									
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	500	252	49.9 (45.3–54.5)	123	24.8 (21.1–29.0)	122	24.9 (21.1–29.1)	3	0.4 (0.1–1.2)	1.0000
Стать											
	чоловік	435	216	49.4 (44.5–54.4)	102	23.3 (19.4–27.8)	114	26.7 (22.6–31.4)	3	0.5 (0.1–1.4)	0.0481

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії									
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
	жінка	65	36	52.9 (40.0–65.3)	21	34.8 (23.6–48.0)	8	12.3 (5.7–24.7)	0	0.0	
Вікова категорія 4											
	<25	8	1	11.8 (1.0–63.0)	4	47.0 (13.7–83.2)	3	41.2 (10.5–80.6)	0	0.0	0.0969
	25-34	75	32	42.2 (31.1–54.2)	25	34.5 (24.0–46.7)	18	23.3 (14.7–34.8)	0	0.0	
	35-44	280	146	51.4 (45.3–57.5)	66	23.6 (18.8–29.3)	68	24.9 (19.9–30.7)	0	0.0	
	45+	137	73	53.3 (44.4–62.0)	28	20.5 (14.3–28.6)	33	24.7 (17.8–33.4)	3	1.5 (0.5–4.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків											
	≤2	17	2	11.1 (2.4–38.1)	11	62.9 (36.0–83.6)	4	26.1 (9.2–55.1)	0	0.0	0.0140
	3-5	20	9	36.8 (17.9–60.7)	7	42.7 (20.9–67.7)	4	20.6 (7.0–47.1)	0	0.0	
	6-10	69	34	49.6 (37.4–61.8)	20	28.2 (18.5–40.4)	15	22.3 (13.4–34.7)	0	0.0	
	≥11	394	207	52.4 (47.2–57.5)	85	21.6 (17.6–26.2)	99	25.5 (21.2–30.4)	3	0.5 (0.2–1.6)	
Партнерський статус											
	живе сам	278	143	52.9 (46.8–59.0)	66	22.9 (18.2–28.4)	67	23.7 (18.8–29.3)	2	0.5 (0.1–1.9)	0.4796
	живе з партнером	222	109	46.3 (39.6–53.2)	57	27.0 (21.2–33.7)	55	26.3 (20.5–33.1)	1	0.3 (0.0–2.2)	
Поточний статус зайнятості											
	повний робочий день	152	66	42.0 (34.0–50.4)	45	28.3 (21.4–36.4)	41	29.7 (22.4–38.3)	0	0.0	0.3146
	неповний робочий день або тимчасово	239	128	53.9 (47.2–60.4)	52	22.8 (17.6–28.9)	56	22.5 (17.5–28.5)	3	0.9 (0.3–2.7)	
	безробітний	36	18	49.9 (32.6–67.2)	7	19.8 (9.2–37.8)	11	30.3 (16.3–49.3)	0	0.0	

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
інвалідність	45	28	62.7 (47.0–76.2)	9	19.0 (9.8–33.6)	8	18.3 (9.0–33.6)	0	0.0	
інші	28	12	41.6 (24.3–61.3)	10	38.2 (21.2–58.7)	6	20.2 (8.9–39.7)	0	0.0	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	54	32	56.1 (41.6–69.6)	11	21.7 (12.1–35.8)	11	22.2 (12.0–37.3)	0	0.0	0.8436
3-10 тис	187	92	50.6 (43.2–58.1)	43	24.3 (18.3–31.5)	49	24.0 (18.4–30.8)	3	1.1 (0.3–3.3)	
10-20 тис	169	80	46.6 (38.8–54.5)	43	24.7 (18.7–32.0)	46	28.7 (21.9–36.5)	0	0.0	
≥20 тис	63	34	49.7 (36.6–62.8)	17	26.5 (16.4–39.8)	12	23.9 (13.5–38.6)	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	317	152	47.5 (41.8–53.3)	83	26.2 (21.4–31.6)	79	25.7 (20.8–31.2)	3	0.6 (0.2–2.0)	0.3753
так	183	100	54.0 (46.4–61.4)	40	22.4 (16.6–29.5)	43	23.6 (17.7–30.6)	0	0.0	

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	455	233	50.8 (46.0–55.6)	110	24.3 (20.4–28.7)	109	24.5 (20.5–29.0)	3	0.4 (0.1–1.4)	0.5280
так	45	19	40.2 (26.5–55.7)	13	30.5 (18.2–46.4)	13	29.3 (17.3–45.0)	0	0.0	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	479	237	48.8 (44.2–53.5)	121	25.5 (21.6–29.9)	118	25.2 (21.3–29.6)	3	0.4 (0.1–1.3)	0.0653
так	21	15	75.4 (52.4–89.5)	2	7.5 (1.7–27.9)	4	17.1 (6.0–40.1)	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	52	30	55.5 (40.6–69.5)	9	20.0 (10.2–35.4)	13	24.5 (13.9–39.5)	0	0.0	0.7543

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
негативний	448	222	49.2 (44.4–54.0)	114	25.4 (21.4–29.9)	109	24.9 (20.9–29.4)	3	0.5 (0.1–1.4)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	334	248	73.5 (68.1–78.3)	0	0.0	86	26.5 (21.7–31.9)	0	0.0	0.0000
стимулятори	160	2	0.9 (0.2–3.7)	122	76.7 (69.2–82.9)	36	22.3 (16.3–29.8)	0	0.0	
інші	6	2	43.4 (7.5–87.8)	1	16.3 (1.1–76.8)	0	0.0	3	40.4 (7.5–84.9)	

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
	n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
Частота ін'єкцій: останні 24 години									
0 разів	83	33.2	67	55.3	38	30.9	2	65.3	0.0033
1 раз	144	56.7	45	36.3	72	58.5	1	34.7	
2-3 рази	23	9.2	8	5.9	10	9.4	0	0.0	
4+ рази	2	0.9	3	2.5	2	1.3	0	0.0	
N	252		123		122		3		
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)									
1 раз	144	84.9	45	81.2	72	84.6	1	100.0	0.6900
2-3 рази	23	13.8	8	13.1	10	13.5	0	0.0	
4+ рази	2	1.3	3	5.6	2	1.9	0	0.0	
N	169		56		84		1		
Частота ін'єкцій: останній тиждень									
0 разів	8	3.3	7	5.9	3	3.2	0	0.0	0.0411
1-6 разів	156	62.4	96	78.0	82	67.9	3	100.0	
кожен день	88	34.3	20	16.0	37	28.9	0	0.0	
N	252		123		122		3		
Частота ін'єкцій: останні 30 днів									
1-9 разів	55	22.1	58	47.2	16	14.5	2	65.3	0.0000
10-19 разів	78	31.2	37	30.1	42	33.0	1	34.7	
20-29 разів	50	20.1	12	9.3	32	27.4	0	0.0	
кожен день	69	26.6	16	13.4	32	25.1	0	0.0	
N	252		123		122		3		
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів									
0-9 разів	54	21.8	57	46.8	14	12.9	2	65.3	0.0000
10-19 разів	79	31.6	36	29.2	41	32.4	1	34.7	
20-29 разів	49	19.8	12	9.3	34	28.7	0	0.0	
кожен день	70	26.9	18	14.8	33	26.0	0	0.0	
N	252		123		122		3		

Таблиця 2.4. Ін'єкційний вид наркотику на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	37	11.0	15	10.2	2	43.4
3-10 тис	127	40.3	57	37.9	3	40.4
10-20 тис	110	35.2	58	37.3	1	16.3
≥20 тис	42	13.5	21	14.6	0	0.0
N	316		151		6	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
Разом		опіоїди		стимулятори		інші		
n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
готую сам								
12	2.5	10	3.0	2	1.7	0	0.0	0.7007
приготовлене друзями								
7	1.6	6	2.0	1	1.0	0	0.0	0.7314
від дилера								
257	51.1	174	51.2	80	51.1	3	47.4	0.9851
куплене в Інтернеті								
329	66.7	216	65.4	109	69.5	4	72.0	0.6171
з аптеки								
19	3.5	15	4.4	3	1.4	1	12.3	0.0646
з програми ЗПТ								
5	0.9	4	1.2	1	0.5	0	0.0	0.7325
інше								
2	0.4	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0.9109
N								
631		426		197		8		




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін'єкції використовував чистий шприц			
так	486	97.0	(95.0–98.2)
Джерело шприца для останньої ін'єкції			
купив в аптеці	433	87.0	(83.7–89.8)
отримав в аптеці	0	0.0	
отримав від НУО	62	11.7	(9.1–14.8)
отримав від друга	3	0.9	(0.3–3.1)
отримав вживаний від друга	0	0.0	
використовував вживаний свій	0	0.0	
отримав заповнений	2	0.3	(0.1–1.3)
інші	0	0.0	
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	12	2.8	(1.5–4.9)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	37	7.3	(5.2–10.0)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	139	28.1	(24.2–32.4)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	75	15.1	(12.1–18.7)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	215	43.0	(38.5–47.6)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	11	2.3	(1.3–4.2)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	178	36.1	(31.8–40.6)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	1	11.4	(1.6–50.2)
часто	0	0.0	
половина	1	7.0	(0.9–37.0)
іноді	2	18.4	(4.5–51.8)
рідко	6	49.6	(23.4–76.0)
ніколи	2	13.7	(3.2–43.4)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	69	14.2	(11.2–17.8)
часто	48	9.3	(7.0–12.3)
половина	67	13.0	(10.2–16.3)
іноді	67	13.7	(10.9–17.2)
рідко	84	16.5	(13.4–20.2)
ніколи	162	33.3	(29.0–37.8)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			

	n	%	ДІ
1-9	184	85.4	(79.7–89.7)
10-29	29	13.8	(9.6–19.4)
30+	2	0.8	(0.2–3.3)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	20	9.9	(6.3–15.2)
2-3	152	71.4	(64.8–77.3)
4-9	32	14.6	(10.4–20.2)
10+	10	4.0	(2.1–7.4)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	29	76.4	(59.2–87.9)
від друзів	4	10.6	(4.0–25.3)
із закладки	4	12.9	(4.9–30.1)
Хтось використав один шприц для ін'єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	462	92.6	(89.7–94.7)
так	35	7.4	(5.3–10.3)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін'єкцій (%)




Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував спільний шприц за останні 30 днів			Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
		n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
	Разом	12	2.8 (1.5–4.9)	1.0000	500	37	7.3 (5.2–10.0)	1.0000
Стать								
	чоловік	12	3.2 (1.8–5.6)	0.1794	435	33	7.5 (5.3–10.6)	0.4941
	жінка	0	0.0		65	4	5.3 (1.9–14.0)	
Вікова категорія								

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів			Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<25	0	0.0	0.7772	8	0	0.0	0.5776
25-34	2	2.8 (0.7–10.9)		75	5	6.3 (2.6–14.8)	
35-44	8	3.4 (1.7–6.7)		280	19	6.5 (4.1–10.2)	
45+	2	1.6 (0.4–7.0)		137	13	9.6 (5.5–16.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
≤2	0	0.0	0.6815	17	1	5.5 (0.7–34.3)	0.2830
3-5	1	5.7 (0.7–34.2)		20	4	17.7 (6.0–41.9)	
6-10	1	1.4 (0.2–9.8)		69	6	8.0 (3.5–17.0)	
≥11	10	3.0 (1.6–5.5)		394	26	6.7 (4.5–9.8)	
Партнерський статус							
живе сам	7	2.7 (1.3–5.7)	0.9450	278	25	9.2 (6.2–13.5)	0.0737
живе з партнером	5	2.8 (1.2–6.7)		222	12	5.0 (2.8–8.7)	
Поточний статус зайнятості							
повний робочий день	0	0.0	0.0533	152	12	7.4 (4.2–12.8)	0.8650
неповний робочий день або тимчасово	9	4.4 (2.3–8.4)		239	17	7.2 (4.4–11.5)	
безробітний	2	7.0 (1.6–25.6)		36	4	11.0 (3.7–28.3)	
інвалідність	0	0.0		45	2	4.4 (1.1–16.7)	
інші	1	3.6 (0.5–23.0)		28	2	6.5 (1.5–24.2)	
Категорія місячного доходу							
<3 тис	1	1.8 (0.2–12.4)	0.5861	54	5	8.6 (3.5–19.7)	0.1992
3-10 тис	5	2.7 (1.1–6.4)		187	13	6.5 (3.7–11.1)	
10-20 тис	4	3.1 (1.2–8.2)		169	13	8.1 (4.7–13.7)	
≥20 тис	0	0.0		63	1	1.1 (0.1–7.6)	
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	9	3.5 (1.8–6.7)	0.1687	317	26	8.0 (5.4–11.8)	0.3766
так	3	1.4 (0.5–4.5)		183	11	5.9 (3.2–10.4)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів			Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	11	2.8 (1.5–5.1)	0.8474	455	35	7.5 (5.4–10.4)	0.4829
так	1	2.3 (0.3–15.3)		45	2	4.6 (1.1–17.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	11	2.6 (1.4–4.8)	0.4137	479	37	7.6 (5.4–10.4)	0.2037
так	1	6.0 (0.7–35.1)		21	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	0	0.0	0.2217	52	3	5.2 (1.6–15.7)	0.5297
негативний	12	3.1 (1.7–5.5)		448	34	7.5 (5.3–10.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
опіоїди	2	1.1 (0.3–4.4)	0.0402	252	19	8.1 (5.1–12.5)	0.0482
стимулятори	2	2.2 (0.5–8.7)		123	4	2.8 (1.0–7.5)	
опі+стимул	8	6.7 (3.3–13.1)		122	13	9.6 (5.5–16.2)	
інші	0	0.0		3	1	34.7 (0.3–99.1)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання							
опіоїди	5	1.7 (0.7–4.1)	0.1117	334	28	8.2 (5.6–11.8)	0.3497
стимулятори	7	5.1 (2.4–10.5)		160	8	5.1 (2.5–10.1)	
інші	0	0.0		6	1	14.0 (1.0–73.5)	

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	499	139	28.1 (24.2–32.4)	1.0000	500	75	15.1 (12.1–18.7)	1.0000
Стать									
	чоловік	434	126	29.3 (25.0–34.0)	0.1401	435	66	15.6 (12.3–19.6)	0.4090

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
жінка	65	13	20.2 (11.8–32.3)		65	9	11.8 (6.0–21.8)	
Вікова категорія 4								
<25	8	2	24.7 (4.3–70.3)	0.7602	8	1	10.0 (0.9–58.4)	0.8616
25-34	75	21	29.0 (19.4–41.0)		75	11	13.1 (7.2–22.7)	
35-44	280	84	29.8 (24.5–35.6)		280	45	16.2 (12.1–21.3)	
45+	136	32	24.6 (17.6–33.2)		137	18	14.3 (9.0–21.9)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно								
≤2	17	3	18.4 (5.4–47.0)	0.6726	17	1	4.6 (0.5–30.3)	0.1400
3-5	20	4	20.4 (7.2–45.9)		20	2	10.2 (2.3–35.6)	
6-10	69	22	30.5 (20.5–42.6)		69	16	23.3 (14.2–35.8)	
≥11	393	110	28.6 (24.1–33.5)		394	56	14.4 (11.1–18.5)	
Партнерський статус								
живе сам	278	76	27.2 (22.1–33.0)	0.6266	278	40	14.2 (10.5–19.1)	0.5749
живе з партнером	221	63	29.3 (23.3–36.0)		222	35	16.1 (11.6–22.0)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	152	29	20.1 (14.1–27.9)	0.1162	152	14	8.6 (5.0–14.5)	0.0800
неповний робочий день або тимчасово	239	76	31.9 (26.0–38.3)		239	43	19.1 (14.3–25.0)	
безробітний	35	11	32.4 (18.0–51.1)		36	5	14.5 (5.6–32.8)	
інвалідність	45	13	28.6 (16.8–44.2)		45	7	14.3 (6.7–28.1)	
інші	28	10	37.0 (20.5–57.2)		28	6	21.1 (9.3–41.0)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	54	14	25.7 (15.3–39.8)	0.8790	54	10	19.0 (10.2–32.8)	0.7831
3-10 тис	187	55	28.9 (22.7–36.1)		187	29	14.7 (10.2–20.7)	
10-20 тис	169	46	27.9 (21.4–35.5)		169	22	13.4 (8.7–20.0)	
≥20 тис	63	15	23.8 (14.2–37.0)		63	8	13.0 (6.4–24.6)	
Був позбавлений волі будь-коли								

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
ні	317	78	24.9 (20.3–30.3)	0.0437	317	48	15.0 (11.3–19.6)	0.9203
так	182	61	33.8 (27.0–41.3)		183	27	15.3 (10.6–21.7)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	455	117	25.9 (21.9–30.3)	0.0002	455	60	13.7 (10.6–17.4)	0.0024
так	44	22	53.4 (38.1–68.1)		45	15	31.0 (19.0–46.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	478	126	26.6 (22.7–31.0)	0.0003	479	70	14.6 (11.6–18.3)	0.1522
так	21	13	64.0 (40.3–82.5)		21	5	26.7 (11.0–51.9)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	52	18	33.4 (21.3–48.1)	0.3886	52	11	19.5 (10.5–33.2)	0.3649
негативний	447	121	27.5 (23.4–32.0)		448	64	14.6 (11.4–18.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	251	78	31.8 (26.1–38.1)	0.0002	252	38	15.7 (11.5–21.0)	0.0128
стимулятори	123	16	13.4 (8.2–21.1)		123	9	7.4 (3.8–14.0)	
опі+стимул	122	45	36.1 (27.6–45.5)		122	28	21.9 (15.1–30.8)	
інші	3	0	0.0		3	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	333	108	32.3 (27.3–37.7)	0.0163	334	56	16.9 (13.1–21.6)	0.2645
стимулятори	160	30	19.8 (14.0–27.2)		160	18	11.3 (7.0–17.6)	
інші	6	1	19.3 (1.4–80.3)		6	1	19.3 (1.4–80.3)	

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	495	99.7	(98.8–99.9)	65	100.0		430	99.7	(98.7–99.9)	0.5907
N	497			65			432			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	369	74.6	(70.4–78.5)	51	80.0	(68.3–88.1)	318	73.9	(69.2–78.0)	0.2928
N	495			65			430			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	246	50.4	(45.7–55.0)	41	66.1	(53.4–76.8)	205	48.0	(43.1–53.0)	0.0078
N	491			65			426			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	224	90.5	(86.3–93.6)	41	100.0		183	88.6	(83.6–92.2)	0.0197
N	250			41			209			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	28	10.2	(7.1–14.6)	0	0.0		28	12.3	(8.5–17.5)	0.0149
N	248			41			207			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	2	0.7	(0.2–2.7)	0	0.0		2	0.8	(0.2–3.2)	0.5283
N	249			41			208			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										
так	182	37.3	(32.9–41.8)	8	14.4	(6.9–27.6)	174	40.7	(35.9–45.6)	0.0004
N	494			65			429			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	140	38.2	(33.1–43.5)	5	13.3	(5.3–29.7)	135	42.2	(36.7–48.0)	0.0012
N	369			51			318			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	88	36.2	(30.2–42.7)	5	16.1	(6.5–34.8)	83	40.4	(33.6–47.5)	0.0137
N	246			41			205			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так				0	0.0		0	0.0		
N				41			208			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	9	1.7	(0.9–3.2)	6	9.3	(4.1–19.6)	3	0.5	(0.2–1.7)	0.0000
N	494			65			429			
Надавав секс-послуги за гроші										
так	17	3.6	(2.1–5.8)	7	9.9	(4.6–20.0)	10	2.6	(1.3–5.0)	0.0052
N	495			65			430			
Платив за секс коли-небудь										
так	85	17.6	(14.3–21.5)	6	7.1	(3.1–15.4)	79	19.2	(15.5–23.5)	0.0091
N	494			65			429			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	9	9.3	(4.8–17.2)	1	13.5	(1.7–58.4)	8	9.0	(4.5–17.3)	0.6963
N	85			6			79			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	388	80.0	(76.1–83.3)	58	91.5	(82.4–96.1)	330	78.2	(73.9–82.0)	
випадковий	99	19.1	(15.8–22.9)	6	7.0	(3.0–15.6)	93	20.9	(17.2–25.1)	
ком. секс (я заплатив)	5	1.0	(0.4–2.3)	1	1.5	(0.2–10.2)	4	0.9	(0.3–2.4)	
ком. секс (мені заплатили)	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	492			65			427			
З ким останнім був секс										
чоловік	62	12.6	(9.9–16.0)	62	97.0	(90.8–99.1)	0	0.0		

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
жінка	432	87.4	(84.0–90.1)	3	3.0	(0.9–9.2)	429	100.0		
men and women	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	494			65			429			
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	469	95.0	(92.6–96.6)	65	100.0		404	94.2	(91.5–96.1)	0.0528
N	494			65			429			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	37	7.5	(5.4–10.3)	6	10.2	(4.5–21.5)	31	7.1	(5.0–10.0)	0.4178
N	494			65			429			
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	101	20.9	(17.4–25.0)	8	12.7	(6.3–23.9)	93	22.2	(18.3–26.6)	0.0907
N	494			65			429			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать					
	Разом			жінка		чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний									
так	224	90.5	(86.3–93.6)	41	100.0	183	88.6	(83.6–92.2)	0.0197
N	250			41		209			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий									
так	28	10.2	(7.1–14.6)	0	0.0	28	12.3	(8.5–17.5)	0.0149
N	248			41		207			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)									
так	2	0.7	(0.2–2.7)	0	0.0	2	0.8	(0.2–3.2)	0.5283
N	249			41		208			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні									
1	215	99.1	(96.5–99.8)	40	100.0	175	98.9	(95.7–99.7)	
2-4	2	0.9	(0.2–3.5)	0	0.0	2	1.1	(0.3–4.3)	
5+	0	0.0		0	0.0	0	0.0		
N	217			40		177			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові									
1	20	81.6	(61.9–92.3)	0	0.0	20	81.6	(61.9–92.3)	
2-4	4	14.2	(5.3–33.1)	0	0.0	4	14.2	(5.3–33.1)	
5+	1	4.2	(0.6–24.8)	0	0.0	1	4.2	(0.6–24.8)	
N	25			0		25			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього									
1	232	97.1	(94.2–98.6)	40	100.0	192	96.5	(93.0–98.3)	0.4494
2-4	6	2.1	(0.9–4.8)	0	0.0	6	2.6	(1.1–5.7)	
5+	2	0.8	(0.2–3.1)	0	0.0	2	1.0	(0.2–3.8)	
N	240			40		200			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)									

	Всього			Стать					
	Разом			жінка		чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	n	%	ДІ	p-значення
так				0	0.0	0	0.0		
N				41		208			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N		ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Разом	494	312	62.7 (58.2–67.1)	182	37.3 (32.9–41.8)	1.0000
Стать						
чоловік	429	255	59.3 (54.4–64.1)	174	40.7 (35.9–45.6)	0.0004
жінка	65	57	85.6 (72.4–93.1)	8	14.4 (6.9–27.6)	
Вікова категорія 4						
<25	8	4	45.1 (12.9–82.0)	4	54.9 (18.0–87.1)	0.0101
25-34	74	39	53.2 (41.2–64.8)	35	46.8 (35.2–58.8)	
35-44	277	167	60.2 (54.0–66.0)	110	39.8 (34.0–46.0)	
45+	135	102	74.2 (65.5–81.4)	33	25.8 (18.6–34.5)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно						
≤2	17	10	56.0 (30.5–78.7)	7	44.0 (21.3–69.5)	0.2251
3-5	20	16	82.6 (58.5–94.1)	4	17.4 (5.9–41.5)	
6-10	69	40	57.8 (45.3–69.4)	29	42.2 (30.6–54.7)	
≥11	388	246	62.8 (57.6–67.7)	142	37.2 (32.3–42.4)	
Партнерський статус						
живе сам	274	156	56.1 (49.9–62.2)	118	43.9 (37.8–50.1)	0.0020
живе з партнером	220	156	70.4 (63.7–76.4)	64	29.6 (23.6–36.3)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	150	90	59.3 (50.7–67.3)	60	40.7 (32.7–49.3)	0.1146
неповний робочий день або тимчасово	238	145	60.8 (54.1–67.0)	93	39.2 (33.0–45.9)	
безробітний	35	23	68.2 (49.9–82.2)	12	31.8 (17.8–50.1)	
інвалідність	43	30	67.6 (51.0–80.7)	13	32.4 (19.3–49.0)	
інші	28	24	85.5 (65.7–94.8)	4	14.5 (5.2–34.3)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	53	41	76.9 (62.3–87.0)	12	23.1 (13.0–37.7)	0.1647
3-10 тис	186	114	60.7 (53.1–67.8)	72	39.3 (32.2–46.9)	

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
	10-20 тис	167	99	59.4 (51.4–66.9)	68	40.6 (33.1–48.6)	
	≥20 тис	63	38	58.8 (45.2–71.2)	25	41.2 (28.8–54.8)	
Був позбавлений волі будь-коли							
	ні	313	191	60.8 (55.0–66.4)	122	39.2 (33.6–45.0)	0.2724
	так	181	121	66.1 (58.4–72.9)	60	33.9 (27.1–41.6)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	450	287	63.2 (58.4–67.8)	163	36.8 (32.2–41.6)	0.4862
так	44	25	57.7 (42.1–71.9)	19	42.3 (28.1–57.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	473	297	62.4 (57.7–66.8)	176	37.6 (33.2–42.3)	0.4128
так	21	15	71.6 (46.8–87.8)	6	28.4 (12.2–53.2)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	52	29	58.8 (44.0–72.2)	23	41.2 (27.8–56.0)	0.5547
негативний	442	283	63.2 (58.4–67.8)	159	36.8 (32.2–41.6)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	250	148	58.7 (52.2–64.9)	102	41.3 (35.1–47.8)	0.1353
стимулятори	120	85	69.7 (60.2–77.7)	35	30.3 (22.3–39.8)	
опі+стимул	121	76	63.5 (53.9–72.1)	45	36.5 (27.9–46.1)	
інші	3	3	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	331	200	60.7 (55.1–66.1)	131	39.3 (33.9–44.9)	0.1552
стимулятори	158	107	66.0 (57.7–73.4)	51	34.0 (26.6–42.3)	
інші	5	5	100.0	0	0.0	

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										
так	74	34.0	(27.7–40.8)	5	16.1	(6.5–34.8)	69	38.1	(31.0–45.7)	0.0245
N	224			41			183			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	21	70.2	(51.5–83.9)	0	0.0		21	70.2	(51.5–83.9)	
N	30			0			30			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	1	42.0	(4.3–92.1)	0	0.0		1	42.0	(4.3–92.1)	
N	2			0			2			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	47	21.5	(16.3–27.7)	4	14.2	(5.2–33.5)	43	23.1	(17.4–30.1)	0.1151
часто	14	6.2	(3.6–10.4)	1	1.9	(0.3–12.8)	13	7.2	(4.1–12.2)	
половина	12	5.6	(3.1–10.1)	0	0.0		12	6.9	(3.8–12.3)	
іноді	6	3.0	(1.3–6.8)	2	6.0	(1.4–22.0)	4	2.4	(0.8–6.4)	
рідко	11	4.6	(2.5–8.2)	1	2.3	(0.3–14.9)	10	5.1	(2.7–9.4)	
ніколи	133	59.1	(52.2–65.7)	33	75.6	(57.4–87.7)	100	55.2	(47.6–62.6)	
N	223			41			182			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	12	42.3	(25.6–61.1)	0	0.0		12	42.3	(25.6–61.1)	
часто	2	7.3	(1.8–25.0)	0	0.0		2	7.3	(1.8–25.0)	
половина	3	8.4	(2.6–23.8)	0	0.0		3	8.4	(2.6–23.8)	
іноді	1	4.5	(0.6–26.0)	0	0.0		1	4.5	(0.6–26.0)	
рідко	2	6.3	(1.5–22.4)	0	0.0		2	6.3	(1.5–22.4)	
ніколи	9	31.2	(16.9–50.4)	0	0.0		9	31.2	(16.9–50.4)	
N	29			0			29			
Частота використання презервативів: комерційний (я заплатив) партнер										
завжди	2	63.3	(13.3–95.1)	0	0.0		2	63.3	(13.3–95.1)	
часто	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
половина	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
іноді	1	36.7	(4.9–86.7)	0	0.0		1	36.7	(4.9–86.7)	
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	3			0			3			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

			Результат тесту на ВІЛ				
		N	позитивний		негативний		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	52	11.0 (8.4–14.4)	448	89.0 (85.6–91.6)	1.0000
Стать							
	чоловік	435	40	9.8 (7.1–13.3)	395	90.2 (86.7–92.9)	0.0265
	жінка	65	12	19.7 (11.2–32.1)	53	80.3 (67.9–88.8)	

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	8	0	0.0	8	100.0	0.0196
25-34	75	1	2.1 (0.3–13.5)	74	97.9 (86.5–99.7)	
35-44	280	29	10.8 (7.4–15.4)	251	89.2 (84.6–92.6)	
45+	137	22	17.2 (11.3–25.3)	115	82.8 (74.7–88.7)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно						
≤2	17	0	0.0	17	100.0	0.2695
3-5	20	2	10.2 (2.3–35.6)	18	89.8 (64.4–97.7)	
6-10	69	4	6.4 (2.3–16.6)	65	93.6 (83.4–97.7)	
≥11	394	46	12.4 (9.2–16.4)	348	87.6 (83.6–90.8)	
Партнерський статус						
живе сам	278	31	12.3 (8.6–17.2)	247	87.7 (82.8–91.4)	0.3919
живе з партнером	222	21	9.6 (6.2–14.7)	201	90.4 (85.3–93.8)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	152	6	5.4 (2.4–12.0)	146	94.6 (88.0–97.6)	0.0047
неповний робочий день або тимчасово	239	23	10.0 (6.6–14.9)	216	90.0 (85.1–93.4)	
безробітний	36	7	21.5 (9.7–41.3)	29	78.5 (58.7–90.3)	
інвалідність	45	12	24.8 (14.0–40.1)	33	75.2 (59.9–86.0)	
інші	28	4	16.8 (6.2–38.2)	24	83.2 (61.8–93.8)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	54	6	12.4 (5.0–27.3)	48	87.6 (72.7–95.0)	0.0292
3-10 тис	187	27	15.2 (10.4–21.8)	160	84.8 (78.2–89.6)	
10-20 тис	169	9	5.4 (2.8–10.1)	160	94.6 (89.9–97.2)	
≥20 тис	63	4	6.4 (2.2–17.1)	59	93.6 (82.9–97.8)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	317	24	8.0 (5.3–11.9)	293	92.0 (88.1–94.7)	0.0077
так	183	28	16.4 (11.4–23.2)	155	83.6 (76.8–88.6)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	455	45	10.6 (7.9–14.2)	410	89.4 (85.8–92.1)	0.3504
так	45	7	15.4 (7.2–29.9)	38	84.6 (70.1–92.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	479	47	10.5 (7.8–13.9)	432	89.5 (86.1–92.2)	0.0468
так	21	5	25.0 (10.1–49.8)	16	75.0 (50.2–89.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	252	30	12.3 (8.6–17.2)	222	87.7 (82.8–91.4)	0.7543
стимулятори	123	9	8.9 (4.5–16.9)	114	91.1 (83.1–95.5)	
опі+стимул	122	13	10.9 (6.0–18.8)	109	89.1 (81.2–94.0)	
інші	3	0	0.0	3	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	334	40	12.3 (9.0–16.7)	294	87.7 (83.3–91.0)	0.3732
стимулятори	160	12	8.7 (4.8–15.1)	148	91.3 (84.9–95.2)	
інші	6	0	0.0	6	100.0	




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)




Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)




Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N		ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	500	455	91.6 (88.9–93.8)	45	8.4 (6.2–11.1)	1.0000
Стать						
чоловік	435	402	93.1 (90.3–95.1)	33	6.9 (4.9–9.7)	0.0029
жінка	65	53	81.9 (70.2–89.7)	12	18.1 (10.3–29.8)	
Вікова категорія 4						
<25	8	6	75.3 (29.7–95.7)	2	24.7 (4.3–70.3)	0.2691
25-34	75	67	88.8 (78.6–94.5)	8	11.2 (5.5–21.4)	
35-44	280	256	92.2 (88.6–94.8)	24	7.8 (5.2–11.4)	
45+	137	126	92.9 (87.3–96.2)	11	7.1 (3.8–12.7)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно						
≤2	17	15	88.5 (60.2–97.5)	2	11.5 (2.5–39.8)	0.3972
3-5	20	20	100.0	0	0.0	
6-10	69	61	88.4 (77.9–94.2)	8	11.6 (5.8–22.1)	
≥11	394	359	91.9 (88.8–94.2)	35	8.1 (5.8–11.2)	
Партнерський статус						

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	278	257	92.6 (88.8–95.2)	21	7.4 (4.8–11.2)	0.3959
живе з партнером	222	198	90.5 (86.0–93.7)	24	9.5 (6.3–14.0)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	152	141	93.0 (87.5–96.2)	11	7.0 (3.8–12.5)	0.0204
неповний робочий день або тимчасово	239	223	94.1 (90.5–96.4)	16	5.9 (3.6–9.5)	
безробітний	36	31	87.5 (71.8–95.0)	5	12.5 (5.0–28.2)	
інвалідність	45	37	83.8 (69.9–92.0)	8	16.2 (8.0–30.1)	
інші	28	23	79.6 (58.5–91.6)	5	20.4 (8.4–41.5)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	54	50	93.3 (82.9–97.6)	4	6.7 (2.4–17.1)	0.5963
3-10 тис	187	173	93.3 (88.8–96.1)	14	6.7 (3.9–11.2)	
10-20 тис	169	156	92.1 (86.6–95.5)	13	7.9 (4.5–13.4)	
≥20 тис	63	54	88.3 (78.2–94.0)	9	11.7 (6.0–21.8)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	317	293	93.1 (89.8–95.4)	24	6.9 (4.6–10.2)	0.1223
так	183	162	89.1 (83.6–92.9)	21	10.9 (7.1–16.4)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	479	440	92.4 (89.6–94.4)	39	7.6 (5.6–10.4)	0.0025
так	21	15	73.6 (50.0–88.7)	6	26.4 (11.3–50.0)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	52	45	88.3 (76.6–94.6)	7	11.7 (5.4–23.4)	0.3504
негативний	448	410	92.0 (89.1–94.2)	38	8.0 (5.8–10.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	252	233	93.2 (89.5–95.7)	19	6.8 (4.3–10.5)	0.5280

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
стимулятори	123	110	89.7 (82.8–94.1)	13	10.3 (5.9–17.2)	
опі+стимул	122	109	90.2 (83.4–94.3)	13	9.8 (5.7–16.6)	
інші	3	3	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	334	309	93.1 (89.8–95.4)	25	6.9 (4.6–10.2)	0.1938
стимулятори	160	141	89.0 (83.1–93.0)	19	11.0 (7.0–16.9)	
інші	6	5	80.7 (19.7–98.6)	1	19.3 (1.4–80.3)	




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	90.1	89.9	92.3	0.6036
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	56.8	55.0	71.4	0.0325

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
невиявлений = непередаваний	51.8	50.3	64.3	0.0787
ПКП знижує ризик	55.7	54.8	62.8	0.3053
АРТ слід починати негайно	88.7	89.3	84.6	0.3301
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	63.6	62.5	72.2	0.1879
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	61.9	61.1	68.5	0.3200
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	95.1	94.7	97.8	0.3576
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	70.9	70.7	72.6	0.7861
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	85.7	85.7	85.2	0.9185
лікування слід починати негайно	88.4	87.6	95.0	0.0934
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	63.3	63.0	65.7	0.7152
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	5.0	5.2	3.5	0.5829
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	94.1	94.1	93.9	0.9589
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	56.5	55.6	63.8	0.2829
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	65.4	66.2	58.5	0.2878
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	5.3	5.5	3.6	0.5637
лікування слід починати негайно	88.6	89.0	85.5	0.4588
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	64.0	63.5	67.9	0.5536
ВГС на 100% передається від матері до дитини	5.7	5.5	6.8	0.7390
ВГС передається через кров і статевим шляхом	95.7	95.5	97.8	0.4533
лікування ВГС не існує	62.1	60.6	74.0	0.0743
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	77.9	77.2	83.4	0.3446
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	65.8	66.1	63.3	0.7075

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	454	91.0	(88.1–93.3)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	461	92.6	(89.8–94.6)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	162	35.4	(30.9–40.1)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	100	22.6	(18.8–27.0)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	453	98.0	(96.0–99.0)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	451	99.7	(98.6–99.9)
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	42	9.9	(7.3–13.4)
негативний	416	90.1	(86.6–92.7)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	169	37.2	(32.7–42.0)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	2	0.6	(0.1–2.2)
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	159	78.6	(72.4–83.8)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	12	7.7	(4.2–13.6)
негативний	146	91.6	(85.5–95.2)
не може розкрити	1	0.7	(0.1–4.9)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

			Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	449	287	64.6 (59.9–69.1)	162	35.4 (30.9–40.1)	1.0000
Стать							
	чоловік	393	255	65.7 (60.6–70.4)	138	34.3 (29.6–39.4)	0.2185
	жінка	56	32	57.0 (43.0–69.9)	24	43.0 (30.1–57.0)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	6	3	54.2 (13.9–89.6)	3	45.8 (10.4–86.1)	0.2068
25-34	71	50	69.8 (57.2–80.0)	21	30.2 (20.0–42.8)	
35-44	251	149	60.4 (54.0–66.5)	102	39.6 (33.5–46.0)	
45+	121	85	70.7 (61.4–78.5)	36	29.3 (21.5–38.6)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно						
≤2	13	10	79.7 (49.0–94.1)	3	20.3 (5.9–51.0)	0.4033
3-5	17	14	79.8 (45.6–94.9)	3	20.2 (5.1–54.4)	
6-10	63	40	64.8 (51.8–75.9)	23	35.2 (24.1–48.2)	
≥11	356	223	63.2 (57.9–68.3)	133	36.8 (31.7–42.1)	
Партнерський статус						
живе сам	244	156	63.6 (57.1–69.7)	88	36.4 (30.3–42.9)	0.6552
живе з партнером	205	131	65.7 (58.7–72.1)	74	34.3 (27.9–41.3)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	142	104	72.9 (64.5–80.0)	38	27.1 (20.0–35.5)	0.0272
неповний робочий день або тимчасово	217	135	63.8 (56.9–70.1)	82	36.2 (29.9–43.1)	
безробітний	32	15	44.8 (27.4–63.5)	17	55.2 (36.5–72.6)	
інвалідність	34	20	57.2 (39.3–73.4)	14	42.8 (26.6–60.7)	
інші	24	13	55.5 (34.7–74.5)	11	44.5 (25.5–65.3)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	45	25	56.5 (40.7–71.1)	20	43.5 (28.9–59.3)	0.1161
3-10 тис	164	104	63.4 (55.4–70.7)	60	36.6 (29.3–44.6)	
10-20 тис	158	112	72.3 (64.6–78.9)	46	27.7 (21.1–35.4)	
≥20 тис	60	34	58.3 (44.5–71.0)	26	41.7 (29.0–55.5)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	277	191	69.7 (63.7–75.0)	86	30.3 (25.0–36.3)	0.0065
так	172	96	56.4 (48.6–64.0)	76	43.6 (36.0–51.4)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	407	271	67.0 (62.0–71.6)	136	33.0 (28.4–38.0)	0.0007
так	42	16	39.5 (25.3–55.9)	26	60.5 (44.1–74.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	431	282	66.2 (61.4–70.7)	149	33.8 (29.3–38.6)	0.0004
так	18	5	25.3 (9.9–51.0)	13	74.7 (49.0–90.1)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	44	16	34.7 (21.2–51.1)	28	65.3 (48.9–78.8)	0.0000
негативний	405	271	68.1 (63.3–72.6)	134	31.9 (27.4–36.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	230	135	59.5 (52.8–65.9)	95	40.5 (34.1–47.2)	0.0976
стимулятори	103	76	73.2 (63.2–81.4)	27	26.8 (18.6–36.8)	
опі+стимул	113	74	66.9 (57.0–75.4)	39	33.1 (24.6–43.0)	
інші	3	2	65.3 (0.9–99.7)	1	34.7 (0.3–99.1)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	307	185	61.4 (55.5–66.9)	122	38.6 (33.1–44.5)	0.0380
стимулятори	136	99	72.7 (64.1–79.9)	37	27.3 (20.1–35.9)	
інші	6	3	42.6 (8.1–86.2)	3	57.4 (13.8–91.9)	

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	52	76.7 (63.1–86.4)	1.0000	39	69.3 (51.0–83.1)	1.0000	29	21	73.4 (53.9–86.7)	1.0000
Стать											
	чоловік	40	77.7 (62.1–88.1)	0.7724	30	73.3 (51.0–87.8)	0.3429	24	18	74.3 (52.2–88.4)	0.8214
	жінка	12	73.5 (41.9–91.5)		9	55.3 (23.7–83.1)		5	3	69.4 (25.8–93.7)	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4										
<25	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
25-34	1	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
35-44	29	77.9 (59.3–89.5)		22	66.9 (42.5–84.6)		16	9	59.8 (34.6–80.7)	
45+	22	80.3 (59.1–92.0)		17	72.3 (43.3–89.9)		13	12	88.7 (49.7–98.4)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно										
≤2	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
3-5	2	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
6-10	4	41.1 (8.4–84.2)		2	45.7 (4.8–93.4)		1	1	100.0	
≥11	46	83.3 (70.0–91.4)		37	70.4 (51.4–84.2)		28	20	72.7 (52.8–86.3)	
Партнерський статус										
живе сам	31	73.1 (54.6–86.0)	0.4583	22	86.4 (56.6–96.8)	0.0283	20	14	70.1 (46.1–86.5)	0.5147
живе з партнером	21	82.1 (59.6–93.5)		17	46.7 (24.2–70.7)		9	7	81.5 (46.4–95.7)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	6	100.0	0.5710	6	73.1 (23.6–96.0)	0.0081	5	3	56.4 (17.0–89.1)	
неповний робочий день або тимчасово	23	70.3 (48.3–85.7)		16	92.7 (62.4–99.0)		15	12	81.9 (54.8–94.4)	
безробітний	7	72.4 (30.6–94.0)		5	23.2 (4.2–67.6)		2	1	53.2 (6.0–95.3)	
інвалідність	12	76.4 (44.8–92.8)		9	78.4 (41.2–95.0)		7	5	74.2 (33.6–94.2)	
інші	4	73.7 (20.7–96.8)		3	0.0		0	0	0.0	
Категорія місячного доходу										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	6	100.0	0.3972	6	49.3 (13.2–86.2)	0.6440	4	4	100.0	0.5988
3-10 тис	27	74.3 (54.6–87.4)		19	75.0 (47.3–90.9)		15	10	68.3 (40.9–87.0)	
10-20 тис	9	76.2 (39.3–94.0)		7	82.7 (36.0–97.6)		6	4	62.2 (22.7–90.2)	
≥20 тис	4	100.0		4	71.5 (19.1–96.4)		3	2	79.5 (24.3–97.9)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	24	76.2 (54.8–89.4)	0.9351	18	72.6 (44.0–89.9)	0.7271	14	8	57.8 (31.0–80.6)	0.0745
так	28	77.2 (58.1–89.2)		21	66.6 (42.0–84.7)		15	13	87.7 (60.1–97.1)	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	45	78.1 (63.6–87.9)	0.5217	34	71.2 (51.2–85.3)	0.4417	26	20	77.3 (56.5–89.9)	0.0523
так	7	66.5 (26.4–91.6)		5	53.1 (14.8–88.1)		3	1	27.0 (3.0–81.5)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	47	74.4 (59.8–85.0)	0.2044	34	74.2 (53.7–87.7)	0.0647	27	20	75.3 (55.1–88.3)	0.3024
так	5	100.0		5	33.1 (6.7–77.2)		2	1	42.0 (3.6–93.3)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	52	76.7 (62.8–86.6)		39	69.3 (50.6–83.3)		29	21	73.4 (53.5–86.9)	
негативний	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	р-значення	N	% (ДІ)	р-значення	N	n	% (ДІ)	р-значення
опіоїди	30	81.6 (62.2–92.2)		25	75.3 (54.3–88.7)		19	15	78.9 (54.4–92.2)	
стимулятори	9	72.0 (37.4–91.7)		6	55.6 (17.2–88.3)		4	3	84.2 (34.9–98.2)	
опі+стимул	13	69.6 (41.0–88.3)		8	65.0 (24.4–91.4)		6	3	48.5 (14.2–84.3)	
інші	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	40	81.0 (65.4–90.6)		32	74.6 (54.4–87.8)		25	18	71.5 (50.0–86.3)	
стимулятори	12	64.0 (34.8–85.6)		7	49.6 (16.6–83.0)		4	3	84.2 (35.0–98.1)	
інші	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	4	13.9	(4.9–33.7)
1-2 тижні тому	2	8.8	(2.2–29.3)
3-4 тижні тому	2	6.9	(1.7–23.9)
1-3 місяці тому	1	2.2	(0.3–14.4)
ніколи	22	68.1	(48.5–82.9)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	3	32.0	(9.6–67.7)
ліків не було	1	16.8	(2.4–62.6)
був під впливом	1	10.3	(1.4–48.7)
не хотів, щоб інші бачили	1	16.8	(2.4–62.6)
інші	2	24.2	(5.5–63.8)
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	4	44.7	(16.8–76.5)
відсутність часу на відвідування клініки	4	48.1	(19.0–78.6)
відсутність мотивації відвідувати клініку	4	59.3	(26.1–85.7)
пропуск візиту, важко повернутися	2	16.5	(3.8–49.4)
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	2	25.6	(6.0–64.7)
вживання наркотиків	3	41.5	(12.8–77.4)
побічні ефекти або ускладнення	3	41.5	(12.8–77.4)
немає розуміння як	1	8.4	(1.1–43.0)
втрачено або продано всі АРВ-препарати	2	14.4	(3.2–46.2)
Причини відмови від ДРТ			
вживання алкоголю	3	34.7	(10.0–71.8)

		n	%	ДІ
Причини відмови від АРТ				
	довго чекав і пішов	2	11.4	(2.5–39.1)
Час на АРТ				
	≤3м	0	0.0	
	4-24м	2	18.6	(3.8–56.6)
	25-60м	1	4.4	(0.6–26.7)
	5 років +	9	77.0	(42.2–93.9)

9. Доконтактна профілактика




Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців						
		N	приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Всього								
	Разом	500	2	0.5 (0.1–2.0)	10	2.0 (1.1–3.8)	488	97.5 (95.5–98.6)
Стать								
	чоловік	435	1	0.4 (0.1–2.5)	8	1.9 (0.9–4.0)	426	97.7 (95.5–98.8)
	жінка	65	1	1.3 (0.2–8.7)	2	2.6 (0.6–10.2)	62	96.2 (88.4–98.8)
Вікова категорія 4								
	<25	8	0	0.0	0	0.0	8	100.0
	25-34	75	1	1.1 (0.1–7.4)	0	0.0	74	98.9 (92.6–99.9)
	35-44	280	1	0.6 (0.1–4.0)	8	2.9 (1.4–5.9)	271	96.6 (93.2–98.3)
	45+	137	0	0.0	2	1.6 (0.4–6.1)	135	98.4 (93.9–99.6)
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно								
	≤2	17	0	0.0	0	0.0	17	100.0
	3-5	20	0	0.0	0	0.0	20	100.0
	6-10	69	1	1.2 (0.2–8.4)	0	0.0	68	98.8 (91.6–99.8)
	≥11	394	1	0.4 (0.1–2.8)	10	2.6 (1.3–4.9)	383	97.0 (94.6–98.4)
Партнерський статус								
	живе сам	278	0	0.0	4	1.4 (0.5–3.8)	274	98.6 (96.2–99.5)
	живе з партнером	222	2	1.0 (0.2–4.4)	6	2.7 (1.2–6.3)	214	96.2 (92.3–98.2)
Поточний статус зайнятості								

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців					
	N	приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
повний робочий день	152	1	1.0 (0.1–6.8)	2	1.4 (0.3–6.1)	149	97.6 (92.3–99.3)
неповний робочий день або тимчасово	239	0	0.0	6	2.7 (1.2–6.0)	233	97.3 (94.0–98.8)
безробітний	36	0	0.0	0	0.0	36	100.0
інвалідність	45	0	0.0	1	1.6 (0.2–11.2)	44	98.4 (88.8–99.8)
інші	28	1	3.0 (0.4–20.0)	1	3.6 (0.5–23.0)	26	93.5 (75.8–98.5)
Категорія місячного доходу							
<3 тис	54	0	0.0	2	4.1 (1.0–15.5)	52	95.9 (84.5–99.0)
3-10 тис	187	1	0.4 (0.1–3.0)	2	0.9 (0.2–3.6)	184	98.7 (95.9–99.6)
10-20 тис	169	0	0.0	5	3.2 (1.2–7.9)	164	96.8 (92.1–98.8)
≥20 тис	63	1	2.4 (0.3–15.7)	1	1.5 (0.2–10.2)	61	96.1 (84.9–99.1)
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	317	1	0.3 (0.0–1.8)	5	1.3 (0.6–3.2)	311	98.4 (96.4–99.3)
так	183	1	0.9 (0.1–6.0)	5	3.2 (1.3–7.8)	177	95.9 (90.9–98.2)

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців					
	N	приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	455	2	0.5 (0.1–2.2)	6	1.5 (0.7–3.4)	447	98.0 (95.9–99.0)
так	45	0	0.0	4	7.6 (2.7–19.2)	41	92.4 (80.8–97.3)
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	479	2	0.5 (0.1–2.1)	9	2.0 (1.0–3.8)	468	97.5 (95.5–98.7)
так	21	0	0.0	1	3.5 (0.4–23.5)	20	96.5 (76.5–99.6)
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	52	1	2.8 (0.4–18.3)	1	1.3 (0.2–8.9)	50	95.9 (83.2–99.1)
негативний	448	1	0.2 (0.0–1.3)	9	2.1 (1.1–4.1)	438	97.7 (95.7–98.8)
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
опіоїди	252	1	0.3 (0.0–2.3)	4	1.7 (0.6–4.7)	247	97.9 (95.0–99.2)
стимулятори	123	0	0.0	2	1.1 (0.3–4.5)	121	98.9 (95.5–99.7)
опі+стимул	122	1	1.3 (0.2–8.6)	4	3.6 (1.3–9.5)	117	95.2 (88.5–98.1)

	N	Використання ДКП протягом останніх 12 місяців					
		приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
інші	3	0	0.0	0	0.0	3	100.0
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання							
опіоїди	334	2	0.7 (0.2–3.0)	5	1.6 (0.7–4.0)	327	97.6 (95.0–98.9)
стимулятори	160	0	0.0	4	2.3 (0.8–6.4)	156	97.7 (93.6–99.2)
інші	6	0	0.0	1	19.3 (1.4–80.3)	5	80.7 (19.7–98.6)

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	2	0.5	(0.1–2.0)
приймав в минулому	0	0.0	
ніколи не приймав	10	2.0	(1.1–3.8)
не знає що це	488	97.5	(95.5–98.6)
Обізнаність про ДКП			
ні	488	97.5	(95.5–98.6)
так	12	2.5	(1.4–4.5)
Використання ДКП зараз			
ні	498	99.5	(98.0–99.9)
так	2	0.5	(0.1–2.0)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	10	81.0	(46.2–95.5)
так	2	19.0	(4.5–53.8)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)



Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)




Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	1	5.1	(0.7–28.6)
клініка закрита після лютого 2022 року	0	0.0	
слабкий або відсутній ефект	7	28.4	(13.6–50.1)
побічні ефекти	5	20.6	(8.5–41.9)
не хочу відвідувати клініку	6	22.5	(10.0–43.2)
не хочу кидати наркотики	7	28.7	(13.7–50.5)
важко дістатися до клініки	2	7.0	(1.7–24.9)
не потребує	6	26.2	(11.8–48.5)
не подобається ставлення лікаря	4	18.1	(6.6–41.0)
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	1	6.2	(0.9–33.3)
не змінилось	11	47.4	(27.9–67.8)

	n	%	ДІ
зменшилося	11	46.3	(26.9–66.9)
Чи купував бупренорфін або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	203	40.5	(36.0–45.0)
так, бупренорфін	7	1.4	(0.6–3.0)
не купував	289	58.2	(53.6–62.6)
Де купував бупренорфін або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	289	58.2	(53.6–62.6)
купляв на чорн. ринку	210	41.8	(37.4–46.4)
купляв в приватній клініці	0	0.0	
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорному ринку			
ін'єкційно	203	96.7	(93.1–98.4)
ін'єкційно у суміші	0	0.0	
ковтав або розсмоктував	6	3.0	(1.3–6.6)
нюхав	1	0.3	(0.0–2.4)

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

			Отримував ЗПТ (з усіх)								
		N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	500	21	4.0 (2.6–6.2)	18	4.1 (2.6–6.5)	41	7.5 (5.5–10.1)	420	84.4 (80.9–87.4)	1.0000
Стать											
	чоловік	435	16	3.5 (2.1–5.7)	13	3.5 (2.0–6.0)	38	7.9 (5.7–10.8)	368	85.1 (81.4–88.2)	0.0967
	жінка	65	5	7.6 (3.1–17.4)	5	8.4 (3.4–19.3)	3	4.4 (1.4–13.4)	52	79.6 (67.4–88.1)	
Вікова категорія 4											
	<25	8	1	10.0 (0.9–58.4)	0	0.0	1	11.8 (1.0–63.0)	6	78.2 (33.7–96.2)	0.5360
	25-34	75	4	5.0 (1.8–13.0)	1	1.1 (0.1–7.4)	5	6.5 (2.6–15.3)	65	87.4 (77.6–93.3)	
	35-44	280	11	3.7 (2.0–6.7)	12	4.9 (2.8–8.7)	29	9.4 (6.5–13.3)	228	82.0 (76.9–86.2)	
	45+	137	5	3.7 (1.5–9.0)	5	4.4 (1.8–10.4)	6	3.9 (1.7–8.7)	121	88.0 (80.9–92.7)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно											
	≤2	17	1	4.6 (0.5–30.3)	0	0.0	1	5.5 (0.7–34.3)	15	89.8 (63.9–97.8)	0.6361
	3-5	20	1	3.3 (0.4–22.8)	0	0.0	3	12.8 (3.6–36.3)	16	83.9 (60.8–94.6)	
	6-10	69	1	1.2 (0.2–8.4)	1	1.8 (0.2–11.9)	8	10.5 (5.1–20.2)	59	86.5 (76.1–92.8)	
	≥11	394	18	4.5 (2.8–7.1)	17	4.9 (3.0–7.9)	29	6.7 (4.7–9.7)	330	83.8 (79.7–87.3)	

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
Партнерський статус										
живе сам	278	11	3.6 (2.0–6.6)	10	4.4 (2.3–8.1)	25	8.1 (5.4–11.9)	232	83.9 (78.9–87.9)	0.8966
живе з партнером	222	10	4.4 (2.4–8.2)	8	3.8 (1.8–7.7)	16	6.7 (4.1–10.9)	188	85.0 (79.6–89.3)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	152	3	1.6 (0.5–5.1)	5	3.3 (1.3–8.1)	9	5.1 (2.6–9.8)	135	90.0 (84.1–93.9)	0.0411
неповний робочий день або тимчасово	239	12	5.2 (2.9–9.1)	4	2.1 (0.8–5.6)	25	9.6 (6.5–14.0)	198	83.1 (77.7–87.5)	
безробітний	36	0	0.0	2	7.0 (1.6–25.6)	2	5.0 (1.1–19.9)	32	88.0 (70.3–95.8)	
інвалідність	45	4	7.3 (2.6–18.7)	4	11.4 (4.2–27.3)	3	7.1 (2.2–20.9)	34	74.2 (58.3–85.6)	
інші	28	2	8.0 (1.9–28.3)	3	11.0 (3.3–30.5)	2	7.1 (1.7–25.7)	21	73.9 (53.4–87.6)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	54	1	1.8 (0.2–12.4)	3	7.1 (2.2–20.5)	9	15.7 (8.1–28.4)	41	75.3 (61.2–85.6)	0.0949
3-10 тис	187	12	6.8 (3.8–11.7)	5	3.1 (1.2–7.6)	13	6.3 (3.6–10.8)	157	83.8 (77.5–88.6)	
10-20 тис	169	4	1.8 (0.7–4.7)	8	5.2 (2.6–10.3)	12	6.6 (3.7–11.4)	145	86.5 (80.3–90.9)	
≥20 тис	63	3	3.4 (1.1–10.3)	2	3.3 (0.8–12.7)	4	5.1 (1.8–13.4)	54	88.2 (78.1–94.0)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	317	10	2.9 (1.5–5.3)	11	3.6 (1.9–6.5)	28	8.0 (5.5–11.4)	268	85.6 (81.2–89.0)	0.3022
так	183	11	6.0 (3.3–10.8)	7	5.0 (2.4–10.2)	13	6.6 (3.8–11.2)	152	82.4 (75.8–87.5)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	455	15	3.2 (1.9–5.4)	11	2.9 (1.6–5.2)	38	7.6 (5.5–10.4)	391	86.3 (82.7–89.2)	0.0000
так	45	6	12.6 (5.5–26.2)	7	17.7 (8.5–33.3)	3	5.7 (1.7–17.1)	29	64.0 (48.3–77.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
ні	479	0	0.0	18	4.3 (2.7–6.8)	41	7.8 (5.7–10.5)	420	87.9 (84.6–90.6)	0.0000
так	21	21	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	52	5	9.1 (3.7–20.8)	4	9.6 (3.5–23.6)	3	5.6 (1.7–16.8)	40	75.7 (61.1–86.1)	0.0434
негативний	448	16	3.4 (2.0–5.5)	14	3.4 (2.0–5.8)	38	7.7 (5.6–10.5)	380	85.5 (81.8–88.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	252	15	6.1 (3.6–10.0)	14	6.9 (4.1–11.4)	20	7.7 (5.0–11.8)	203	79.3 (73.5–84.1)	0.0251
стимулятори	123	2	1.2 (0.3–4.8)	2	1.7 (0.4–6.8)	13	8.9 (5.1–15.0)	106	88.2 (81.4–92.7)	
опі+стимул	122	4	2.8 (1.0–7.3)	2	1.0 (0.2–4.0)	8	5.7 (2.8–11.2)	108	90.6 (84.4–94.5)	
інші	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	334	19	5.5 (3.5–8.7)	13	4.8 (2.8–8.2)	26	7.4 (5.0–10.8)	276	82.2 (77.5–86.1)	0.0486
стимулятори	160	2	0.9 (0.2–3.7)	4	2.1 (0.8–5.8)	15	7.9 (4.7–12.9)	139	89.1 (83.5–92.9)	
інші	6	0	0.0	1	19.3 (1.4–80.3)	0	0.0	5	80.7 (19.7–98.6)	




Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)



Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)




Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

		n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь				
	так	206	40.8	(36.3–45.3)
Кількість передозувань протягом життя				
	1	65	30.1	(24.1–36.9)
	2-4	85	41.1	(34.3–48.3)
	5+	56	28.8	(22.7–35.8)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	так	31	6.3	(4.4–8.9)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)				
	так	31	15.4	(10.9–21.3)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців				
	1	23	76.3	(58.5–88.0)

	n	%	ДІ
2-4	7	21.1	(10.1–38.9)
5+	1	2.6	(0.4–16.4)
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)			
метадон	16	59.9	(38.3–78.1)
інші опіоїди	1	3.3	(0.5–20.3)
стимулятор	7	36.8	(19.1–59.0)
інші	0	0.0	
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)			
метадон+стимулятор	3	77.7	(26.2–97.1)
метадон+барбіт. або димедр.	1	22.3	(2.9–73.8)
метадон+інше	0	0.0	
інші	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)			
метадон	1	29.8	(3.5–83.3)
інші опіоїди	1	48.6	(7.8–91.4)
стимулятор	1	21.6	(2.4–75.8)
інші	0	0.0	
Знання та досвід налоксону			
ніколи не чув	163	32.4	(28.2–36.8)
знає, але не користувався	278	55.8	(51.2–60.3)
користувався	56	11.2	(8.6–14.4)
користувались друзі	1	0.2	(0.0–1.4)
користувався сам та друзі	2	0.5	(0.1–2.0)

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	500	469	93.7 (91.1–95.6)	31	6.3 (4.4–8.9)	1.0000
Стать						
чоловік	435	407	93.5 (90.6–95.6)	28	6.5 (4.4–9.4)	0.6210
жінка	65	62	95.2 (85.7–98.5)	3	4.8 (1.5–14.3)	
Вікова категорія 4						
<25	8	6	78.2 (33.7–96.2)	2	21.8 (3.8–66.3)	0.2592
25-34	75	70	93.7 (85.2–97.4)	5	6.3 (2.6–14.8)	
35-44	280	261	93.2 (89.4–95.7)	19	6.8 (4.3–10.6)	
45+	137	132	95.7 (89.6–98.3)	5	4.3 (1.7–10.4)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно						
≤2	17	14	83.0 (55.3–95.0)	3	17.0 (5.0–44.7)	0.1455

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	20	20	100.0	0	0.0	
6-10	69	66	96.1 (88.2–98.8)	3	3.9 (1.2–11.8)	
≥11	394	369	93.5 (90.3–95.6)	25	6.5 (4.4–9.7)	
Партнерський статус						
живе сам	278	260	93.7 (90.0–96.0)	18	6.3 (4.0–10.0)	0.9507
живе з партнером	222	209	93.8 (89.4–96.5)	13	6.2 (3.5–10.6)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	152	147	95.9 (90.4–98.3)	5	4.1 (1.7–9.6)	0.3655
неповний робочий день або тимчасово	239	220	92.2 (87.9–95.1)	19	7.8 (4.9–12.1)	
безробітний	36	32	89.5 (73.8–96.2)	4	10.5 (3.8–26.2)	
інвалідність	45	44	97.8 (85.1–99.7)	1	2.2 (0.3–14.9)	
інші	28	26	92.9 (74.3–98.3)	2	7.1 (1.7–25.7)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	54	53	98.2 (87.6–99.8)	1	1.8 (0.2–12.4)	0.5345
3-10 тис	187	176	93.9 (89.1–96.7)	11	6.1 (3.3–10.9)	
10-20 тис	169	157	92.8 (87.4–96.0)	12	7.2 (4.0–12.6)	
≥20 тис	63	58	92.1 (81.9–96.8)	5	7.9 (3.2–18.1)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	317	297	93.7 (90.3–96.0)	20	6.3 (4.0–9.7)	0.9968
так	183	172	93.7 (88.8–96.6)	11	6.3 (3.4–11.2)	

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	455	427	93.7 (91.0–95.7)	28	6.3 (4.3–9.0)	0.9410
так	45	42	93.5 (81.0–98.0)	3	6.5 (2.0–19.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	479	450	93.8 (91.1–95.7)	29	6.2 (4.3–8.9)	0.7930
так	21	19	92.5 (72.1–98.3)	2	7.5 (1.7–27.9)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	52	50	95.4 (82.4–98.9)	2	4.6 (1.1–17.6)	0.6333
негативний	448	419	93.5 (90.7–95.5)	29	6.5 (4.5–9.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	252	243	96.6 (93.5–98.2)	9	3.4 (1.8–6.5)	0.0015
стимулятори	123	118	95.3 (88.7–98.2)	5	4.7 (1.8–11.3)	
опі+стимул	122	105	86.3 (78.6–91.5)	17	13.7 (8.5–21.4)	
інші	3	3	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	334	312	93.5 (90.2–95.8)	22	6.5 (4.2–9.8)	0.8345
стимулятори	160	151	93.9 (88.3–96.9)	9	6.1 (3.1–11.7)	
інші	6	6	100.0	0	0.0	

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	500	163	32.4 (28.2–36.8)	279	56.0 (51.4–60.5)	58	11.6 (9.0–14.9)	1.0000
Стать								
чоловік	435	142	32.4 (28.0–37.1)	240	55.4 (50.5–60.2)	53	12.2 (9.4–15.8)	0.5587
жінка	65	21	32.1 (21.3–45.3)	39	60.2 (47.1–72.0)	5	7.6 (3.1–17.7)	
Вікова категорія 4								
<25	8	4	57.8 (20.0–88.2)	4	42.2 (11.8–80.0)	0	0.0	0.2058

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
25-34	75	28	37.5 (26.8–49.6)	43	56.4 (44.3–67.7)	4	6.1 (2.2–15.7)	
35-44	280	86	30.2 (24.9–36.1)	153	55.0 (48.8–61.0)	41	14.8 (10.9–19.7)	
45+	137	45	32.3 (24.6–41.0)	79	58.7 (49.8–67.0)	13	9.1 (5.2–15.3)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно								
≤2	17	7	44.0 (21.3–69.5)	10	56.0 (30.5–78.7)	0	0.0	0.0081
3-5	20	7	30.6 (13.6–55.2)	11	62.0 (37.8–81.4)	2	7.5 (1.6–28.7)	
6-10	69	33	47.1 (35.1–59.4)	35	51.7 (39.5–63.8)	1	1.2 (0.2–8.4)	
≥11	394	116	29.4 (24.9–34.4)	223	56.4 (51.2–61.5)	55	14.1 (10.9–18.1)	
Партнерський статус								
живе сам	278	104	36.3 (30.7–42.3)	142	52.3 (46.1–58.4)	32	11.4 (8.1–15.9)	0.1430
живе з партнером	222	59	27.8 (21.9–34.4)	137	60.4 (53.4–66.9)	26	11.9 (8.1–17.1)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	152	52	34.0 (26.5–42.4)	90	59.3 (50.9–67.3)	10	6.6 (3.5–12.2)	0.5721
неповний робочий день або тимчасово	239	74	30.7 (25.0–37.1)	134	56.0 (49.4–62.4)	31	13.3 (9.4–18.5)	
безробітний	36	11	33.6 (19.0–52.1)	20	53.0 (35.4–69.9)	5	13.5 (5.2–30.6)	
інвалідність	45	16	34.7 (21.8–50.3)	22	50.8 (35.7–65.7)	7	14.5 (6.7–28.5)	
інші	28	10	31.7 (16.9–51.4)	13	48.8 (30.1–67.8)	5	19.5 (8.0–40.3)	
Категорія місячного доходу								

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	54	17	30.3 (19.1–44.4)	30	56.6 (42.3–69.8)	7	13.2 (6.1–26.2)	0.6805
3-10 тис	187	60	31.8 (25.2–39.1)	112	60.7 (53.2–67.7)	15	7.5 (4.5–12.3)	
10-20 тис	169	53	30.4 (23.7–38.0)	95	56.1 (48.2–63.8)	21	13.5 (8.8–20.1)	
≥20 тис	63	20	34.5 (22.9–48.3)	35	52.8 (39.5–65.8)	8	12.7 (6.2–24.2)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	317	111	34.8 (29.5–40.4)	178	56.1 (50.3–61.7)	28	9.2 (6.3–13.2)	0.0614
так	183	52	28.2 (21.9–35.4)	101	55.9 (48.3–63.2)	30	15.9 (11.2–22.1)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	455	154	33.5 (29.1–38.1)	254	56.1 (51.2–60.8)	47	10.5 (7.9–13.8)	0.0144
так	45	9	20.3 (10.5–35.5)	25	55.3 (40.0–69.7)	11	24.4 (13.6–39.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	479	159	33.1 (28.8–37.6)	264	55.1 (50.4–59.7)	56	11.8 (9.1–15.2)	0.1086
так	21	4	15.8 (5.5–37.8)	15	76.7 (54.2–90.1)	2	7.5 (1.7–27.9)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	52	11	19.6 (10.7–33.2)	30	61.8 (47.3–74.5)	11	18.6 (10.1–31.6)	0.0614
негативний	448	152	33.9 (29.5–38.7)	249	55.3 (50.4–60.0)	47	10.8 (8.1–14.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	252	72	28.3 (22.9–34.4)	149	58.9 (52.5–65.0)	31	12.8 (9.0–17.8)	0.0521
стимулятори	123	57	44.5 (35.5–53.8)	56	47.6 (38.4–56.9)	10	8.0 (4.2–14.6)	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
опі+стимул	122	34	29.0 (21.0–38.4)	71	57.9 (48.3–66.9)	17	13.1 (8.1–20.6)	
інші	3	0	0.0	3	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	334	92	27.6 (22.9–32.9)	199	59.6 (54.0–65.0)	43	12.8 (9.5–17.0)	0.0150
стимулятори	160	70	42.8 (35.0–51.0)	76	48.3 (40.2–56.4)	14	8.9 (5.2–14.8)	
інші	6	1	16.3 (1.1–76.8)	4	64.4 (15.8–94.6)	1	19.3 (1.4–80.3)	

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	54	11.1	(8.5–14.4)
	гепатит C	177	36.5	(32.1–41.1)
	сифіліс	7	1.4	(0.6–3.1)
	гонорея	10	2.0	(1.1–3.8)
	хламідіоз	8	1.5	(0.8–3.1)
	герпес	62	13.0	(10.1–16.5)
	папіломавірус	14	2.9	(1.7–4.9)
	туберкульоз	31	6.1	(4.3–8.7)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	27	56.2	(42.3–69.2)
	пролікувався неуспішно	3	4.9	(1.5–14.4)
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	2	3.2	(0.8–12.2)
	ніколи не лікувався	21	35.7	(23.9–49.7)
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	70	41.2	(33.8–49.0)
	пролікувався неуспішно	9	5.1	(2.6–9.7)
	не завершив	8	4.8	(2.3–9.4)
	зараз лікується	8	4.5	(2.2–8.9)
	ніколи не лікувався	79	44.5	(37.0–52.2)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	7	100.0	
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	0	0.0	
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	30	96.1	(76.7–99.4)
	пролікувався неуспішно	1	3.9	(0.6–23.3)
	не завершив	0	0.0	

	n	%	ДІ
зараз лікується	0	0.0	
ніколи не лікувався	0	0.0	

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

	n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців			
так	217	43.1	(38.6–47.7)
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	190	38.3	(34.0–42.9)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	159	83.5	(77.3–88.3)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	56	30.9	(24.4–38.3)
приватна клініка	10	5.1	(2.7–9.4)
приватна лабораторія	19	9.9	(6.2–15.5)
протитуберкульозного диспансеру	1	0.6	(0.1–4.3)
наркологічний диспансер	4	1.9	(0.7–5.0)
ІПСШ	2	0.7	(0.2–2.7)
швидкої допомоги	26	13.7	(9.3–19.7)
мобільна амбулаторія	0	0.0	
інше	20	10.2	(6.5–15.5)
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	149	78.0	(71.2–83.5)
лікарня, ВІЛ-клініка	17	9.6	(6.0–15.1)
приватна клініка	8	4.2	(2.1–8.3)
приватна лабораторія	5	2.4	(1.0–5.8)
протитуберкульозний диспансер	1	0.6	(0.1–4.3)
наркологічна клініка	4	2.1	(0.8–5.9)
ІПСШ клініка	0	0.0	
швидка допомога	3	1.5	(0.5–4.7)
мобільна клініка	0	0.0	
інші	3	1.5	(0.5–4.9)
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	183	97.3	(94.3–98.7)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	409	81.3	(77.4–84.7)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	17	4.6	(2.8–7.3)
раз на місяць	81	19.2	(15.6–23.5)
3-4 рази в 12 місяців	111	27.8	(23.5–32.6)
тільки один раз	199	48.4	(43.4–53.5)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Всього	498	443	88.7 (85.4–91.3)	55	11.3 (8.7–14.6)	1.0000
Стать							
	чоловік	433	382	87.8 (84.2–90.7)	51	12.2 (9.3–15.8)	0.0993
	жінка	65	61	94.5 (85.9–98.0)	4	5.5 (2.0–14.1)	
Вікова категорія 4							
	<25	8	7	85.3 (31.4–98.7)	1	14.7 (1.3–68.6)	0.5038
	25-34	75	67	87.5 (76.4–93.8)	8	12.5 (6.2–23.6)	
	35-44	278	243	87.2 (82.5–90.8)	35	12.8 (9.2–17.5)	
	45+	137	126	92.4 (86.4–95.9)	11	7.6 (4.1–13.6)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно							
	≤2	17	15	87.6 (58.6–97.2)	2	12.4 (2.8–41.4)	0.9330
	3-5	20	17	84.1 (58.3–95.3)	3	15.9 (4.7–41.7)	
	6-10	69	62	89.0 (78.1–94.9)	7	11.0 (5.1–21.9)	
	≥11	392	349	88.9 (85.2–91.8)	43	11.1 (8.2–14.8)	
Партнерський статус							

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	276	242	87.8 (83.2–91.3)	34	12.2 (8.7–16.8)	0.5200
живе з партнером	222	201	89.7 (84.5–93.3)	21	10.3 (6.7–15.5)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	151	139	91.5 (85.5–95.2)	12	8.5 (4.8–14.5)	0.0532
неповний робочий день або тимчасово	239	208	86.3 (81.0–90.3)	31	13.7 (9.7–19.0)	
безробітний	36	32	90.1 (73.7–96.7)	4	9.9 (3.3–26.3)	
інвалідність	45	43	97.0 (88.1–99.3)	2	3.0 (0.7–11.9)	
інші	27	21	76.7 (55.6–89.6)	6	23.3 (10.4–44.4)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	53	44	83.4 (70.0–91.5)	9	16.6 (8.5–30.0)	0.6795
3-10 тис	187	165	88.2 (82.4–92.3)	22	11.8 (7.7–17.6)	
10-20 тис	169	151	88.8 (82.7–92.9)	18	11.2 (7.1–17.3)	
≥20 тис	62	57	91.0 (79.3–96.4)	5	9.0 (3.6–20.7)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	316	281	88.1 (83.8–91.4)	35	11.9 (8.6–16.2)	0.6190
так	182	162	89.6 (84.1–93.4)	20	10.4 (6.6–15.9)	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	454	404	88.8 (85.3–91.5)	50	11.2 (8.5–14.7)	0.8337
так	44	39	87.7 (73.0–94.9)	5	12.3 (5.1–27.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	477	424	88.5 (85.1–91.2)	53	11.5 (8.8–14.9)	0.4623
так	21	19	93.0 (73.8–98.4)	2	7.0 (1.6–26.2)	
Результат тесту на ВІЛ						

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	52	45	88.1 (75.8–94.6)	7	11.9 (5.4–24.2)	0.8986
негативний	446	398	88.7 (85.2–91.5)	48	11.3 (8.5–14.8)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	252	228	89.8 (85.0–93.2)	24	10.2 (6.8–15.0)	0.7806
стимулятори	121	105	86.9 (79.3–92.0)	16	13.1 (8.0–20.7)	
опі+стимул	122	107	88.0 (80.5–92.8)	15	12.0 (7.2–19.5)	
інші	3	3	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	334	300	89.5 (85.5–92.5)	34	10.5 (7.5–14.5)	0.6289
стимулятори	158	138	87.1 (80.6–91.7)	20	12.9 (8.3–19.4)	
інші	6	5	80.7 (19.7–98.6)	1	19.3 (1.4–80.3)	

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	97	20.1 (16.6–24.0)	155	31.1 (27.0–35.5)	109	21.9 (18.3–25.9)	139	27.0 (23.1–31.2)	1.0000
Стать										
чоловік	435	91	21.6 (17.8–26.0)	139	31.9 (27.5–36.6)	89	20.3 (16.7–24.6)	116	26.2 (22.1–30.7)	0.0360
жінка	65	6	9.4 (4.2–19.9)	16	25.9 (16.2–38.8)	20	32.1 (21.2–45.4)	23	32.5 (22.0–45.3)	
Вікова категорія 4										
<25	8	3	43.0 (11.4–81.6)	1	11.8 (1.0–63.0)	0	0.0	4	45.1 (12.9–82.0)	0.0021
25-34	75	23	31.2 (21.2–43.4)	19	26.6 (17.3–38.5)	13	18.1 (10.5–29.5)	20	24.1 (15.7–35.2)	
35-44	280	53	19.4 (15.0–24.7)	103	36.9 (31.2–43.0)	60	21.2 (16.6–26.6)	64	22.5 (17.8–28.1)	

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
45+	137	18	13.8 (8.7–21.4)	32	23.1 (16.4–31.6)	36	26.6 (19.4–35.2)	51	36.5 (28.4–45.3)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно										
≤2	17	6	39.3 (17.8–66.0)	3	17.9 (5.3–46.0)	3	17.0 (5.0–44.7)	5	25.7 (9.9–52.2)	0.1416
3-5	20	8	42.5 (21.0–67.3)	3	17.0 (5.1–43.6)	4	16.3 (5.1–41.3)	5	24.3 (9.5–49.4)	
6-10	69	11	16.3 (9.0–27.5)	22	33.0 (22.5–45.6)	12	17.3 (9.8–28.7)	24	33.4 (22.8–46.0)	
≥11	394	72	18.6 (14.9–23.0)	127	32.1 (27.5–37.1)	90	23.1 (19.0–27.8)	105	26.1 (21.8–30.9)	
Партнерський статус										
живе сам	278	40	15.6 (11.5–20.8)	85	31.1 (25.6–37.1)	60	21.3 (16.7–26.7)	93	32.0 (26.6–37.9)	0.0176
живе з партнером	222	57	25.2 (19.7–31.7)	70	31.1 (25.1–37.9)	49	22.5 (17.2–28.9)	46	21.1 (15.9–27.4)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	152	48	32.2 (24.8–40.5)	48	30.3 (23.2–38.4)	28	20.6 (14.3–28.7)	28	17.0 (11.6–24.0)	0.0094
неповний робочий день або тимчасово	239	37	15.6 (11.4–21.1)	72	30.4 (24.7–36.8)	57	22.8 (17.8–28.7)	73	31.2 (25.4–37.7)	
безробітний	36	6	15.8 (6.9–32.2)	9	29.0 (14.9–48.9)	8	20.8 (10.2–37.9)	13	34.4 (19.8–52.5)	
інвалідність	45	3	8.6 (2.7–24.4)	18	40.0 (26.2–55.6)	10	21.9 (11.7–37.2)	14	29.5 (17.6–45.0)	
інші	28	3	11.0 (3.3–30.5)	8	30.4 (15.4–51.3)	6	22.8 (10.1–43.6)	11	35.8 (19.9–55.6)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	54	5	10.7 (4.2–24.4)	20	39.7 (26.6–54.4)	12	20.7 (11.7–33.8)	17	29.0 (18.1–42.9)	0.0010
3-10 тис	187	27	14.6 (10.1–20.7)	55	28.8 (22.6–36.0)	43	22.9 (17.2–29.9)	62	33.6 (26.9–41.1)	
10-20 тис	169	41	25.5 (19.2–33.1)	58	33.6 (26.6–41.4)	32	19.0 (13.6–26.1)	38	21.9 (16.0–29.0)	
≥20 тис	63	22	34.2 (22.8–47.8)	18	29.6 (18.8–43.3)	17	27.8 (17.3–41.3)	6	8.4 (3.7–18.0)	
Був позбавлений волі будь-коли										

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	317	59	19.3 (15.1–24.4)	94	30.2 (25.2–35.8)	73	22.9 (18.4–28.2)	91	27.5 (22.7–32.9)	0.8196
так	183	38	21.3 (15.7–28.2)	61	32.6 (26.0–40.1)	36	19.9 (14.5–26.7)	48	26.1 (20.0–33.3)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	97	20.1 (16.6–24.0)	155	31.1 (27.0–35.5)	109	21.9 (18.3–25.9)	139	27.0 (23.1–31.2)	1.0000
Стать										
чоловік	435	91	21.6 (17.8–26.0)	139	31.9 (27.5–36.6)	89	20.3 (16.7–24.6)	116	26.2 (22.1–30.7)	0.0360
жінка	65	6	9.4 (4.2–19.9)	16	25.9 (16.2–38.8)	20	32.1 (21.2–45.4)	23	32.5 (22.0–45.3)	
Вікова категорія 4										
<25	8	3	43.0 (11.4–81.6)	1	11.8 (1.0–63.0)	0	0.0	4	45.1 (12.9–82.0)	0.0021
25-34	75	23	31.2 (21.2–43.4)	19	26.6 (17.3–38.5)	13	18.1 (10.5–29.5)	20	24.1 (15.7–35.2)	
35-44	280	53	19.4 (15.0–24.7)	103	36.9 (31.2–43.0)	60	21.2 (16.6–26.6)	64	22.5 (17.8–28.1)	
45+	137	18	13.8 (8.7–21.4)	32	23.1 (16.4–31.6)	36	26.6 (19.4–35.2)	51	36.5 (28.4–45.3)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно										
≤2	17	6	39.3 (17.8–66.0)	3	17.9 (5.3–46.0)	3	17.0 (5.0–44.7)	5	25.7 (9.9–52.2)	0.1416
3-5	20	8	42.5 (21.0–67.3)	3	17.0 (5.1–43.6)	4	16.3 (5.1–41.3)	5	24.3 (9.5–49.4)	
6-10	69	11	16.3 (9.0–27.5)	22	33.0 (22.5–45.6)	12	17.3 (9.8–28.7)	24	33.4 (22.8–46.0)	
≥11	394	72	18.6 (14.9–23.0)	127	32.1 (27.5–37.1)	90	23.1 (19.0–27.8)	105	26.1 (21.8–30.9)	
Партнерський статус										

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	278	40	15.6 (11.5–20.8)	85	31.1 (25.6–37.1)	60	21.3 (16.7–26.7)	93	32.0 (26.6–37.9)	0.0176
живе з партнером	222	57	25.2 (19.7–31.7)	70	31.1 (25.1–37.9)	49	22.5 (17.2–28.9)	46	21.1 (15.9–27.4)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	152	48	32.2 (24.8–40.5)	48	30.3 (23.2–38.4)	28	20.6 (14.3–28.7)	28	17.0 (11.6–24.0)	0.0094
неповний робочий день або тимчасово	239	37	15.6 (11.4–21.1)	72	30.4 (24.7–36.8)	57	22.8 (17.8–28.7)	73	31.2 (25.4–37.7)	
безробітний	36	6	15.8 (6.9–32.2)	9	29.0 (14.9–48.9)	8	20.8 (10.2–37.9)	13	34.4 (19.8–52.5)	
інвалідність	45	3	8.6 (2.7–24.4)	18	40.0 (26.2–55.6)	10	21.9 (11.7–37.2)	14	29.5 (17.6–45.0)	
інші	28	3	11.0 (3.3–30.5)	8	30.4 (15.4–51.3)	6	22.8 (10.1–43.6)	11	35.8 (19.9–55.6)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	54	5	10.7 (4.2–24.4)	20	39.7 (26.6–54.4)	12	20.7 (11.7–33.8)	17	29.0 (18.1–42.9)	0.0010
3-10 тис	187	27	14.6 (10.1–20.7)	55	28.8 (22.6–36.0)	43	22.9 (17.2–29.9)	62	33.6 (26.9–41.1)	
10-20 тис	169	41	25.5 (19.2–33.1)	58	33.6 (26.6–41.4)	32	19.0 (13.6–26.1)	38	21.9 (16.0–29.0)	
≥20 тис	63	22	34.2 (22.8–47.8)	18	29.6 (18.8–43.3)	17	27.8 (17.3–41.3)	6	8.4 (3.7–18.0)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	317	59	19.3 (15.1–24.4)	94	30.2 (25.2–35.8)	73	22.9 (18.4–28.2)	91	27.5 (22.7–32.9)	0.8196
так	183	38	21.3 (15.7–28.2)	61	32.6 (26.0–40.1)	36	19.9 (14.5–26.7)	48	26.1 (20.0–33.3)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Разом	500	173	35.6 (31.3–40.1)	163	32.6 (28.5–37.1)	91	17.9 (14.7–21.6)	73	13.9 (11.1–17.3)	1.0000
Стать										
чоловік	435	161	37.8 (33.2–42.7)	137	31.5 (27.1–36.3)	77	17.7 (14.2–21.7)	60	13.0 (10.1–16.5)	0.0501
жінка	65	12	20.2 (11.6–32.7)	26	40.1 (28.3–53.2)	14	19.6 (11.6–31.1)	13	20.1 (11.6–32.4)	
Вікова категорія 4										
<25	8	2	31.2 (5.9–76.7)	2	21.8 (3.8–66.3)	3	32.3 (7.6–73.4)	1	14.7 (1.3–68.6)	0.3934
25-34	75	31	45.1 (33.5–57.1)	19	24.4 (15.7–35.9)	14	17.6 (10.4–28.1)	11	13.0 (7.1–22.5)	
35-44	280	100	36.0 (30.3–42.0)	97	35.6 (29.9–41.7)	44	15.2 (11.3–20.1)	39	13.3 (9.7–17.9)	
45+	137	40	29.7 (22.2–38.6)	45	31.9 (24.3–40.7)	30	22.7 (16.1–31.0)	22	15.7 (10.3–23.2)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно										
≤2	17	7	46.2 (22.9–71.3)	6	31.9 (13.6–58.2)	3	15.1 (4.3–41.0)	1	6.9 (0.8–39.7)	0.8976
3-5	20	6	34.1 (14.6–60.9)	5	22.6 (8.7–47.4)	5	25.9 (10.1–52.2)	4	17.4 (5.9–41.3)	
6-10	69	19	29.6 (19.5–42.2)	26	38.9 (27.5–51.7)	13	17.2 (10.0–28.1)	11	14.3 (7.8–24.6)	
≥11	394	141	36.2 (31.4–41.3)	126	32.1 (27.5–37.2)	70	17.7 (14.1–22.0)	57	14.0 (10.8–17.9)	
Партнерський статус										
живе сам	278	89	33.8 (28.1–39.9)	86	30.6 (25.2–36.5)	54	19.0 (14.7–24.1)	49	16.7 (12.7–21.7)	0.2048
живе з партнером	222	84	37.7 (31.2–44.6)	77	35.0 (28.7–41.9)	37	16.7 (12.1–22.5)	24	10.6 (7.1–15.6)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	152	69	46.1 (37.8–54.5)	48	33.0 (25.5–41.5)	24	15.3 (10.3–22.1)	11	5.7 (3.1–10.2)	0.0216

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
неповний робочий день або тимчасово	239	71	30.1 (24.4–36.5)	85	34.6 (28.7–41.2)	44	18.8 (14.2–24.6)	39	16.4 (12.1–21.9)	
безробітний	36	14	38.4 (23.0–56.5)	9	26.1 (13.0–45.3)	6	15.5 (6.6–32.4)	7	20.1 (9.3–38.1)	
інвалідність	45	11	27.5 (15.6–43.7)	16	33.7 (21.1–49.2)	10	21.8 (11.6–37.1)	8	17.0 (8.3–31.8)	
інші	28	8	29.9 (15.0–50.7)	5	20.4 (8.4–41.5)	7	22.2 (10.3–41.6)	8	27.5 (13.7–47.7)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	54	18	34.7 (22.5–49.3)	18	34.7 (22.4–49.6)	12	21.1 (11.9–34.6)	6	9.4 (4.1–20.1)	0.0558
3-10 тис	187	52	28.5 (22.2–35.8)	67	35.8 (29.0–43.3)	39	20.7 (15.3–27.4)	29	15.0 (10.5–21.1)	
10-20 тис	169	72	42.8 (35.2–50.7)	48	28.1 (21.5–35.7)	31	18.6 (13.2–25.5)	18	10.6 (6.6–16.5)	
≥20 тис	63	29	48.7 (35.6–61.9)	23	35.5 (24.0–49.0)	4	6.6 (2.4–17.2)	7	9.2 (4.3–18.7)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	317	109	35.5 (30.2–41.3)	101	32.0 (26.8–37.6)	59	18.2 (14.2–23.1)	48	14.2 (10.8–18.6)	0.9740
так	183	64	35.6 (28.7–43.2)	62	33.8 (27.0–41.3)	32	17.3 (12.3–23.8)	25	13.3 (9.0–19.3)	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

	Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	455	159	35.6 (31.1–40.4)	147	32.4 (28.1–37.1)	84	18.1 (14.7–22.1)	65	13.8 (10.9–17.4)	0.9702
так	45	14	34.7 (21.5–50.8)	16	34.8 (21.8–50.5)	7	15.7 (7.4–30.1)	8	14.8 (7.2–28.1)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	479	166	35.5 (31.1–40.1)	155	32.4 (28.2–37.0)	89	18.3 (15.0–22.2)	69	13.7 (10.9–17.2)	0.6214

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	21	7	37.3 (18.0–61.6)	8	37.5 (18.7–61.0)	2	7.5 (1.7–27.9)	4	17.7 (6.1–41.5)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	52	13	23.4 (13.6–37.2)	19	39.0 (25.6–54.3)	8	14.7 (7.1–27.7)	12	23.0 (13.0–37.4)	0.0892
негативний	448	160	37.1 (32.5–41.9)	144	31.8 (27.5–36.5)	83	18.3 (14.9–22.3)	61	12.8 (10.0–16.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	252	82	33.4 (27.6–39.8)	91	36.2 (30.3–42.6)	40	15.5 (11.4–20.6)	39	14.9 (10.9–20.0)	0.1110
стимулятори	123	51	42.1 (33.3–51.6)	29	23.4 (16.4–32.2)	22	17.9 (11.9–26.2)	21	16.5 (10.8–24.6)	
опі+стимул	122	40	33.9 (25.5–43.4)	42	34.6 (26.1–44.3)	27	22.0 (15.2–30.6)	13	9.5 (5.5–16.1)	
інші	3	0	0.0	1	34.7 (0.3–99.1)	2	65.3 (0.9–99.7)	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	334	105	32.3 (27.2–37.8)	123	37.3 (32.0–42.9)	56	16.3 (12.6–20.7)	50	14.2 (10.8–18.5)	0.0469
стимулятори	160	66	42.4 (34.6–50.7)	38	22.8 (16.8–30.3)	33	21.1 (15.2–28.5)	23	13.7 (9.0–20.1)	
інші	6	2	35.6 (5.4–84.2)	2	38.0 (5.9–85.8)	2	26.4 (3.6–77.2)	0	0.0	

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	42	8.4	(6.2–11.3)
збут наркотиків	4	0.8	(0.3–2.0)
зберігання наркотиків	29	5.8	(4.0–8.2)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	33	6.7	(4.7–9.3)
збут наркотиків	4	0.9	(0.3–2.3)
зберігання наркотиків	20	3.7	(2.4–5.8)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	442	88.7	(85.6–91.3)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	183	36.3	(32.1–40.8)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	7	3.6	(1.7–7.5)
6м-2р	33	17.6	(12.6–24.0)
2-4р	81	44.6	(37.3–52.2)
4 роки +	62	34.1	(27.4–41.6)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	18	9.5	(5.9–14.9)

	n	%	ДІ
1-3р	27	14.1	(9.7–20.0)
3-5р	30	16.9	(11.9–23.4)
5-10р	38	21.0	(15.5–27.8)
10 років +	70	38.5	(31.4–46.1)
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	121	64.8	(57.2–71.7)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	237	47.5	(42.9–52.1)
так, за останні 6м	255	50.9	(46.3–55.5)
так, але 6+ місяців тому	7	1.6	(0.8–3.4)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	175	34.7	(30.5–39.2)
так, за останні 6м	313	62.6	(58.1–67.0)
так, але 6+ місяців тому	11	2.6	(1.4–4.9)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	342	68.5	(64.0–72.6)
так, за останні 6м	152	30.4	(26.3–34.8)
так, але 6+ місяців тому	4	1.1	(0.4–3.1)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	180	36.1	(31.8–40.6)
так	318	63.9	(59.4–68.2)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	223	44.9	(40.4–49.5)
так	277	55.1	(50.5–59.6)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			

		n	%	ДІ
	ні	188	68.5	(62.5–73.9)
	так	89	31.5	(26.1–37.5)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців				
	ні	343	69.7	(65.4–73.7)
	так	157	30.3	(26.3–34.6)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

		Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	498	318	63.9 (59.4–68.2)	1.0000	277	89	31.5 (26.1–37.5)	1.0000
Стать									
	чоловік	433	279	64.4 (59.5–69.0)	0.5726	240	69	27.8 (22.3–34.1)	0.0020
	жінка	65	39	60.7 (47.8–72.2)		37	20	54.4 (37.4–70.4)	
Вікова категорія 4									
	<25	8	4	48.4 (14.4–84.0)	0.3059	5	3	62.2 (15.7–93.6)	0.4252
	25-34	75	42	56.0 (44.0–67.4)		33	12	37.8 (22.4–56.1)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
35-44	278	184	66.9 (60.9–72.4)		159	50	30.5 (23.5–38.4)	
45+	137	88	63.3 (54.2–71.5)		80	24	29.1 (19.8–40.5)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно								
≤2	17	11	65.7 (38.8–85.3)	0.8362	10	5	46.5 (18.3–77.1)	0.3053
3-5	20	12	59.4 (34.3–80.3)		12	4	31.2 (10.8–63.1)	
6-10	69	41	59.4 (46.9–70.8)		32	14	43.7 (27.0–62.0)	
≥11	392	254	64.8 (59.7–69.6)		223	66	29.1 (23.3–35.8)	
Партнерський статус								
живе сам	278	185	65.4 (59.2–71.0)	0.4876	158	52	32.1 (25.1–40.1)	0.8176
живе з партнером	220	133	62.2 (55.3–68.6)		119	37	30.8 (22.8–40.1)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	150	76	51.1 (42.6–59.5)	0.0000	76	20	24.3 (15.6–35.9)	0.2839
неповний робочий день або тимчасово	239	179	75.5 (69.4–80.7)		141	53	36.1 (28.3–44.7)	
безробітний	36	21	56.4 (38.4–72.9)		22	8	41.2 (21.5–64.0)	
інвалідність	45	25	54.6 (39.2–69.1)		24	4	19.9 (7.4–43.6)	
інші	28	17	63.2 (43.4–79.4)		14	4	31.3 (11.8–60.9)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	54	32	55.8 (41.3–69.4)	0.0218	24	7	30.7 (14.8–52.9)	0.7904

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
3-10 тис	186	121	66.1 (58.7–72.8)		101	34	33.9 (25.0–44.1)	
10-20 тис	168	113	68.4 (60.7–75.2)		98	29	27.0 (19.0–36.8)	
≥20 тис	63	31	47.5 (34.6–60.7)		36	10	29.2 (15.5–48.0)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	316	189	59.8 (53.9–65.3)	0.0142	166	51	31.1 (24.2–39.0)	0.8675
так	182	129	71.2 (63.9–77.5)		111	38	32.1 (23.9–41.6)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	454	281	62.0 (57.2–66.6)	0.0023	246	77	30.7 (25.0–37.1)	0.3946
так	44	37	85.3 (71.1–93.2)		31	12	38.4 (22.6–57.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	477	300	62.9 (58.2–67.3)	0.0118	264	80	29.8 (24.3–35.9)	0.0029
так	21	18	88.2 (66.7–96.6)		13	9	70.0 (39.2–89.4)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	52	35	67.3 (52.2–79.5)	0.6082	34	10	31.3 (17.2–50.0)	0.9811
негативний	446	283	63.5 (58.7–68.0)		243	79	31.5 (25.8–37.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	251	165	65.5 (59.2–71.4)	0.2810	140	39	28.3 (21.1–36.7)	0.5702
стимулятори	123	67	56.9 (47.6–65.8)		64	27	37.9 (26.5–50.7)	
опі+стимул	121	84	67.6 (57.9–76.0)		70	22	31.9 (21.4–44.6)	
інші	3	2	69.5 (1.2–99.8)		3	1	30.5 (0.2–98.8)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	332	223	66.6 (61.1–71.8)	0.1725	188	52	28.0 (21.7–35.2)	0.1181
стимулятори	160	92	58.8 (50.6–66.5)		85	36	39.5 (29.3–50.7)	
інші	6	3	47.4 (9.5–88.6)		4	1	20.6 (1.3–83.7)	

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	22	4.5	(2.9–6.9)
так, з інших причин	21	4.4	(2.9–6.9)
ні	457	91.1	(88.0–93.4)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	0	0.0	
інша країна	3	12.4	(3.8–33.5)
інша область	15	72.1	(50.2–86.9)
інше місто	3	12.4	(3.8–33.5)
інший район	1	3.1	(0.4–19.5)
інший будинок	0	0.0	
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			
та сама область	29	68.2	(52.0–80.9)
інша область	12	28.1	(16.0–44.4)
інша країна	2	3.7	(0.9–14.1)



Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)




Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)

Результати для міста: Дніпро




Рис. А. Мережа рекрутингу RDS у місті Дніпро

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	500	37.9	(37.1–38.6)	39	(32–43)
Вік першого вживання наркотиків неін'єкційно	403	17.8	(17.3–18.2)	17	(15–19)
Років з початку вживання наркотиків неін'єкційно	403	19.9	(19.0–20.9)	21	(14–25)
Вік першого вживання наркотиків ін'єкційно	496	23.4	(22.9–24.0)	23	(18–27)
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно	496	14.4	(13.6–15.3)	14	(7–20)
Особистий місячний дохід, грн	415	12,170.1	(11171.7–13168.5)	10,000	(6000–15000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

	Сайт	n	%	ДІ
Стать				
чоловік	Дніпро	302	58.5	(53.5–63.3)
жінка	Дніпро	198	41.5	(36.7–46.5)
Вікова категорія 4				
<25	Дніпро	23	4.8	(3.1–7.2)
25-34	Дніпро	143	27.8	(23.6–32.3)
35-44	Дніпро	246	49.6	(44.6–54.5)
45+	Дніпро	88	17.9	(14.4–22.1)
Сімейний стан				
одружений або проживають разом	Дніпро	117	23.2	(19.3–27.6)
одружений, але має іншого партнера	Дніпро	28	4.9	(3.3–7.3)
не одружений, але є партнер	Дніпро	121	25.8	(21.6–30.5)
одружений, але не живуть разом	Дніпро	41	7.8	(5.6–10.6)
не одружений та не мають партнера	Дніпро	193	38.3	(33.6–43.2)
Партнерський статус				
живе сам	Дніпро	234	46.1	(41.2–51.0)
живе з партнером	Дніпро	266	53.9	(49.0–58.8)
Освіта 3 категорії				
незак. середня школа	Дніпро	63	14.5	(11.1–18.8)
середня школа	Дніпро	158	31.1	(26.7–35.8)
> середня школа	Дніпро	279	54.4	(49.4–59.3)
Поточна професія				
учень школи	Дніпро	0	0.0	
студент коледжу/університету	Дніпро	4	1.1	(0.3–4.1)
постійна робота	Дніпро	192	36.4	(31.9–41.2)
непостійна робота	Дніпро	175	34.7	(30.2–39.4)
безробітний	Дніпро	64	14.7	(11.3–18.9)
домогосподарка	Дніпро	15	2.9	(1.7–4.9)
інвалідність	Дніпро	17	3.9	(2.2–7.0)
військовий	Дніпро	4	0.6	(0.2–1.6)
інші	Дніпро	28	5.7	(3.8–8.4)
Безхатченко				
ніколи	Дніпро	428	85.5	(81.5–88.8)
так, 12м+ тому	Дніпро	66	14.3	(11.0–18.2)

	Сайт	n	%	ДІ
так, за останні 12м	Дніпро	1	0.2	(0.0–1.7)
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Дніпро	66	98.4	(89.3–99.8)
так	Дніпро	1	1.6	(0.2–10.7)
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Дніпро	32	8.2	(5.5–12.0)
3-10 тис	Дніпро	147	36.0	(31.0–41.4)
10-20 тис	Дніпро	162	39.8	(34.7–45.2)
≥20 тис	Дніпро	74	15.9	(12.5–20.1)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Дніпро	32	8.2	(5.5–12.0)
≥2684	Дніпро	383	91.8	(88.0–94.5)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Дніпро	23	5.0	(3.3–7.6)
3-5	Дніпро	65	12.4	(9.6–16.0)
6-10	Дніпро	102	19.4	(16.0–23.3)
≥11	Дніпро	306	63.2	(58.4–67.7)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Місто	n	%	ДІ
власне житло	Дніпро	292	59.6	(54.7–64.3)
у друзів або родичів	Дніпро	125	25.5	(21.4–30.1)
оренда	Дніпро	71	12.9	(10.1–16.4)
різне	Дніпро	29	5.0	(3.4–7.3)
на вулиці (безхатько)	Дніпро	1	0.2	(0.0–1.6)
у притулку для біженців	Дніпро	1	0.3	(0.0–2.4)




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Всього								
	Разом	500	267	53.4 (48.5–58.3)	193	39.4 (34.6–44.4)	40	7.2 (5.2–9.8)
Стать								
	чоловік	302	170	54.7 (48.4–60.9)	114	39.8 (33.7–46.2)	18	5.5 (3.3–8.9)
	жінка	198	97	51.6 (43.6–59.5)	79	38.9 (31.4–46.9)	22	9.5 (6.1–14.4)
Вікова категорія 4								

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
<25	23	12	51.6 (30.1–72.5)	9	39.8 (20.7–62.5)	2	8.6 (1.9–30.9)
25-34	143	69	47.7 (38.8–56.8)	58	42.3 (33.5–51.6)	16	10.0 (6.0–16.3)
35-44	246	123	53.0 (45.9–59.9)	105	40.7 (34.0–47.8)	18	6.3 (3.9–10.1)
45+	88	63	64.1 (50.7–75.6)	21	31.2 (20.1–45.1)	4	4.7 (1.6–13.0)
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно							
≤2	23	11	46.9 (26.0–68.8)	10	42.6 (22.7–65.2)	2	10.5 (2.3–37.2)
3-5	65	32	48.2 (34.8–61.8)	29	47.4 (34.0–61.2)	4	4.5 (1.5–12.6)
6-10	102	52	52.7 (42.5–62.8)	42	39.6 (30.1–49.9)	8	7.7 (3.8–15.0)
≥11	306	169	54.9 (48.4–61.2)	111	37.8 (31.6–44.3)	26	7.4 (4.9–10.9)
Партнерський статус							
живе сам	234	125	55.0 (47.8–62.0)	89	37.0 (30.4–44.2)	20	8.0 (5.1–12.4)
живе з партнером	266	142	52.1 (45.3–58.9)	104	41.4 (34.8–48.4)	20	6.5 (4.0–10.2)
Поточний статус зайнятості							
повний робочий день	192	108	52.4 (44.4–60.2)	75	42.5 (34.7–50.6)	9	5.1 (2.6–9.9)
неповний робочий день або тимчасово	175	92	54.7 (46.6–62.6)	66	37.1 (29.7–45.1)	17	8.2 (5.0–13.3)
безробітний	64	35	63.6 (49.9–75.3)	23	29.9 (19.3–43.2)	6	6.6 (2.8–14.8)
інвалідність	17	8	31.5 (12.6–59.5)	8	64.0 (35.4–85.2)	1	4.5 (0.5–30.4)
інші	51	23	45.6 (30.8–61.3)	21	41.8 (27.1–58.1)	7	12.6 (5.6–26.0)
Категорія місячного доходу							
<3 тис	32	20	55.1 (33.3–75.1)	7	34.0 (15.3–59.6)	5	10.9 (4.2–25.8)
3-10 тис	147	75	53.4 (44.4–62.2)	57	37.1 (29.0–45.9)	15	9.5 (5.6–15.6)
10-20 тис	162	86	49.6 (41.1–58.1)	69	45.7 (37.2–54.5)	7	4.7 (2.2–9.9)
≥20 тис	74	42	62.1 (49.6–73.2)	24	28.1 (18.7–39.9)	8	9.8 (4.5–19.9)
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	437	232	53.2 (47.8–58.4)	173	40.2 (35.1–45.6)	32	6.6 (4.6–9.4)
так	63	35	55.5 (42.0–68.3)	20	33.0 (21.6–46.9)	8	11.4 (5.4–22.8)

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії					
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	416	219	53.2 (47.7–58.5)	161	39.1 (33.9–44.5)	36	7.8 (5.5–10.9)
так	83	48	55.4 (43.1–67.1)	31	40.5 (29.1–53.0)	4	4.1 (1.5–10.9)
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	461	235	51.3 (46.2–56.4)	191	41.8 (36.8–46.9)	35	6.9 (4.9–9.7)
так	35	29	86.6 (71.0–94.5)	1	1.6 (0.2–11.5)	5	11.8 (4.5–27.5)
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	85	52	58.8 (45.7–70.7)	24	33.8 (22.2–47.6)	9	7.5 (3.8–14.3)
негативний	415	215	52.3 (46.9–57.6)	169	40.6 (35.4–46.0)	31	7.1 (4.9–10.1)
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання							
опіоїди	288	263	92.3 (88.6–94.9)	1	0.2 (0.0–1.3)	24	7.5 (5.0–11.3)
стимулятори	210	2	1.2 (0.3–5.2)	192	92.0 (87.1–95.1)	16	6.8 (4.0–11.3)
інші	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Частота ін'єкцій: останні 24 години								
0 разів	84	29.8	61	33.4	8	18.6	0	
1 раз	161	61.9	124	63.0	22	59.3	0	
2-3 рази	20	7.6	8	3.6	8	18.6	0	
4+ рази	2	0.7	0	0.0	2	3.6	0	
N	267		193		40		0	
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)								
1 раз	161	88.3	124	94.6	22	72.8	0	
2-3 рази	20	10.8	8	5.4	8	22.8	0	
4+ рази	2	0.9	0	0.0	2	4.4	0	
N	183		132		32		0	
Частота ін'єкцій: останній тиждень								
0 разів	9	2.7	9	5.3	1	2.5	0	
1-6 разів	197	75.8	165	85.4	26	73.5	0	
кожен день	61	21.6	19	9.3	13	24.1	0	
N	267		193		40		0	
Частота ін'єкцій: останні 30 днів								
1-9 разів	65	25.4	64	35.1	8	22.7	0	

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші	
	n	%	n	%	n	%	n	%
10-19 разів	91	34.0	67	33.9	12	31.4	0	
20-29 разів	62	24.2	49	24.7	8	23.6	0	
кожен день	49	16.4	13	6.3	12	22.3	0	
N	267		193		40		0	
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів								
0-9 разів	66	25.9	63	35.1	8	22.7	0	
10-19 разів	87	32.0	68	35.4	16	40.7	0	
20-29 разів	58	24.3	43	22.4	6	17.9	0	
кожен день	52	17.8	15	7.2	10	18.7	0	
N	263		189		40		0	

Таблиця 2.4. Вид наркотику ін'єкційного вживання на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	23	8.4	9	8.1	0	0.0
3-10 тис	84	36.3	61	33.9	2	100.0
10-20 тис	91	36.9	71	44.9	0	0.0
≥20 тис	45	18.4	29	13.1	0	0.0
N	243		170		2	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
Разом		опіоїди		стимулятори		інші		
n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
готую сам								
106	19.8	73	24.0	33	14.7	0	0.0	0.1463
приготовлене друзями								
65	12.2	32	10.4	33	14.9	0	0.0	0.4590
від дилера								
162	33.1	102	34.8	58	29.3	2	100.0	0.0747
куплене в Інтернеті								
252	52.7	122	43.9	129	63.8	1	75.2	0.0013
з аптеки								
14	3.7	14	6.6	0	0.0	0	0.0	0.0457
з програми ЗПТ								
9	1.4	9	2.5	0	0.0	0	0.0	0.2305
інше								
18	3.5	8	3.4	10	3.6	0	0.0	0.9304
N								
626		360		263		3		




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін'єкції використовував чистий шприц			
так	444	88.9	(85.5–91.6)
Джерело шприца для останньої ін'єкції			
купив в аптеці	333	66.0	(61.1–70.6)
отримав в аптеці	4	0.8	(0.3–2.0)
отримав від НУО	59	12.0	(9.1–15.7)
отримав від друга	47	8.6	(6.3–11.7)
отримав вживаний від друга	6	1.1	(0.5–2.5)
використовував вживаний свій	30	5.7	(3.9–8.2)
отримав заповнений	19	5.4	(3.2–9.1)
інші	2	0.4	(0.1–1.5)
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	29	6.2	(4.3–9.1)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	130	26.2	(22.1–30.8)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	195	39.1	(34.4–44.1)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	244	47.7	(42.8–52.7)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	142	26.9	(22.9–31.4)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	36	6.7	(4.8–9.4)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	325	66.3	(61.4–70.9)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	1	2.8	(0.4–17.9)
часто	4	18.9	(7.3–40.8)
половина	6	24.0	(10.9–45.0)
іноді	8	20.7	(10.1–37.8)
рідко	8	28.4	(14.3–48.6)
ніколи	2	5.1	(1.2–18.8)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	116	25.4	(21.2–30.2)
часто	112	21.9	(18.1–26.1)
половина	108	22.7	(18.7–27.3)
іноді	68	13.1	(10.3–16.5)
рідко	48	9.6	(7.0–12.9)
ніколи	44	7.4	(5.4–9.9)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			
1-9	82	76.9	(67.0–84.5)
10-29	22	21.7	(14.3–31.5)
30+	2	1.5	(0.4–5.9)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	7	7.4	(2.8–18.2)
2-3	71	60.1	(49.2–70.0)
4-9	24	24.1	(15.9–34.6)
10+	8	8.4	(4.2–16.4)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	29	22.4	(15.6–31.1)
від друзів	57	46.3	(36.7–56.1)
із закладки	36	31.3	(22.8–41.4)
Хтось використав один шприц для ін'єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	359	73.3	(68.8–77.3)
так	137	26.7	(22.7–31.2)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін'єкцій (%)




Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	493	29	6.2 (4.3–9.1)	1.0000	495	130	26.2 (22.1–30.8)	1.0000
Стать									
	чоловік	296	20	6.9 (4.3–10.7)	0.5531	298	74	24.8 (19.7–30.6)	0.4352
	жінка	197	9	5.4 (2.7–10.4)		197	56	28.3 (21.7–36.1)	
Вікова категорія 4									

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<25	23	2	11.0 (2.4–38.4)	0.7533	22	5	28.0 (11.4–53.9)	0.9147
25-34	139	7	5.2 (2.4–10.9)		142	42	28.6 (21.3–37.2)	
35-44	245	13	6.0 (3.3–10.4)		244	59	25.2 (19.3–32.2)	
45+	86	7	7.4 (3.5–15.2)		87	24	25.0 (16.6–35.8)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно								
≤2	23	2	10.5 (2.3–37.2)	0.7712	22	8	36.4 (17.7–60.3)	0.4091
3-5	64	3	6.3 (1.9–18.8)		62	19	31.9 (20.5–45.9)	
6-10	99	4	4.2 (1.4–11.8)		101	27	28.5 (19.9–39.0)	
≥11	303	19	6.0 (3.8–9.5)		306	75	23.8 (18.8–29.8)	
Партнерський статус								
живе сам	231	10	4.8 (2.5–8.9)	0.2511	230	74	31.7 (25.3–38.9)	0.0241
живе з партнером	262	19	7.5 (4.7–11.9)		265	56	21.6 (16.6–27.7)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	189	10	6.2 (3.2–11.7)	0.9558	190	39	19.0 (13.8–25.5)	0.1214
неповний робочий день або тимчасово	171	11	6.3 (3.4–11.4)		172	49	28.2 (21.3–36.2)	
безробітний	64	5	7.9 (3.0–19.1)		64	20	35.3 (22.5–50.6)	
інвалідність	17	1	6.0 (0.7–37.1)		17	5	23.1 (7.9–51.1)	
інші	51	2	4.0 (0.9–15.3)		51	16	31.8 (19.4–47.4)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	32	2	5.6 (1.2–21.8)	0.0685	32	9	20.7 (9.9–38.3)	0.4799
3-10 тис	142	14	10.3 (6.0–17.1)		144	42	29.1 (21.5–38.1)	
10-20 тис	161	6	4.0 (1.7–9.3)		160	35	21.3 (15.3–28.8)	
≥20 тис	74	2	2.2 (0.5–9.0)		74	14	22.8 (12.7–37.4)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	430	24	6.1 (4.0–9.1)	0.6238	433	115	26.2 (21.8–31.1)	0.9233
так	63	5	7.7 (3.1–18.2)		62	15	26.8 (16.3–40.7)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	410	27	7.2 (4.8–10.5)	0.0377	411	114	27.3 (22.7–32.3)	0.3613
так	82	2	1.8 (0.4–7.1)		83	16	21.5 (12.5–34.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	454	28	6.6 (4.5–9.6)	0.1583	456	127	27.9 (23.5–32.7)	0.0003
так	35	0	0.0		35	2	3.9 (0.9–15.3)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	84	2	2.4 (0.6–9.3)	0.1104	84	21	20.8 (13.3–31.2)	0.2328
негативний	409	27	7.1 (4.8–10.4)		411	109	27.4 (22.7–32.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	262	15	6.2 (3.6–10.3)		262	66	27.6 (21.7–34.5)	
стимулятори	191	13	7.1 (4.0–12.3)		193	50	23.0 (17.4–29.8)	
опі+стимул	40	1	2.5 (0.3–16.4)		40	14	33.5 (20.0–50.4)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	283	16	6.2 (3.7–10.1)	0.8928	283	76	29.3 (23.5–35.9)	0.3328
стимулятори	208	13	6.5 (3.7–11.3)		210	54	22.8 (17.4–29.3)	
інші	2	0	0.0		2	0	0.0	

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Всього									
	Разом	497	195	39.1 (34.4–44.1)	1.0000	498	244	47.7 (42.8–52.7)	1.0000
Стать									
	чоловік	299	109	35.7 (29.9–41.9)	0.1065	300	138	46.7 (40.5–53.1)	0.6387

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
жінка	198	86	43.9 (36.1–51.9)		198	106	49.2 (41.3–57.1)	
Вікова категорія 4								
<25	23	5	28.2 (11.7–53.7)	0.0600	22	6	35.6 (16.5–60.9)	0.0628
25-34	142	55	38.2 (29.7–47.4)		143	71	46.5 (37.7–55.6)	
35-44	244	93	35.7 (29.4–42.7)		245	117	44.6 (37.8–51.7)	
45+	88	42	52.7 (40.8–64.3)		88	50	61.4 (49.7–71.9)	
Років з початку вживання наркотиків ін'єкційно								
≤2	23	7	33.9 (15.9–58.3)	0.8774	22	7	32.8 (15.1–57.3)	0.0084
3-5	65	22	35.8 (23.5–50.4)		65	20	29.4 (18.9–42.6)	
6-10	99	42	41.8 (31.9–52.3)		102	57	55.9 (45.6–65.8)	
≥11	306	121	39.1 (33.0–45.6)		305	157	49.9 (43.4–56.3)	
Партнерський статус								
живе сам	234	89	38.6 (31.8–46.0)	0.8571	232	123	51.1 (43.9–58.3)	0.2150
живе з партнером	263	106	39.5 (33.1–46.3)		266	121	44.9 (38.2–51.7)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	191	67	34.3 (27.2–42.2)	0.5090	192	78	39.3 (31.9–47.2)	0.0095
неповний робочий день або тимчасово	174	71	40.0 (32.3–48.2)		173	94	53.3 (45.0–61.4)	
безробітний	63	31	43.4 (30.2–57.6)		64	38	53.1 (38.6–67.0)	

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
інвалідність	17	6	54.9 (26.1–80.8)		17	12	79.3 (52.7–92.9)	
інші	51	20	41.8 (27.1–58.2)		51	22	40.6 (26.6–56.4)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	32	15	53.5 (33.0–72.8)	0.4145	32	19	64.6 (44.3–80.7)	0.0169
3-10 тис	144	57	37.1 (29.0–46.0)		145	74	48.8 (39.8–57.8)	
10-20 тис	162	61	37.7 (29.8–46.3)		162	70	40.9 (33.0–49.4)	
≥20 тис	74	25	35.2 (23.6–48.9)		74	23	31.1 (20.8–43.8)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	434	167	37.9 (32.8–43.2)	0.1266	435	207	45.5 (40.3–50.8)	0.0049
так	63	28	48.7 (35.7–62.0)		63	37	65.0 (52.1–76.0)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	413	156	36.9 (31.9–42.3)	0.0634	414	197	46.0 (40.7–51.5)	0.1547
так	83	38	49.2 (37.2–61.2)		83	46	55.6 (43.4–67.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	458	182	39.3 (34.4–44.5)	0.0669	459	228	47.9 (42.8–53.0)	0.1678
так	35	9	23.4 (11.8–41.0)		35	12	35.0 (20.1–53.6)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	85	40	49.6 (37.2–62.0)	0.0610	85	50	62.0 (49.6–73.1)	0.0107

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
негативний	412	155	36.9 (31.9–42.2)		413	194	44.7 (39.5–50.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	266	99	35.6 (29.6–42.2)		266	125	43.8 (37.4–50.5)	
стимулятори	191	74	41.7 (33.7–50.0)		192	100	52.6 (44.5–60.6)	
опі+стимул	40	22	51.2 (34.7–67.5)		40	19	50.1 (33.7–66.5)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	287	110	37.1 (31.2–43.4)	0.5628	287	134	44.2 (38.0–50.6)	0.2148
стимулятори	208	84	42.2 (34.6–50.1)		209	109	52.9 (45.1–60.5)	
інші	2	1	24.8 (0.0–100.0)		2	1	24.8 (0.0–100.0)	

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	470	94.4	(91.9–96.1)	183	94.0	(90.1–96.5)	287	94.7	(91.0–96.9)	0.7694
N	500			198			302			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	408	86.4	(82.4–89.6)	157	85.1	(78.0–90.2)	251	87.3	(82.1–91.1)	0.5667
N	469			182			287			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	264	58.0	(52.9–62.9)	117	63.9	(55.6–71.5)	147	53.8	(47.3–60.1)	0.0569
N	464			181			283			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	219	80.7	(74.7–85.5)	93	77.1	(67.1–84.7)	126	83.7	(76.1–89.2)	0.2268
N	270			119			151			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	60	20.9	(16.2–26.6)	26	19.8	(13.3–28.5)	34	21.8	(15.4–29.8)	0.7178
N	269			119			150			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	9	2.8	(1.4–5.7)	1	0.6	(0.1–3.9)	8	4.7	(2.2–9.7)	0.0163
N	269			119			150			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	22	8.8	(5.5–13.8)	15	13.2	(7.4–22.5)	7	5.1	(2.3–10.9)	0.0427
N	270			119			151			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
так	184	45.5	(40.2–51.0)	74	46.2	(37.7–54.9)	110	45.0	(38.2–52.0)	0.8339
N	415			169			246			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	172	47.5	(41.8–53.2)	68	48.9	(39.7–58.1)	104	46.5	(39.4–53.7)	0.6849
N	376			149			227			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	121	48.5	(41.7–55.4)	52	49.7	(39.3–60.1)	69	47.5	(38.5–56.6)	0.7558
N	263			117			146			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	66	15.0	(11.6–19.1)	45	26.6	(19.7–34.8)	21	6.8	(4.3–10.4)	0.0000
N	467			182			285			
Надавав секс-послуги за гроші										
так	61	12.9	(9.8–16.8)	53	27.6	(20.8–35.5)	8	2.6	(1.2–5.3)	0.0000
N	468			183			285			
Платив за секс коли-небудь										
так	101	20.8	(16.9–25.2)	3	1.3	(0.4–3.9)	98	34.5	(28.5–41.0)	0.0000
N	468			182			286			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	24	22.9	(15.2–32.9)	0	0.0		24	23.5	(15.6–33.7)	0.3550
N	101			3			98			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	271	60.7	(55.5–65.7)	116	63.9	(55.3–71.8)	155	58.4	(51.7–64.7)	0.0000
випадковий	140	31.0	(26.4–36.1)	42	25.9	(19.0–34.3)	98	34.7	(28.8–41.2)	

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
ком. секс (я заплатив)	15	3.3	(1.9–5.7)	1	0.4	(0.1–2.6)	14	5.5	(3.1–9.4)	
ком. секс (мені заплатили)	21	4.9	(3.0–8.0)	17	9.8	(5.7–16.4)	4	1.4	(0.5–4.2)	
N	447			176			271			
З ким останнім був секс										
чоловік	181	40.7	(35.7–45.9)	172	94.0	(88.3–97.0)	9	2.8	(1.4–5.4)	0.0000
жінка	272	57.2	(52.0–62.2)	6	3.8	(1.6–8.8)	266	95.2	(92.0–97.2)	
чоловіки та жінки	9	2.1	(1.1–4.2)	3	2.3	(0.7–7.1)	6	2.0	(0.9–4.6)	
N	462			181			281			
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	352	85.9	(81.7–89.2)	147	85.8	(77.8–91.2)	205	86.0	(81.0–89.8)	0.9570
N	411			166			245			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	59	14.0	(10.6–18.3)	21	12.3	(7.6–19.3)	38	15.3	(10.8–21.1)	0.4594
N	411			166			245			
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	125	30.4	(25.6–35.8)	49	31.0	(23.4–39.8)	76	30.0	(24.0–36.8)	0.8556
N	411			166			245			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	219	80.7	(74.7–85.5)	93	77.1	(67.1–84.7)	126	83.7	(76.1–89.2)	0.2268
N	270			119			151			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	60	20.9	(16.2–26.6)	26	19.8	(13.3–28.5)	34	21.8	(15.4–29.8)	0.7178
N	269			119			150			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	9	2.8	(1.4–5.7)	1	0.6	(0.1–3.9)	8	4.7	(2.2–9.7)	0.0163
N	269			119			150			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	22	8.8	(5.5–13.8)	15	13.2	(7.4–22.5)	7	5.1	(2.3–10.9)	0.0427
N	270			119			151			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні										
1	199	93.2	(89.0–95.9)	85	94.2	(88.1–97.3)	114	92.4	(85.9–96.1)	0.4354
2-4	16	6.5	(3.9–10.7)	6	5.1	(2.3–11.2)	10	7.6	(3.9–14.1)	
5+	1	0.3	(0.0–1.9)	1	0.6	(0.1–4.3)	0	0.0		
N	216			92			124			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові										
1	26	44.5	(31.6–58.3)	11	44.0	(25.5–64.4)	15	44.9	(27.9–63.3)	0.9888
2-4	23	36.7	(24.8–50.4)	10	36.3	(19.9–56.7)	13	37.0	(21.5–55.9)	
5+	10	18.8	(9.9–32.8)	5	19.7	(7.7–41.7)	5	18.0	(7.2–38.5)	
N	59			26			33			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: комерційний (я платив)										
1	5	44.5	(16.8–76.2)	0	0.0		5	49.0	(17.6–81.1)	0.5614

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
2-4	1	15.0	(2.1–59.2)	0	0.0		1	16.5	(2.3–62.5)	
5+	3	40.5	(13.1–75.4)	1	100.0		2	34.6	(8.6–74.8)	
N	9			1			8			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: комерційний (мені платили)										
1	4	17.5	(6.0–41.6)	0	0.0		4	62.2	(20.5–91.3)	
2-4	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
5+	17	82.5	(58.4–94.0)	15	100.0		2	37.8	(8.7–79.5)	
N	21			15			6			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього										
1	192	72.9	(66.6–78.4)	83	72.1	(62.1–80.3)	109	73.6	(65.2–80.7)	0.0158
2-4	45	15.1	(11.1–20.0)	14	10.1	(5.9–16.7)	31	19.2	(13.4–26.9)	
5+	30	12.0	(8.1–17.5)	21	17.9	(11.1–27.5)	9	7.1	(3.5–13.9)	
N	267			118			149			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	415	231	54.5 (49.0–59.8)	184	45.5 (40.2–51.0)	1.0000
Стать							
	чоловік	246	136	55.0 (48.0–61.8)	110	45.0 (38.2–52.0)	0.8339
	жінка	169	95	53.8 (45.1–62.3)	74	46.2 (37.7–54.9)	
Вікова категорія 4							
	<25	18	8	42.3 (20.7–67.3)	10	57.7 (32.7–79.3)	0.0387
	25-34	119	56	47.6 (37.7–57.6)	63	52.4 (42.4–62.3)	
	35-44	208	118	54.1 (46.3–61.8)	90	45.9 (38.2–53.7)	
	45+	70	49	69.9 (56.7–80.4)	21	30.1 (19.6–43.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	17	8	43.3 (20.7–69.0)	9	56.7 (31.0–79.3)	0.3391
	3-5	55	25	44.5 (30.1–59.8)	30	55.5 (40.2–69.9)	
	6-10	81	44	52.9 (41.4–64.2)	37	47.1 (35.8–58.6)	
	≥11	261	153	57.4 (50.3–64.2)	108	42.6 (35.8–49.7)	
Партнерський статус							

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	166	84	51.0 (42.6–59.4)	82	49.0 (40.6–57.4)	0.3177
живе з партнером	249	147	56.7 (49.5–63.6)	102	43.3 (36.4–50.5)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	165	92	51.7 (43.2–60.1)	73	48.3 (39.9–56.8)	0.0664
неповний робочий день або тимчасово	144	79	52.3 (43.3–61.1)	65	47.7 (38.9–56.7)	
безробітний	48	34	70.2 (52.8–83.2)	14	29.8 (16.8–47.2)	
інвалідність	17	11	74.2 (46.3–90.6)	6	25.8 (9.4–53.7)	
інші	40	15	42.7 (26.0–61.2)	25	57.3 (38.8–74.0)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	29	18	68.1 (46.9–83.7)	11	31.9 (16.3–53.1)	0.2148
3-10 тис	107	62	56.3 (45.6–66.5)	45	43.7 (33.5–54.4)	
10-20 тис	145	79	51.7 (42.6–60.7)	66	48.3 (39.3–57.4)	
≥20 тис	70	33	44.0 (31.8–57.1)	37	56.0 (42.9–68.2)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	360	200	54.7 (48.8–60.5)	160	45.3 (39.5–51.2)	0.7680
так	55	31	52.4 (38.1–66.3)	24	47.6 (33.7–61.9)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	340	203	58.7 (52.6–64.5)	137	41.3 (35.5–47.4)	0.0007
так	74	28	35.3 (24.6–47.7)	46	64.7 (52.3–75.4)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	384	212	53.8 (48.1–59.4)	172	46.2 (40.6–51.9)	0.4123
так	30	18	62.0 (42.3–78.5)	12	38.0 (21.5–57.7)	
Результат тесту на ВІЛ						

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	76	39	53.0 (40.0–65.6)	37	47.0 (34.4–60.0)	0.7983
негативний	339	192	54.8 (48.8–60.7)	147	45.2 (39.3–51.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	222	124	53.5 (46.1–60.8)	98	46.5 (39.2–53.9)	
стимулятори	159	86	53.2 (44.3–61.9)	73	46.8 (38.1–55.7)	
опі+стимул	34	21	68.8 (51.1–82.3)	13	31.2 (17.7–48.9)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	238	137	55.6 (48.3–62.6)	101	44.4 (37.4–51.7)	0.5236
стимулятори	176	94	53.4 (45.0–61.6)	82	46.6 (38.4–55.0)	
інші	1	0	0.0	1	100.0	

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										
так	93	44.5	(37.1–52.3)	37	44.7	(33.2–56.9)	56	44.4	(34.9–54.3)	0.9630
N	217			93			124			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	38	67.1	(53.8–78.1)	11	46.4	(27.4–66.5)	27	83.0	(67.1–92.1)	0.0034
N	60			26			34			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	6	74.0	(40.3–92.3)	0	0.0		6	81.4	(45.7–95.8)	0.0654
N	9			1			8			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (мені заплатили) партнер										
так	17	89.8	(71.2–96.9)	13	100.0		4	70.1	(33.4–91.7)	0.0292
N	20			13			7			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	40	23.9	(17.3–31.9)	15	25.4	(15.0–39.5)	25	22.7	(15.1–32.6)	0.2302
часто	31	12.6	(8.7–17.9)	12	11.0	(6.0–19.3)	19	13.9	(8.7–21.5)	
половина	21	8.0	(5.1–12.3)	6	4.6	(2.0–10.3)	15	10.5	(6.1–17.3)	
іноді	18	6.7	(4.2–10.6)	9	7.3	(3.7–14.0)	9	6.2	(3.2–11.8)	
рідко	25	12.0	(8.0–17.6)	16	17.7	(10.7–27.9)	9	7.6	(3.8–14.6)	
ніколи	83	36.9	(29.9–44.5)	34	34.0	(23.9–45.7)	49	39.1	(29.9–49.1)	
N	218			92			126			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	28	48.3	(35.0–61.8)	8	29.4	(14.7–50.1)	20	62.4	(44.3–77.7)	0.0035
часто	7	13.9	(6.5–27.3)	3	18.0	(5.8–43.6)	4	10.8	(3.9–26.4)	

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
половина	5	7.7	(2.9–18.8)	1	2.9	(0.4–18.3)	4	11.3	(3.7–29.3)	
іноді	7	11.8	(5.7–23.1)	6	24.0	(10.9–44.9)	1	2.7	(0.4–17.1)	
рідко	3	4.5	(1.4–13.7)	0	0.0		3	7.9	(2.4–22.8)	
ніколи	9	13.8	(7.0–25.6)	7	25.8	(11.9–47.1)	2	4.9	(1.2–17.9)	
N	59			25			34			
Частота використання презервативів: комерційний (я заплатив) партнер										
завжди	5	60.7	(29.7–85.0)	0	0.0		5	66.3	(33.3–88.6)	
часто	3	23.8	(7.2–55.9)	1	100.0		2	16.9	(3.9–50.5)	
половина	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
іноді	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	2	15.5	(3.6–47.2)	0	0.0		2	16.9	(3.9–50.5)	
N	10			1			9			
Частота використання презервативів: комерційний (мені заплатили) партнер										
завжди	11	61.5	(38.8–80.1)	7	57.5	(29.6–81.3)	4	70.1	(33.4–91.7)	
часто	8	29.1	(13.7–51.5)	8	42.5	(18.7–70.4)	0	0.0		
половина	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
іноді	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	3	9.4	(2.9–26.8)	0	0.0		3	29.9	(8.3–66.6)	
N	22			15			7			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

			Результат тесту на ВІЛ			
		N	позитивний		негативний	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	85	17.5 (13.9–21.8)	415	82.5 (78.2–86.1)	1.0000
Стать							
	чоловік	302	42	14.2 (10.1–19.6)	260	85.8 (80.4–89.9)	0.0518
	жінка	198	43	22.1 (16.1–29.6)	155	77.9 (70.4–83.9)	
Вікова категорія 4							
	<25	23	4	17.2 (6.1–39.9)	19	82.8 (60.1–93.9)	0.0001
	25-34	143	13	8.7 (4.8–15.1)	130	91.3 (84.9–95.2)	
	35-44	246	42	16.2 (11.7–21.9)	204	83.8 (78.1–88.3)	
	45+	88	26	34.9 (23.5–48.3)	62	65.1 (51.7–76.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	23	3	11.7 (3.5–32.9)	20	88.3 (67.1–96.5)	0.0090
	3-5	65	6	7.4 (3.1–16.3)	59	92.6 (83.7–96.9)	
	6-10	102	12	11.2 (6.2–19.4)	90	88.8 (80.6–93.8)	
	≥11	306	63	21.8 (16.7–28.0)	243	78.2 (72.0–83.3)	
Партнерський статус							

		Результат тесту на ВІЛ			
	N	позитивний		негативний	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	234	40	16.4 (11.7–22.3)	194	83.6 (77.7–88.3)	0.5911
живе з партнером	266	45	18.5 (13.4–24.9)	221	81.5 (75.1–86.6)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	192	31	16.6 (11.4–23.7)	161	83.4 (76.3–88.6)	0.0258
неповний робочий день або тимчасово	175	32	18.2 (12.5–25.6)	143	81.8 (74.4–87.5)	
безробітний	64	11	13.9 (7.3–24.8)	53	86.1 (75.2–92.7)	
інвалідність	17	5	49.0 (20.5–78.1)	12	51.0 (21.9–79.5)	
інші	51	6	11.9 (5.0–25.7)	45	88.1 (74.3–95.0)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	32	13	48.1 (27.9–68.9)	19	51.9 (31.1–72.1)	0.0002
3-10 тис	147	24	16.6 (10.7–24.9)	123	83.4 (75.1–89.3)	
10-20 тис	162	24	14.5 (9.6–21.3)	138	85.5 (78.7–90.4)	
≥20 тис	74	11	12.2 (6.7–21.4)	63	87.8 (78.6–93.3)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	437	74	17.5 (13.7–22.2)	363	82.5 (77.8–86.3)	0.9974
так	63	11	17.5 (9.5–29.9)	52	82.5 (70.1–90.5)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

		Результат тесту на ВІЛ			
	N	позитивний		негативний	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	416	59	14.8 (11.1–19.3)	357	85.2 (80.7–88.9)	0.0034
так	83	25	30.2 (20.1–42.6)	58	69.8 (57.4–79.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	461	69	15.4 (11.9–19.6)	392	84.6 (80.4–88.1)	0.0010
так	35	14	38.6 (23.0–56.9)	21	61.4 (43.1–77.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	267	52	19.2 (14.5–25.1)	215	80.8 (74.9–85.5)	

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
стимулятори	193	24	15.0 (9.4–23.0)	169	85.0 (77.0–90.6)	
опі+стимул	40	9	18.3 (9.3–33.0)	31	81.7 (67.0–90.7)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	288	58	19.6 (15.1–25.2)	230	80.4 (74.8–84.9)	0.4838
стимулятори	210	26	14.5 (9.3–22.0)	184	85.5 (78.0–90.7)	
інші	2	1	24.8 (0.0–100.0)	1	75.2 (0.0–100.0)	




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)



Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)




Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
		N	ні		так	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	499	416	83.2 (79.1–86.6)	83	16.8 (13.4–20.9)	1.0000
Стать							
	чоловік	301	252	84.2 (79.3–88.1)	49	15.8 (11.9–20.7)	0.5273
	жінка	198	164	81.7 (74.4–87.3)	34	18.3 (12.7–25.6)	

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	23	19	82.8 (60.1–93.9)	4	17.2 (6.1–39.9)	0.0711
25-34	143	122	85.1 (77.7–90.3)	21	14.9 (9.7–22.3)	
35-44	246	211	85.8 (80.1–90.1)	35	14.2 (9.9–19.9)	
45+	87	64	72.8 (60.4–82.4)	23	27.2 (17.6–39.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	23	20	87.1 (64.7–96.1)	3	12.9 (3.9–35.3)	0.3353
3-5	65	58	90.6 (81.0–95.6)	7	9.4 (4.4–19.0)	
6-10	102	84	79.9 (69.8–87.3)	18	20.1 (12.7–30.2)	
≥11	305	250	82.1 (76.6–86.6)	55	17.9 (13.4–23.4)	
Партнерський статус						
живе сам	234	192	81.3 (74.6–86.5)	42	18.7 (13.5–25.4)	0.3607
живе з партнером	265	224	84.8 (79.5–88.8)	41	15.2 (11.2–20.5)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	192	158	81.8 (74.6–87.3)	34	18.2 (12.7–25.4)	0.8387
неповний робочий день або тимчасово	175	147	82.6 (75.1–88.3)	28	17.4 (11.7–24.9)	
безробітний	64	56	86.9 (74.9–93.6)	8	13.1 (6.4–25.1)	
інвалідність	16	11	77.4 (49.2–92.3)	5	22.6 (7.7–50.8)	
інші	51	43	86.1 (72.6–93.5)	8	13.9 (6.5–27.4)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	31	22	74.2 (54.5–87.4)	9	25.8 (12.6–45.5)	0.0654
3-10 тис	147	129	89.4 (83.3–93.4)	18	10.6 (6.6–16.7)	
10-20 тис	162	135	82.2 (74.8–87.8)	27	17.8 (12.2–25.2)	
≥20 тис	74	58	75.8 (61.6–86.0)	16	24.2 (14.0–38.4)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	436	367	83.9 (79.5–87.4)	69	16.1 (12.6–20.5)	0.2566
так	63	49	77.7 (64.8–86.9)	14	22.3 (13.1–35.2)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	460	392	85.0 (81.0–88.3)	68	15.0 (11.7–19.0)	0.0046
так	35	22	66.2 (48.4–80.3)	13	33.8 (19.7–51.6)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	84	59	70.7 (58.2–80.7)	25	29.3 (19.3–41.8)	0.0034
негативний	415	357	85.8 (81.6–89.1)	58	14.2 (10.9–18.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	267	219	82.6 (76.9–87.1)	48	17.4 (12.9–23.1)	
стимулятори	192	161	82.7 (75.5–88.0)	31	17.3 (12.0–24.5)	
опі+стимул	40	36	90.4 (75.8–96.6)	4	9.6 (3.4–24.2)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	288	238	83.0 (77.6–87.3)	50	17.0 (12.7–22.4)	0.7618
стимулятори	209	176	83.1 (76.3–88.2)	33	16.9 (11.8–23.7)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	82.1	80.8	88.4	0.1165
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	64.5	61.8	77.2	0.0211

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
невиявлений = непередаваний	58.9	56.4	70.8	0.0305
ПКП знижує ризик	60.0	57.9	70.2	0.0793
АРТ слід починати негайно	78.5	76.5	88.0	0.0190
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	49.6	45.4	69.5	0.0002
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	47.2	43.0	67.1	0.0002
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	81.2	79.1	91.1	0.0080
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	45.1	42.5	57.2	0.0317
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	73.1	72.3	76.6	0.5333
лікування слід починати негайно	72.3	69.8	84.2	0.0102
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	41.4	38.9	53.5	0.0333
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	14.6	13.9	18.0	0.4257
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	72.7	70.4	83.4	0.0395
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	40.8	40.1	44.3	0.5308
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	45.7	43.9	53.9	0.1516
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	7.1	7.5	4.9	0.3768
лікування слід починати негайно	74.0	73.2	77.4	0.4533
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	41.5	39.5	51.3	0.0822
ВГС на 100% передається від матері до дитини	15.4	15.8	13.1	0.6084
ВГС передається через кров і статевим шляхом	74.3	73.1	80.4	0.1856
лікування ВГС не існує	42.3	41.3	46.9	0.4097
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	68.2	68.1	68.7	0.9312
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	40.7	41.1	38.5	0.7018

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	308	63.7	(58.9–68.3)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	331	67.9	(63.1–72.3)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	98	36.2	(30.0–42.9)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	29	10.5	(7.0–15.4)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	323	98.7	(96.8–99.5)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	319	99.1	(97.2–99.7)
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	69	22.0	(17.1–27.7)
негативний	255	78.0	(72.3–82.9)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	135	49.3	(42.7–55.9)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	4	1.3	(0.4–4.2)
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	126	52.5	(45.2–59.7)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	23	18.2	(11.6–27.4)
негативний	100	79.3	(69.9–86.3)
не може розкрити	3	2.6	(0.8–7.7)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

			Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців			
		N	ні	так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	291	193	63.8 (57.1–70.0)	98	36.2 (30.0–42.9)	1.0000
Стать							
	чоловік	166	110	66.5 (58.0–74.1)	56	33.5 (25.9–42.0)	0.3620
	жінка	125	83	60.4 (49.7–70.3)	42	39.6 (29.7–50.3)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	10	8	81.8 (46.4–95.9)	2	18.2 (4.1–53.6)	0.6628
25-34	76	51	66.4 (54.2–76.8)	25	33.6 (23.2–45.8)	
35-44	154	101	61.7 (52.1–70.4)	53	38.3 (29.6–47.9)	
45+	51	33	63.6 (46.8–77.6)	18	36.4 (22.4–53.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	9	5	48.5 (18.2–79.9)	4	51.5 (20.1–81.8)	0.2256
3-5	32	24	76.6 (57.4–88.8)	8	23.4 (11.2–42.6)	
6-10	57	44	71.0 (55.8–82.6)	13	29.0 (17.4–44.2)	
≥11	193	120	60.8 (52.4–68.7)	73	39.2 (31.3–47.6)	
Партнерський статус						
живе сам	119	81	67.0 (56.2–76.4)	38	33.0 (23.6–43.8)	0.4204
живе з партнером	172	112	61.6 (52.8–69.6)	60	38.4 (30.4–47.2)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	118	81	64.6 (54.2–73.8)	37	35.4 (26.2–45.8)	0.8114
неповний робочий день або тимчасово	101	66	60.1 (48.4–70.8)	35	39.9 (29.2–51.6)	
безробітний	30	19	61.6 (39.4–79.9)	11	38.4 (20.1–60.6)	
інвалідність	13	8	75.1 (44.0–92.0)	5	24.9 (8.0–56.0)	
інші	29	19	70.1 (50.0–84.6)	10	29.9 (15.4–50.0)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	21	12	62.6 (37.2–82.6)	9	37.4 (17.4–62.8)	0.9630
3-10 тис	78	54	65.7 (52.0–77.2)	24	34.3 (22.8–48.0)	
10-20 тис	111	80	68.0 (57.6–76.8)	31	32.0 (23.2–42.4)	
≥20 тис	51	33	64.1 (47.3–78.1)	18	35.9 (21.9–52.7)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	249	168	63.8 (56.4–70.6)	81	36.2 (29.4–43.6)	0.9699
так	42	25	64.1 (47.9–77.6)	17	35.9 (22.4–52.1)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

	N	Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців: ні		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців: так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	224	169	73.2 (65.7–79.6)	55	26.8 (20.4–34.3)	0.0000
так	66	23	32.2 (21.3–45.3)	43	67.8 (54.7–78.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	262	182	67.4 (60.3–73.7)	80	32.6 (26.3–39.7)	0.0020
так	27	11	36.0 (19.6–56.5)	16	64.0 (43.5–80.4)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	72	44	58.8 (44.7–71.6)	28	41.2 (28.4–55.3)	0.3849
негативний	219	149	65.6 (57.9–72.5)	70	34.4 (27.5–42.1)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	152	96	57.9 (48.4–66.8)	56	42.1 (33.2–51.6)	
стимулятори	110	78	71.6 (61.1–80.2)	32	28.4 (19.8–38.9)	
опі+стимул	29	19	67.2 (46.5–82.8)	10	32.8 (17.2–53.5)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	166	107	60.7 (51.7–69.0)	59	39.3 (31.0–48.3)	0.0698
стимулятори	123	86	70.5 (60.6–78.8)	37	29.5 (21.2–39.4)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	85	81.0 (69.2–89.0)	1.0000	68	96.9 (90.6–99.0)	1.0000	65	52	81.5 (69.4–89.5)	1.0000
Стать											
	чоловік	42	65.4 (46.6–80.4)	0.0003	28	100.0	0.1950	28	20	71.2 (50.1–85.9)	0.1044
	жінка	43	95.0 (85.2–98.5)		40	95.0 (85.0–98.5)		37	32	88.2 (72.6–95.5)	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4										
<25	4	78.5 (24.9–97.6)	0.7707	3	100.0	0.5741	3	3	100.0	0.5558
25-34	13	84.5 (52.8–96.4)		11	93.1 (62.4–99.1)		10	8	85.4 (53.2–96.8)	
35-44	42	75.9 (60.8–86.5)		30	95.2 (81.8–98.9)		28	24	85.5 (65.1–94.9)	
45+	26	86.4 (52.2–97.4)		24	100.0		24	17	73.6 (50.7–88.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	3	70.0 (15.4–96.8)	0.5808	2	100.0	0.8857	2	2	100.0	0.3034
3-5	6	58.9 (19.5–89.5)		4	100.0		4	2	41.0 (8.5–83.8)	
6-10	12	85.3 (54.9–96.5)		10	100.0		10	8	75.5 (34.8–94.7)	
≥11	63	82.0 (67.5–90.9)		51	96.1 (88.2–98.8)		48	39	83.5 (69.9–91.7)	
Партнерський статус										
живе сам	40	85.4 (71.4–93.2)	0.3975	33	93.2 (80.2–97.9)	0.0679	30	28	91.3 (69.3–98.0)	0.1198
живе з партнером	45	77.6 (59.3–89.2)		35	100.0		35	24	73.9 (56.3–86.2)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	31	86.3 (69.6–94.5)	0.5182	26	97.7 (85.0–99.7)	0.7987	25	20	78.2 (55.4–91.2)	0.1037
неповний робочий день або тимчасово	32	76.5 (58.9–88.1)		23	93.4 (76.2–98.4)		21	20	96.9 (80.1–99.6)	
безробітний	11	93.1 (62.1–99.1)		10	100.0		10	8	85.4 (53.2–96.8)	
інвалідність	5	62.9 (12.0–95.4)		4	100.0		4	1	59.0 (11.0–94.4)	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
інші	6	85.7 (39.2–98.2)		5	100.0		5	3	50.1 (12.8–87.3)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	13	78.0 (28.9–96.9)	0.6522	12	94.4 (65.7–99.3)	0.6001	11	9	85.2 (51.8–96.9)	0.3327
3-10 тис	24	87.2 (68.9–95.4)		20	93.2 (74.7–98.4)		18	11	67.1 (41.1–85.7)	
10-20 тис	24	71.4 (50.7–85.9)		16	100.0		16	14	84.5 (53.1–96.4)	
≥20 тис	11	71.6 (39.3–90.8)		8	100.0		8	8	100.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	74	80.3 (67.3–89.0)	0.6455	59	96.5 (89.4–98.9)	0.5472	56	44	80.8 (67.6–89.5)	0.7177
так	11	85.9 (55.6–96.7)		9	100.0		9	8	86.3 (42.7–98.2)	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	59	75.2 (59.9–86.0)	0.0294	44	95.3 (85.8–98.5)	0.2375	41	32	79.1 (62.4–89.6)	0.3095
так	25	94.2 (78.2–98.7)		23	100.0		23	20	89.0 (69.6–96.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	69	81.1 (67.3–90.0)	0.5312	56	96.2 (88.6–98.8)	0.5188	53	42	79.9 (65.8–89.1)	0.3213
так	14	73.3 (44.4–90.4)		10	100.0		10	9	92.1 (57.3–99.0)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	85	81.0 (69.0–89.0)		68	96.9 (90.5–99.1)		65	52	81.5 (69.2–89.6)	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
негативний	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	52	84.8 (72.4–92.2)		43	100.0		43	37	83.7 (66.9–92.8)	
стимулятори	24	75.5 (48.0–91.2)		18	93.4 (75.2–98.5)		16	11	80.7 (57.2–92.9)	
опі+стимул	9	75.8 (37.9–94.2)		7	85.8 (40.3–98.2)		6	4	62.9 (22.3–90.9)	
інші	0			0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	58	83.0 (71.0–90.6)	0.7454	47	98.5 (89.7–99.8)	0.5152	46	40	85.3 (69.4–93.7)	0.0862
стимулятори	26	76.7 (49.9–91.6)		20	93.8 (76.7–98.6)		18	12	78.1 (55.0–91.2)	
інші	1	100.0		1	100.0		1	0	0.0	

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	5	6.2	(2.5–14.7)
1-2 тижні тому	3	3.7	(1.2–11.1)
3-4 тижні тому	5	7.1	(2.9–16.4)
1-3 місяці тому	4	5.7	(2.1–14.6)
ніколи	48	77.3	(65.4–86.0)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	8	42.5	(20.0–68.6)
ліків не було	6	44.9	(20.2–72.4)
був під впливом	3	12.6	(3.7–35.1)
не хотів, щоб інші бачили	0	0.0	
інші	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	2	10.6	(2.5–35.7)
відсутність часу на відвідування клініки	1	3.2	(0.4–20.2)
відсутність мотивації відвідувати клініку	4	36.8	(12.8–69.7)
пропуск візиту, важко повернутися	1	3.6	(0.5–22.5)
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	1	6.6	(0.9–35.4)
вживання наркотиків	6	44.3	(19.5–72.2)
побічні ефекти або ускладнення	1	6.2	(0.9–33.5)
немає розуміння як	0	0.0	
втрачено або продано всі АРВ-препарати	0	0.0	

		n	%	ДІ
Причини відмови від ДРТ				
	вживання алкоголю	1	5.0	(0.7–28.8)
Причини відмови від АРТ				
	довго чекав і пішов	0	0.0	
Час на АРТ				
	≤3м	1	4.2	(0.6–25.4)
	4-24м	7	55.2	(28.5–79.2)
	25-60м	7	35.4	(15.4–62.3)
	5 років +	1	5.2	(0.7–30.1)

9. Доконтактна профілактика




Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

			Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
		N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього											
	Разом	500	42	9.4 (6.7–13.0)	18	4.8 (2.7–8.4)	109	20.0 (16.4–24.0)	331	65.9 (60.9–70.5)	1.0000
Стать											
	чоловік	302	28	10.1 (6.7–15.0)	8	3.5 (1.5–7.9)	54	16.2 (12.4–20.9)	212	70.3 (64.1–75.7)	0.0925
	жінка	198	14	8.3 (4.5–14.6)	10	6.7 (3.1–13.9)	55	25.3 (19.1–32.7)	119	59.7 (51.5–67.4)	
Вікова категорія 4											
	<25	23	2	7.4 (1.7–27.2)	0	0.0	5	19.7 (7.7–42.0)	16	72.9 (50.6–87.7)	0.0555
	25-34	143	20	14.4 (9.2–21.9)	2	1.3 (0.3–5.5)	27	16.2 (11.0–23.1)	94	68.1 (59.5–75.7)	
	35-44	246	18	9.0 (5.2–15.2)	14	8.0 (4.2–14.7)	56	20.9 (15.9–27.0)	158	62.1 (54.7–69.0)	
	45+	88	2	2.9 (0.7–11.9)	2	2.7 (0.6–11.7)	21	23.3 (14.5–35.2)	63	71.0 (58.8–80.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків											
	≤2	23	3	11.7 (3.5–32.9)	0	0.0	2	8.2 (1.8–29.8)	18	80.1 (57.9–92.2)	0.0417
	3-5	65	5	9.4 (3.6–22.1)	1	1.1 (0.2–8.0)	7	8.5 (3.9–17.5)	52	81.0 (68.4–89.4)	

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
6-10	102	12	13.7 (7.7–23.3)	2	2.1 (0.5–8.4)	25	22.6 (15.3–32.0)	63	61.6 (51.1–71.0)	
≥11	306	22	7.9 (4.8–12.9)	15	6.8 (3.7–12.4)	74	22.3 (17.6–27.9)	195	62.9 (56.3–69.1)	
Партнерський статус										
живе сам	234	25	11.9 (7.7–17.9)	6	4.8 (1.9–11.8)	42	16.8 (12.1–22.8)	161	66.5 (59.0–73.2)	0.3571
живе з партнером	266	17	7.2 (4.1–12.1)	12	4.9 (2.4–9.5)	67	22.6 (17.7–28.5)	170	65.3 (58.6–71.5)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	192	16	6.8 (4.1–11.0)	8	4.2 (2.0–8.6)	53	28.0 (21.3–35.9)	115	61.1 (53.1–68.5)	0.0792
неповний робочий день або тимчасово	175	11	7.9 (4.0–15.1)	6	4.3 (1.5–11.6)	29	15.3 (10.6–21.6)	129	72.5 (64.2–79.5)	
безробітний	64	7	15.6 (6.9–31.4)	2	9.7 (2.5–31.1)	11	12.4 (6.5–22.2)	44	62.4 (46.8–75.8)	
інвалідність	17	0	0.0	1	4.5 (0.5–30.4)	5	21.6 (7.4–48.7)	11	73.9 (46.1–90.3)	
інші	51	8	18.3 (8.8–34.1)	1	2.3 (0.3–15.1)	10	15.5 (8.0–27.9)	32	64.0 (48.2–77.2)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	32	0	0.0	0	0.0	9	23.7 (11.5–42.5)	23	76.3 (57.5–88.5)	0.4382
3-10 тис	147	11	9.2 (4.7–17.4)	3	3.5 (0.8–13.2)	30	16.8 (11.7–23.6)	103	70.5 (61.4–78.2)	
10-20 тис	162	13	7.5 (4.2–13.2)	9	4.9 (2.4–9.8)	36	22.9 (16.4–31.0)	104	64.6 (56.1–72.4)	
≥20 тис	74	10	15.0 (7.8–26.9)	2	7.2 (1.5–27.7)	20	23.1 (14.7–34.2)	42	54.8 (41.8–67.2)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	437	40	10.1 (7.1–14.1)	13	4.5 (2.3–8.5)	95	19.7 (16.0–24.1)	289	65.7 (60.4–70.6)	0.4002
так	63	2	3.6 (0.9–13.8)	5	7.5 (2.7–18.8)	14	21.6 (12.6–34.4)	42	67.4 (53.8–78.5)	

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	416	22	6.5 (4.0–10.5)	12	3.6 (1.7–7.3)	74	15.6 (12.3–19.7)	308	74.2 (69.0–78.8)	0.0000
так	83	20	23.4 (14.8–34.8)	6	10.9 (4.4–24.8)	35	41.5 (30.2–53.7)	22	24.2 (15.8–35.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	461	39	9.5 (6.7–13.3)	18	5.2 (2.9–9.1)	95	18.6 (15.1–22.6)	309	66.7 (61.6–71.5)	0.3563
так	35	3	9.3 (2.9–26.3)	0	0.0	12	30.0 (16.9–47.5)	20	60.7 (42.8–76.1)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	85	0	0.0	0	0.0	40	45.4 (33.5–57.9)	45	54.6 (42.1–66.5)	0.0000
негативний	415	42	11.3 (8.1–15.6)	18	5.8 (3.3–10.1)	69	14.6 (11.4–18.5)	286	68.3 (62.9–73.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	267	24	11.4 (7.3–17.4)	10	6.1 (2.8–12.6)	59	19.6 (15.2–24.9)	174	62.9 (56.0–69.4)	
стимулятори	193	15	6.9 (4.0–11.6)	6	3.1 (1.3–7.2)	40	20.5 (14.7–28.0)	132	69.5 (61.6–76.3)	
опі+стимул	40	3	7.7 (2.3–22.4)	2	4.9 (1.1–19.5)	10	19.4 (10.1–34.1)	25	68.0 (51.5–80.9)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	288	25	10.3 (6.7–15.5)	11	6.0 (2.8–12.1)	64	19.8 (15.5–24.9)	188	64.0 (57.4–70.1)	0.0167
стимулятори	210	16	6.7 (3.9–11.1)	7	3.4 (1.6–7.4)	44	20.1 (14.6–27.1)	143	69.8 (62.4–76.3)	
інші	2	1	75.2 (0.0–100.0)	0	0.0	1	24.8 (0.0–100.0)	0	0.0	

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	42	9.4	(6.7–13.0)
приймав в минулому	18	4.8	(2.7–8.4)
ніколи не приймав	109	20.0	(16.4–24.0)
не знає що це	331	65.9	(60.9–70.5)
Обізнаність про ДКП			
ні	331	65.9	(60.9–70.5)
так	169	34.1	(29.5–39.1)
Використання ДКП зараз			
ні	458	90.6	(87.0–93.3)
так	42	9.4	(6.7–13.0)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	127	72.6	(63.8–79.9)
так	42	27.4	(20.1–36.2)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)




Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)




Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	1	6.6	(0.9–35.6)
клініка закрита після лютого 2022 року	0	0.0	
слабкий або відсутній ефект	3	21.9	(6.8–51.9)
побічні ефекти	9	78.7	(49.2–93.3)
не хочу відвідувати клініку	2	13.1	(3.1–41.3)
не хочу кидати наркотики	4	39.3	(15.4–69.7)
важко дістатися до клініки	1	6.6	(0.9–35.6)
не потребує	1	6.6	(0.9–35.6)
не подобається ставлення лікаря	4	26.9	(9.7–55.8)
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	1	10.9	(1.5–49.1)
не змінилось	6	44.3	(19.6–72.1)
зменшилося	5	44.8	(19.4–73.3)
Чи купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	103	19.0	(15.6–22.9)
так, бупренорфін	4	0.7	(0.2–1.9)
не купував	384	80.4	(76.4–83.8)
Де купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	384	80.4	(76.4–83.8)
купляв на чорн. ринку	105	19.4	(16.0–23.3)
купляв в приватній клініці	2	0.3	(0.1–1.2)
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорн.ринку			
ін'єкційно	78	73.2	(63.3–81.2)
ін'єкційно у суміші	25	24.2	(16.5–34.1)
ковтав або розсмоктував	3	2.6	(0.8–7.7)
нюхав	0	0.0	

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	**приймає зараз**		**приймав в минулому**		**ніколи не приймав, але планує**		**не знає або не планує**		
		n	**% (ДІ)**	**n**	**% (ДІ)**	**n**	**% (ДІ)**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Всього										
Разом	496	35	6.3 (4.5–8.9)	12	2.2 (1.2–3.9)	85	17.5 (14.0–21.6)	364	74.0 (69.5–78.0)	1.0000
Стать										
чоловік	300	24	7.0 (4.6–10.5)	7	2.1 (1.0–4.4)	46	15.6 (11.5–20.8)	223	75.3 (69.6–80.3)	0.5877
жінка	196	11	5.4 (2.9–9.9)	5	2.3 (0.9–5.9)	39	20.3 (14.6–27.5)	141	72.1 (64.5–78.6)	
Вікова категорія 4										
<25	23	0	0.0	0	0.0	1	3.7 (0.5–24.3)	22	96.3 (75.7–99.5)	0.2204
25-34	143	9	5.8 (2.9–11.4)	2	1.1 (0.3–4.3)	25	17.7 (11.8–25.6)	107	75.4 (67.0–82.3)	
35-44	245	20	7.5 (4.7–11.7)	5	2.0 (0.8–5.0)	45	19.3 (14.1–25.9)	175	71.2 (64.3–77.2)	
45+	85	6	5.6 (2.5–12.3)	5	5.2 (2.1–12.2)	14	15.7 (9.0–25.9)	60	73.5 (62.4–82.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	23	0	0.0	0	0.0	2	7.0 (1.6–26.2)	21	93.0 (73.8–98.4)	0.5147
3-5	65	3	3.0 (0.9–9.6)	1	2.8 (0.4–18.0)	10	18.6 (9.8–32.4)	51	75.6 (61.5–85.7)	
6-10	102	6	7.0 (3.1–15.2)	1	0.9 (0.1–6.4)	17	15.5 (9.5–24.3)	78	76.6 (66.7–84.2)	
≥11	303	26	7.4 (5.0–10.9)	10	2.6 (1.4–4.9)	56	18.9 (14.3–24.6)	211	71.0 (65.0–76.4)	
Партнерський статус										
живе сам	231	17	6.0 (3.7–9.6)	4	1.9 (0.7–5.3)	38	16.6 (11.8–22.9)	172	75.5 (68.9–81.2)	0.9118
живе з партнером	265	18	6.7 (4.1–10.7)	8	2.4 (1.2–4.9)	47	18.3 (13.6–24.1)	192	72.7 (66.3–78.2)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	190	12	5.8 (3.2–10.3)	5	3.0 (1.2–7.3)	32	16.2 (11.4–22.5)	141	75.0 (67.9–81.0)	0.7283
неповний робочий день або тимчасово	175	15	8.1 (4.7–13.5)	4	2.0 (0.7–5.4)	33	19.7 (13.8–27.4)	123	70.2 (62.1–77.2)	
безробітний	62	2	2.3 (0.5–10.1)	2	1.8 (0.4–7.3)	12	20.9 (11.0–36.0)	46	75.0 (60.2–85.7)	

		Отримував ЗПТ (з усіх)							
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
інвалідність	17	3	12.6 (3.3–37.6)	1	3.6 (0.4–25.7)	2	8.1 (1.6–31.7)	11	75.7 (48.6–91.1)	
інші	51	3	5.7 (1.8–16.9)	0	0.0	6	13.9 (5.8–29.8)	42	80.4 (64.6–90.2)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	32	3	6.7 (1.9–20.8)	3	7.7 (2.2–23.3)	3	7.7 (2.2–23.3)	23	77.9 (59.6–89.4)	0.2971
3-10 тис	146	10	6.7 (3.5–12.4)	2	1.8 (0.4–7.4)	29	19.9 (13.5–28.5)	105	71.6 (62.6–79.1)	
10-20 тис	162	13	7.6 (4.2–13.2)	2	1.0 (0.2–3.9)	30	18.2 (12.6–25.5)	117	73.3 (65.3–80.0)	
≥20 тис	74	9	10.3 (5.2–19.3)	2	2.7 (0.7–10.4)	7	11.2 (5.1–23.0)	56	75.8 (63.6–84.9)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	434	28	5.9 (4.0–8.6)	8	1.6 (0.8–3.4)	78	18.7 (14.8–23.2)	320	73.8 (69.0–78.2)	0.0107
так	62	7	10.1 (4.7–20.2)	4	6.5 (2.4–16.7)	7	8.4 (3.9–17.2)	44	75.0 (62.7–84.3)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

		Отримував ЗПТ (з усіх)							
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	414	22	5.0 (3.2–7.8)	7	1.5 (0.7–3.4)	70	17.5 (13.6–22.1)	315	76.0 (71.0–80.3)	0.0052
так	81	13	13.3 (7.7–22.1)	5	5.4 (2.2–12.8)	15	17.9 (10.5–28.8)	48	63.4 (51.6–73.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	461	0	0.0	12	2.3 (1.3–4.2)	85	18.7 (15.0–23.1)	364	79.0 (74.5–82.9)	0.0000
так	35	35	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	83	14	14.5 (8.3–24.2)	5	4.7 (1.9–11.0)	10	12.6 (6.5–23.0)	54	68.2 (56.3–78.1)	0.0028
негативний	413	21	4.7 (3.0–7.3)	7	1.7 (0.8–3.6)	75	18.5 (14.6–23.2)	310	75.1 (70.2–79.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	264	29	10.3 (7.0–14.7)	5	1.6 (0.7–4.0)	54	22.1 (16.8–28.6)	176	66.0 (59.2–72.1)	

	N	Отримував ЗПТ (з усіх)								
		приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
стимулятори	192	1	0.3 (0.0–1.9)	5	2.6 (1.0–6.5)	26	12.1 (8.1–17.7)	160	85.0 (79.0–89.5)	
опі+стимул	40	5	10.3 (4.0–24.3)	2	3.6 (0.8–14.1)	5	12.6 (5.0–28.2)	28	73.5 (57.0–85.2)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	285	33	10.7 (7.6–15.1)	6	1.8 (0.8–4.0)	57	20.9 (16.0–26.8)	189	66.5 (60.2–72.3)	0.0003
стимулятори	209	2	0.7 (0.2–2.8)	6	2.7 (1.1–6.3)	27	11.7 (7.9–17.0)	174	84.9 (79.2–89.3)	
інші	2	0	0.0	0	0.0	1	75.2 (0.0–100.0)	1	24.8 (0.0–100.0)	




Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)




Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

		n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь				
	так	146	25.9	(22.1–30.1)
Кількість передозувань протягом життя				
	1	46	35.8	(27.7–44.8)
	2-4	63	43.0	(34.6–51.8)
	5+	31	21.2	(14.9–29.3)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	так	36	5.7	(4.0–8.0)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)				
	так	36	22.2	(16.0–29.9)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців				
	1	27	74.3	(56.7–86.5)

	n	%	ДІ
2-4	9	25.7	(13.5–43.3)
5+	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)			
метадон	6	39.3	(18.4–65.0)
інші опіоїди	4	24.2	(9.1–50.4)
стимулятор	7	36.6	(17.5–61.0)
інші	0	0.0	
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)			
метадон+стимулятор	1	36.4	(4.9–86.5)
метадон+барбіт. або димедр.	0	0.0	
метадон+інше	1	36.4	(4.9–86.5)
інші	1	27.1	(3.2–80.6)
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)			
метадон	7	37.9	(17.8–63.3)
інші опіоїди	2	16.7	(4.2–47.7)
стимулятор	6	40.6	(18.4–67.4)
інші	1	4.8	(0.7–28.1)
Знання та досвід налоксону			
ніколи не чув	245	51.6	(46.7–56.5)
знає, але не користувався	152	29.3	(25.1–33.9)
користувався	45	7.6	(5.6–10.3)
користувались друзі	52	10.2	(7.6–13.6)
користувався сам та друзі	6	1.2	(0.5–2.8)

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	494	458	94.3 (92.0–96.0)	36	5.7 (4.0–8.0)	1.0000
Стать						
чоловік	297	271	92.8 (89.3–95.2)	26	7.2 (4.8–10.7)	0.0600
жінка	197	187	96.4 (93.3–98.1)	10	3.6 (1.9–6.7)	
Вікова категорія 4						
<25	21	18	90.6 (72.1–97.3)	3	9.4 (2.7–27.9)	0.5159
25-34	140	132	96.0 (91.9–98.0)	8	4.0 (2.0–8.1)	
35-44	246	229	94.4 (90.7–96.7)	17	5.6 (3.3–9.3)	
45+	87	79	92.3 (85.0–96.3)	8	7.7 (3.7–15.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	21	19	93.7 (75.3–98.6)	2	6.3 (1.4–24.7)	0.5445

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	64	56	90.8 (81.9–95.6)	8	9.2 (4.4–18.1)	
6-10	101	95	95.6 (90.2–98.1)	6	4.4 (1.9–9.8)	
≥11	304	284	94.6 (91.4–96.6)	20	5.4 (3.4–8.6)	
Партнерський статус						
живе сам	231	212	92.9 (88.7–95.6)	19	7.1 (4.4–11.3)	0.1726
живе з партнером	263	246	95.5 (92.8–97.3)	17	4.5 (2.7–7.2)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	189	173	93.5 (89.4–96.1)	16	6.5 (3.9–10.6)	0.3626
неповний робочий день або тимчасово	173	162	94.7 (90.2–97.2)	11	5.3 (2.8–9.8)	
безробітний	63	61	97.8 (91.3–99.5)	2	2.2 (0.5–8.7)	
інвалідність	17	16	96.4 (74.3–99.6)	1	3.6 (0.4–25.7)	
інші	51	45	90.0 (77.0–96.1)	6	10.0 (3.9–23.0)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	32	30	95.3 (81.6–98.9)	2	4.7 (1.1–18.4)	0.8871
3-10 тис	143	133	93.8 (88.4–96.8)	10	6.2 (3.2–11.6)	
10-20 тис	162	152	94.8 (90.1–97.4)	10	5.2 (2.6–9.9)	
≥20 тис	73	65	92.6 (85.2–96.4)	8	7.4 (3.6–14.8)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	432	408	95.8 (93.7–97.3)	24	4.2 (2.7–6.3)	0.0000
так	62	50	82.6 (70.3–90.5)	12	17.4 (9.5–29.7)	

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	411	381	94.3 (91.7–96.1)	30	5.7 (3.9–8.3)	0.9500
так	82	76	94.4 (87.8–97.6)	6	5.6 (2.4–12.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	456	423	94.4 (91.9–96.1)	33	5.6 (3.9–8.1)	0.6701
так	35	32	92.7 (78.6–97.8)	3	7.3 (2.2–21.4)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	83	77	93.9 (86.7–97.4)	6	6.1 (2.6–13.3)	0.8663
негативний	411	381	94.4 (91.8–96.2)	30	5.6 (3.8–8.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	262	242	93.8 (90.3–96.1)	20	6.2 (3.9–9.7)	
стимулятори	192	180	96.0 (92.8–97.8)	12	4.0 (2.2–7.2)	
опі+стимул	40	36	89.0 (71.6–96.3)	4	11.0 (3.7–28.4)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	283	262	93.9 (90.5–96.1)	21	6.1 (3.9–9.5)	0.8285
стимулятори	209	194	94.8 (91.1–97.0)	15	5.2 (3.0–8.9)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	500	245	51.6 (46.7–56.5)	204	39.6 (34.9–44.4)	51	8.8 (6.6–11.6)	1.0000
Стать								
чоловік	302	137	47.4 (41.2–53.7)	129	41.6 (35.6–47.8)	36	11.0 (7.9–15.2)	0.0451
жінка	198	108	57.6 (49.6–65.1)	75	36.7 (29.4–44.6)	15	5.7 (3.4–9.6)	
Вікова категорія 4								
<25	23	17	78.6 (57.1–91.0)	6	21.4 (9.0–42.9)	0	0.0	0.0113

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
25-34	143	82	60.9 (52.0–69.1)	52	33.4 (25.7–42.0)	9	5.7 (2.9–11.0)	
35-44	246	112	47.4 (40.3–54.5)	105	42.4 (35.5–49.5)	29	10.3 (7.0–14.8)	
45+	88	34	41.9 (30.4–54.4)	41	46.2 (34.6–58.3)	13	11.9 (6.8–20.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	23	18	83.1 (62.9–93.5)	5	16.9 (6.5–37.1)	0	0.0	0.0011
3-5	65	39	61.9 (48.1–73.9)	21	31.4 (20.3–45.1)	5	6.7 (2.7–15.9)	
6-10	102	62	60.6 (50.1–70.1)	31	31.0 (22.2–41.4)	9	8.5 (4.3–15.9)	
≥11	306	123	44.0 (37.6–50.6)	146	45.8 (39.5–52.3)	37	10.2 (7.2–14.1)	
Партнерський статус								
живе сам	234	124	52.4 (45.2–59.5)	90	39.8 (32.9–47.2)	20	7.8 (4.9–12.2)	0.7743
живе з партнером	266	121	51.0 (44.2–57.7)	114	39.3 (33.1–45.9)	31	9.7 (6.8–13.7)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	192	89	48.9 (41.0–56.8)	83	41.6 (34.1–49.5)	20	9.5 (6.1–14.6)	0.9468
неповний робочий день або тимчасово	175	86	50.7 (42.5–58.8)	71	40.3 (32.6–48.5)	18	9.0 (5.6–14.3)	
безробітний	64	37	57.6 (43.2–70.8)	22	35.5 (23.1–50.2)	5	6.9 (2.8–16.3)	
інвалідність	17	7	56.2 (27.2–81.5)	9	40.2 (16.7–69.3)	1	3.6 (0.4–25.7)	
інші	51	26	55.6 (40.0–70.2)	18	33.9 (21.1–49.6)	7	10.5 (4.4–22.9)	
Категорія місячного доходу								

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	32	16	55.8 (35.3–74.5)	13	36.1 (19.7–56.5)	3	8.2 (2.4–24.4)	0.0041
3-10 тис	147	78	53.9 (44.9–62.7)	61	40.9 (32.4–50.0)	8	5.2 (2.6–10.3)	
10-20 тис	162	66	45.3 (36.8–54.1)	68	38.9 (31.1–47.3)	28	15.8 (10.8–22.5)	
≥20 тис	74	25	31.7 (21.5–44.0)	41	60.7 (48.2–72.0)	8	7.6 (3.7–15.0)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	437	226	54.6 (49.3–59.7)	173	38.0 (33.0–43.2)	38	7.5 (5.4–10.3)	0.0002
так	63	19	28.8 (18.4–42.0)	31	52.0 (38.8–65.0)	13	19.2 (11.0–31.5)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	416	208	53.3 (47.9–58.6)	167	38.2 (33.2–43.5)	41	8.5 (6.2–11.6)	0.2600
так	83	36	42.9 (31.6–55.0)	37	46.5 (34.6–58.8)	10	10.6 (5.6–19.1)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	461	235	53.8 (48.6–58.8)	184	38.4 (33.6–43.4)	42	7.8 (5.7–10.7)	0.0002
так	35	7	21.6 (9.9–40.7)	19	53.4 (35.6–70.4)	9	25.0 (12.9–43.0)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	85	37	50.4 (38.1–62.8)	34	36.0 (25.3–48.4)	14	13.5 (7.8–22.4)	0.2815
негативний	415	208	51.9 (46.5–57.2)	170	40.3 (35.2–45.6)	37	7.8 (5.6–10.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	267	123	48.0 (41.3–54.8)	114	42.0 (35.5–48.7)	30	10.0 (6.9–14.2)	
стимулятори	193	110	60.3 (52.3–67.7)	67	33.2 (26.2–41.0)	16	6.5 (3.8–10.9)	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
опі+стимул	40	12	31.1 (17.6–48.6)	23	56.4 (39.4–72.0)	5	12.6 (5.0–28.2)	
інші	0	0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	288	130	47.1 (40.7–53.6)	125	42.4 (36.3–48.9)	33	10.5 (7.4–14.6)	0.4022
стимулятори	210	114	57.1 (49.4–64.4)	78	36.1 (29.2–43.6)	18	6.9 (4.2–11.1)	
інші	2	1	75.2 (0.0–100.0)	1	24.8 (0.0–100.0)	0	0.0	

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	27	5.5	(3.7–8.2)
	гепатит C	59	13.0	(9.8–17.0)
	сифіліс	17	3.5	(2.1–5.7)
	гонорея	29	6.3	(4.3–9.1)
	хламідіоз	47	11.4	(8.3–15.5)
	герпес	75	15.4	(12.2–19.4)
	папіломавірус	6	1.2	(0.5–2.6)
	туберкульоз	17	3.8	(2.2–6.6)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	15	54.4	(34.7–72.8)
	пролікувався неуспішно	4	18.1	(6.7–40.4)
	не завершив	5	18.8	(7.9–38.6)
	зараз лікується	3	8.7	(2.7–24.3)
	ніколи не лікувався	0	0.0	
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	20	36.6	(23.4–52.2)
	пролікувався неуспішно	4	6.7	(2.3–18.0)
	не завершив	2	3.4	(0.8–13.0)
	зараз лікується	8	11.8	(5.6–23.3)
	ніколи не лікувався	23	41.4	(27.3–57.2)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	6	35.2	(15.8–61.0)
	пролікувався неуспішно	1	7.0	(1.0–36.4)
	не завершив	2	15.6	(3.8–46.8)
	зараз лікується	1	5.2	(0.7–29.7)
	ніколи не лікувався	7	37.0	(17.6–61.6)
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	16	95.2	(71.6–99.3)
	пролікувався неуспішно	1	4.8	(0.7–28.4)
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	

	n	%	ДІ
ніколи не лікувався	0	0.0	

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

	n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців			
так	149	28.6	(24.4–33.2)
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	116	23.5	(19.4–28.0)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	66	54.1	(43.6–64.3)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	33	34.0	(24.2–45.4)
приватна клініка	8	6.2	(2.9–12.6)
приватна лабораторія	2	2.3	(0.5–9.3)
протитуберкульозного диспансеру	0	0.0	
наркологічний диспансер	0	0.0	
ІПСШ	9	7.7	(3.9–14.6)
швидкої допомоги	23	16.4	(10.7–24.2)
мобільна амбулаторія	0	0.0	
інше	3	2.8	(0.9–8.4)
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	61	51.0	(40.6–61.3)
лікарня, ВІЛ-клініка	20	21.8	(13.6–33.1)
приватна клініка	7	5.6	(2.5–12.0)
приватна лабораторія	0	0.0	
протитуберкульозний диспансер	0	0.0	
наркологічна клініка	1	1.0	(0.1–6.9)
ІПСШ клініка	9	7.7	(3.9–14.6)
швидка допомога	18	13.0	(8.0–20.3)
мобільна клініка	0	0.0	
інші	0	0.0	
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	106	92.3	(85.6–96.0)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	211	45.1	(40.1–50.2)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	2	1.0	(0.2–3.8)
раз на місяць	24	11.9	(7.6–18.1)
3-4 рази в 12 місяців	104	51.0	(43.1–58.9)
тільки один раз	76	36.1	(28.9–44.1)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	493	357	73.3 (68.8–77.3)	136	26.7 (22.7–31.2)	1.0000
Стать							
	чоловік	297	213	72.1 (66.1–77.3)	84	27.9 (22.7–33.9)	0.5025
	жінка	196	144	75.0 (68.0–80.9)	52	25.0 (19.1–32.0)	
Вікова категорія 4							
	<25	23	14	60.7 (37.7–79.7)	9	39.3 (20.3–62.3)	0.4492
	25-34	142	107	77.0 (69.0–83.5)	35	23.0 (16.5–31.0)	
	35-44	242	176	73.0 (66.3–78.7)	66	27.0 (21.3–33.7)	
	45+	86	60	71.7 (60.3–80.9)	26	28.3 (19.1–39.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	23	12	55.5 (33.4–75.6)	11	44.5 (24.4–66.6)	0.1090
	3-5	65	42	67.7 (54.4–78.6)	23	32.3 (21.4–45.6)	
	6-10	101	74	70.5 (59.9–79.3)	27	29.5 (20.7–40.1)	
	≥11	301	226	76.4 (70.8–81.3)	75	23.6 (18.7–29.2)	
Партнерський статус							

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	231	156	67.0 (59.9–73.4)	75	33.0 (26.6–40.1)	0.0065
живе з партнером	262	201	78.7 (73.1–83.4)	61	21.3 (16.6–26.9)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	188	149	80.8 (74.3–86.0)	39	19.2 (14.0–25.7)	0.0443
неповний робочий день або тимчасово	174	118	68.9 (61.1–75.7)	56	31.1 (24.3–38.9)	
безробітний	63	41	63.3 (48.5–76.0)	22	36.7 (24.0–51.5)	
інвалідність	17	13	83.2 (56.8–94.9)	4	16.8 (5.1–43.2)	
інші	50	35	71.5 (56.2–83.1)	15	28.5 (16.9–43.8)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	32	23	73.7 (53.6–87.2)	9	26.3 (12.8–46.4)	0.0008
3-10 тис	145	92	63.6 (54.4–71.8)	53	36.4 (28.2–45.6)	
10-20 тис	160	124	79.9 (72.8–85.5)	36	20.1 (14.5–27.2)	
≥20 тис	74	65	88.4 (78.5–94.1)	9	11.6 (5.9–21.5)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	431	315	74.1 (69.4–78.3)	116	25.9 (21.7–30.6)	0.2764
так	62	42	67.0 (53.2–78.4)	20	33.0 (21.6–46.8)	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	410	295	72.5 (67.6–77.0)	115	27.5 (23.0–32.4)	0.4604
так	82	61	76.7 (65.8–84.9)	21	23.3 (15.1–34.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	456	328	72.9 (68.2–77.1)	128	27.1 (22.9–31.8)	0.5511
так	33	26	77.9 (59.1–89.5)	7	22.1 (10.5–40.9)	
Результат тесту на ВІЛ						

	N	Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
		ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	82	69	87.5 (78.7–93.0)	13	12.5 (7.0–21.3)	0.0011
негативний	411	288	70.3 (65.3–74.9)	123	29.7 (25.1–34.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	261	190	73.9 (67.6–79.3)	71	26.1 (20.7–32.4)	
стимулятори	192	140	74.1 (66.9–80.2)	52	25.9 (19.8–33.1)	
опі+стимул	40	27	64.7 (47.2–79.0)	13	35.3 (21.0–52.8)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	282	205	73.5 (67.6–78.8)	77	26.5 (21.2–32.4)	0.6047
стимулятори	209	150	72.4 (65.3–78.5)	59	27.6 (21.5–34.7)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу депресії PHQ-9									
		N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	500	120	24.7 (20.6–29.4)	141	29.9 (25.5–34.7)	107	20.8 (17.1–25.1)	132	24.6 (20.8–28.8)	1.0000
Стать											
	чоловік	302	76	25.2 (20.2–31.0)	79	28.7 (23.1–35.0)	67	20.9 (16.4–26.3)	80	25.2 (20.3–30.8)	0.9384
	жінка	198	44	24.1 (17.6–32.1)	62	31.6 (24.7–39.5)	40	20.6 (14.7–28.0)	52	23.7 (18.0–30.5)	
Вікова категорія 4											
	<25	23	5	27.4 (11.2–53.0)	3	12.3 (3.6–34.8)	9	34.4 (17.5–56.6)	6	25.8 (10.9–49.6)	0.2336
	25-34	143	42	32.0 (23.7–41.7)	40	27.7 (20.5–36.3)	25	17.3 (11.6–25.0)	36	22.9 (16.6–30.8)	
	35-44	246	57	23.2 (17.7–29.9)	74	32.0 (25.6–39.2)	49	19.1 (14.1–25.5)	66	25.6 (20.2–31.9)	
	45+	88	16	16.9 (10.0–26.9)	24	32.0 (21.2–45.1)	24	27.1 (17.7–39.2)	24	24.0 (15.9–34.7)	

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	23	5	26.2 (10.6–51.6)	4	17.6 (5.9–42.0)	6	24.6 (10.4–47.9)	8	31.7 (15.1–54.7)	0.4440
3-5	65	21	37.0 (24.3–51.8)	14	19.1 (11.2–30.9)	16	23.3 (13.9–36.3)	14	20.6 (11.7–33.6)	
6-10	102	26	25.6 (17.6–35.7)	29	29.1 (20.6–39.5)	21	21.4 (14.0–31.2)	26	23.9 (16.5–33.3)	
≥11	306	68	22.3 (17.3–28.2)	91	32.6 (26.6–39.1)	64	20.1 (15.4–25.8)	83	25.1 (20.2–30.6)	
Партнерський статус										
живе сам	234	52	22.9 (17.3–29.6)	61	26.3 (20.4–33.2)	45	18.3 (13.3–24.7)	76	32.6 (26.3–39.4)	0.0083
живе з партнером	266	68	26.4 (20.7–33.0)	80	33.0 (26.7–39.9)	62	22.9 (17.8–29.0)	56	17.8 (13.6–22.9)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	192	44	22.9 (16.8–30.3)	58	30.8 (23.9–38.6)	44	23.1 (17.0–30.6)	46	23.3 (17.5–30.2)	0.4886
неповний робочий день або тимчасово	175	40	25.2 (18.5–33.2)	44	27.2 (20.1–35.5)	44	22.5 (16.8–29.4)	47	25.2 (19.0–32.6)	
безробітний	64	17	25.7 (15.1–40.3)	17	27.1 (16.7–40.9)	10	19.9 (9.7–36.5)	20	27.2 (17.1–40.4)	
інвалідність	17	3	13.5 (3.6–39.4)	8	61.6 (32.7–84.1)	1	6.0 (0.7–37.1)	5	18.9 (6.4–44.3)	
інші	51	16	33.3 (19.7–50.4)	14	28.6 (16.7–44.4)	8	14.2 (6.7–27.8)	13	23.9 (13.4–39.0)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	32	6	15.5 (6.5–32.8)	9	38.7 (19.3–62.5)	5	13.2 (5.0–30.5)	12	32.6 (17.3–52.8)	0.0227
3-10 тис	147	34	23.1 (16.2–31.7)	51	34.7 (26.6–43.8)	28	19.2 (12.9–27.6)	34	23.0 (16.4–31.1)	
10-20 тис	162	26	17.7 (11.5–26.3)	49	32.8 (25.1–41.5)	42	24.0 (17.7–31.6)	45	25.5 (19.1–33.2)	
≥20 тис	74	31	42.5 (30.6–55.3)	13	19.4 (10.2–33.8)	9	10.5 (5.3–19.7)	21	27.6 (17.8–40.0)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	437	106	25.0 (20.6–30.0)	117	28.9 (24.2–34.1)	95	21.3 (17.2–26.0)	119	24.8 (20.8–29.3)	0.6111

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	63	14	22.9 (13.5–36.1)	24	37.5 (25.7–51.1)	12	16.9 (9.5–28.3)	13	22.7 (13.0–36.6)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	120	24.7 (20.6–29.4)	141	29.9 (25.5–34.7)	107	20.8 (17.1–25.1)	132	24.6 (20.8–28.8)	1.0000
Стать										
чоловік	302	76	25.2 (20.2–31.0)	79	28.7 (23.1–35.0)	67	20.9 (16.4–26.3)	80	25.2 (20.3–30.8)	0.9384
жінка	198	44	24.1 (17.6–32.1)	62	31.6 (24.7–39.5)	40	20.6 (14.7–28.0)	52	23.7 (18.0–30.5)	
Вікова категорія 4										
<25	23	5	27.4 (11.2–53.0)	3	12.3 (3.6–34.8)	9	34.4 (17.5–56.6)	6	25.8 (10.9–49.6)	0.2336
25-34	143	42	32.0 (23.7–41.7)	40	27.7 (20.5–36.3)	25	17.3 (11.6–25.0)	36	22.9 (16.6–30.8)	
35-44	246	57	23.2 (17.7–29.9)	74	32.0 (25.6–39.2)	49	19.1 (14.1–25.5)	66	25.6 (20.2–31.9)	
45+	88	16	16.9 (10.0–26.9)	24	32.0 (21.2–45.1)	24	27.1 (17.7–39.2)	24	24.0 (15.9–34.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	23	5	26.2 (10.6–51.6)	4	17.6 (5.9–42.0)	6	24.6 (10.4–47.9)	8	31.7 (15.1–54.7)	0.4440
3-5	65	21	37.0 (24.3–51.8)	14	19.1 (11.2–30.9)	16	23.3 (13.9–36.3)	14	20.6 (11.7–33.6)	
6-10	102	26	25.6 (17.6–35.7)	29	29.1 (20.6–39.5)	21	21.4 (14.0–31.2)	26	23.9 (16.5–33.3)	
≥11	306	68	22.3 (17.3–28.2)	91	32.6 (26.6–39.1)	64	20.1 (15.4–25.8)	83	25.1 (20.2–30.6)	
Партнерський статус										
живе сам	234	52	22.9 (17.3–29.6)	61	26.3 (20.4–33.2)	45	18.3 (13.3–24.7)	76	32.6 (26.3–39.4)	0.0083

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе з партнером	266	68	26.4 (20.7–33.0)	80	33.0 (26.7–39.9)	62	22.9 (17.8–29.0)	56	17.8 (13.6–22.9)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	192	44	22.9 (16.8–30.3)	58	30.8 (23.9–38.6)	44	23.1 (17.0–30.6)	46	23.3 (17.5–30.2)	0.4886
неповний робочий день або тимчасово	175	40	25.2 (18.5–33.2)	44	27.2 (20.1–35.5)	44	22.5 (16.8–29.4)	47	25.2 (19.0–32.6)	
безробітний	64	17	25.7 (15.1–40.3)	17	27.1 (16.7–40.9)	10	19.9 (9.7–36.5)	20	27.2 (17.1–40.4)	
інвалідність	17	3	13.5 (3.6–39.4)	8	61.6 (32.7–84.1)	1	6.0 (0.7–37.1)	5	18.9 (6.4–44.3)	
інші	51	16	33.3 (19.7–50.4)	14	28.6 (16.7–44.4)	8	14.2 (6.7–27.8)	13	23.9 (13.4–39.0)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	32	6	15.5 (6.5–32.8)	9	38.7 (19.3–62.5)	5	13.2 (5.0–30.5)	12	32.6 (17.3–52.8)	0.0227
3-10 тис	147	34	23.1 (16.2–31.7)	51	34.7 (26.6–43.8)	28	19.2 (12.9–27.6)	34	23.0 (16.4–31.1)	
10-20 тис	162	26	17.7 (11.5–26.3)	49	32.8 (25.1–41.5)	42	24.0 (17.7–31.6)	45	25.5 (19.1–33.2)	
≥20 тис	74	31	42.5 (30.6–55.3)	13	19.4 (10.2–33.8)	9	10.5 (5.3–19.7)	21	27.6 (17.8–40.0)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	437	106	25.0 (20.6–30.0)	117	28.9 (24.2–34.1)	95	21.3 (17.2–26.0)	119	24.8 (20.8–29.3)	0.6111
так	63	14	22.9 (13.5–36.1)	24	37.5 (25.7–51.1)	12	16.9 (9.5–28.3)	13	22.7 (13.0–36.6)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	183	37.8 (33.1–42.8)	152	30.8 (26.4–35.6)	121	23.4 (19.6–27.8)	44	8.0 (5.9–10.7)	1.0000

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Стать										
чоловік	302	105	35.8 (29.9–42.0)	92	31.1 (25.5–37.3)	79	25.5 (20.5–31.2)	26	7.7 (5.2–11.3)	0.6242
жінка	198	78	40.7 (33.1–48.8)	60	30.4 (23.5–38.4)	42	20.5 (15.0–27.5)	18	8.4 (5.2–13.3)	
Вікова категорія 4										
<25	23	8	38.5 (19.4–62.0)	9	38.1 (19.6–60.9)	5	19.7 (7.8–41.6)	1	3.7 (0.5–24.3)	0.6563
25-34	143	58	43.4 (34.5–52.8)	43	28.7 (21.4–37.3)	28	18.3 (12.7–25.7)	14	9.6 (5.6–16.1)	
35-44	246	92	36.5 (30.0–43.5)	71	31.3 (24.8–38.6)	60	24.1 (18.6–30.6)	23	8.2 (5.3–12.3)	
45+	88	25	32.5 (22.0–45.2)	29	30.7 (20.9–42.7)	28	30.6 (20.7–42.7)	6	6.1 (2.7–13.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	23	9	41.4 (21.6–64.5)	7	29.3 (13.4–52.6)	4	14.1 (4.9–34.2)	3	15.2 (4.5–40.6)	0.7630
3-5	65	19	34.6 (22.1–49.6)	25	35.7 (24.0–49.3)	18	26.5 (16.5–39.7)	3	3.2 (1.0–9.9)	
6-10	102	42	41.7 (32.0–52.2)	28	27.3 (19.1–37.4)	24	23.2 (15.7–33.0)	8	7.7 (3.8–15.1)	
≥11	306	112	36.9 (30.9–43.4)	91	31.2 (25.4–37.7)	73	23.4 (18.4–29.2)	30	8.5 (5.9–12.2)	
Партнерський статус										
живе сам	234	77	32.5 (26.2–39.6)	68	28.9 (22.8–36.0)	64	28.8 (22.6–35.9)	25	9.8 (6.5–14.3)	0.0299
живе з партнером	266	106	42.3 (35.7–49.2)	84	32.4 (26.3–39.2)	57	18.9 (14.5–24.1)	19	6.5 (4.0–10.2)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	192	64	34.8 (27.6–42.7)	66	32.7 (25.9–40.4)	46	23.9 (17.8–31.4)	16	8.6 (5.2–13.8)	0.7806
неповний робочий день або тимчасово	175	61	36.1 (28.6–44.3)	51	30.0 (22.7–38.3)	51	27.7 (21.3–35.2)	12	6.2 (3.4–11.1)	

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	64	26	40.7 (27.7–55.2)	17	27.9 (16.8–42.6)	13	22.3 (12.2–37.0)	8	9.1 (4.3–18.1)	
інвалідність	17	7	44.3 (17.6–74.8)	4	30.8 (8.8–67.3)	3	13.2 (3.4–39.5)	3	11.7 (3.1–35.6)	
інші	51	25	48.5 (33.3–64.1)	14	31.5 (18.8–47.8)	7	11.0 (4.7–23.6)	5	9.0 (3.6–20.8)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	32	8	28.2 (12.3–52.3)	14	44.5 (25.1–65.7)	5	16.3 (6.2–36.5)	5	11.0 (4.2–25.7)	0.5295
3-10 тис	147	60	40.4 (31.9–49.5)	41	28.1 (20.6–37.0)	33	23.4 (16.5–32.1)	13	8.1 (4.7–13.8)	
10-20 тис	162	46	31.0 (23.3–39.9)	52	33.2 (25.6–41.8)	51	27.9 (21.3–35.7)	13	7.9 (4.4–13.6)	
≥20 тис	74	33	44.6 (32.5–57.4)	20	27.2 (16.8–41.0)	17	22.9 (14.0–35.1)	4	5.3 (1.9–13.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	437	166	39.3 (34.2–44.7)	125	29.2 (24.5–34.3)	107	23.4 (19.3–28.1)	39	8.1 (5.9–11.1)	0.1264
так	63	17	26.0 (16.1–39.1)	27	43.4 (30.8–56.9)	14	23.6 (14.0–37.2)	5	6.9 (2.7–16.4)	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

	Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	416	151	37.8 (32.6–43.3)	121	29.4 (24.6–34.7)	103	23.7 (19.6–28.5)	41	9.0 (6.6–12.3)	0.2682
так	83	32	38.2 (27.4–50.3)	30	36.8 (25.9–49.3)	18	22.1 (13.2–34.5)	3	2.9 (0.9–8.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	461	164	37.3 (32.4–42.5)	142	31.6 (26.9–36.6)	112	22.8 (18.9–27.1)	43	8.4 (6.2–11.3)	0.1582
так	35	19	53.3 (35.5–70.3)	9	22.7 (11.5–39.9)	7	24.0 (11.1–44.2)	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	85	31	41.4 (29.5–54.4)	28	28.6 (19.0–40.6)	20	23.3 (14.3–35.5)	6	6.8 (3.0–14.8)	0.9019
негативний	415	152	37.0 (32.0–42.4)	124	31.3 (26.4–36.6)	101	23.5 (19.3–28.2)	38	8.2 (5.9–11.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	267	95	38.6 (32.2–45.4)	88	31.1 (25.2–37.7)	68	25.2 (19.9–31.4)	16	5.1 (3.1–8.3)	
стимулятори	193	72	36.5 (29.1–44.7)	53	31.1 (23.9–39.3)	47	22.6 (16.7–29.7)	21	9.8 (6.3–15.0)	
опі+стимул	40	16	39.3 (24.5–56.5)	11	26.5 (14.3–43.8)	6	14.6 (6.4–29.9)	7	19.6 (9.0–37.5)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	288	104	39.2 (33.0–45.7)	93	29.9 (24.4–36.0)	71	24.6 (19.5–30.5)	20	6.4 (4.0–9.9)	0.5141
стимулятори	210	78	36.3 (29.2–44.1)	58	31.0 (24.1–38.8)	50	22.4 (16.7–29.2)	24	10.3 (6.8–15.3)	
інші	2	1	24.8 (0.0–100.0)	1	75.2 (0.0–100.0)	0	0.0	0	0.0	

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	31	5.4	(3.8–7.8)
збут наркотиків	26	3.9	(2.6–5.8)
зберігання наркотиків	47	8.4	(6.3–11.3)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	23	4.6	(2.8–7.3)
збут наркотиків	16	2.8	(1.7–4.8)
зберігання наркотиків	46	8.5	(6.3–11.4)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	259	49.9	(45.0–54.8)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	63	11.4	(8.8–14.6)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	8	12.0	(5.7–23.3)
6м-2р	15	27.0	(16.6–40.8)
2-4р	20	29.5	(19.3–42.3)
4 роки +	20	31.5	(20.6–44.8)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	2	2.6	(0.6–10.2)
1-3р	7	11.6	(5.4–23.4)
3-5р	18	28.8	(18.4–42.0)
5-10р	16	25.7	(15.6–39.3)
10 років +	19	31.2	(20.4–44.5)

	n	%	ДІ
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	40	62.9	(49.4–74.7)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	245	51.0	(46.1–56.0)
так, за останні 6м	101	19.3	(15.8–23.3)
так, але 6+ місяців тому	154	29.7	(25.5–34.3)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	175	38.2	(33.3–43.3)
так, за останні 6м	136	26.3	(22.3–30.7)
так, але 6+ місяців тому	189	35.5	(31.1–40.2)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	273	54.9	(50.0–59.8)
так, за останні 6м	112	22.9	(19.0–27.3)
так, але 6+ місяців тому	115	22.2	(18.4–26.5)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	337	68.2	(63.5–72.6)
так	163	31.8	(27.4–36.5)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	253	53.0	(48.0–57.9)
так	233	47.0	(42.1–52.0)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
ні	138	58.1	(50.8–65.1)
так	94	41.9	(34.9–49.2)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців			
ні	350	71.5	(66.8–75.8)

		n	%	ДІ
	так	142	28.5	(24.2–33.2)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

		Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	500	163	31.8 (27.4–36.5)	1.0000	232	94	41.9 (34.9–49.2)	1.0000
Стать									
	чоловік	302	102	34.0 (28.4–40.2)	0.2498	147	57	38.7 (30.7–47.4)	0.3095
	жінка	198	61	28.6 (22.2–36.0)		85	37	46.4 (34.5–58.8)	
Вікова категорія 4									
	<25	23	17	74.9 (51.2–89.5)	0.0002	8	4	39.4 (12.7–74.5)	0.9838
	25-34	143	44	30.8 (23.2–39.6)		61	25	40.4 (28.1–54.0)	
	35-44	246	78	30.8 (24.7–37.8)		118	48	43.2 (33.3–53.7)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
45+	88	24	24.4 (16.1–35.1)		45	17	40.8 (25.5–58.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	23	12	53.8 (31.8–74.5)	0.0648	10	7	64.9 (29.3–89.2)	0.5100
3-5	65	21	30.4 (19.8–43.7)		23	10	36.2 (18.7–58.4)	
6-10	102	35	36.2 (26.9–46.8)		47	19	41.1 (27.1–56.7)	
≥11	306	92	28.3 (23.0–34.3)		152	58	41.3 (32.5–50.6)	
Партнерський статус								
живе сам	234	85	35.8 (29.3–42.9)	0.1017	102	45	48.3 (37.7–59.2)	0.1152
живе з партнером	266	78	28.3 (22.7–34.6)		130	49	36.8 (28.1–46.5)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	192	69	36.6 (29.3–44.5)	0.3517	88	31	37.1 (26.4–49.1)	0.0976
неповний робочий день або тимчасово	175	56	30.6 (23.8–38.3)		78	35	48.4 (36.1–60.8)	
безробітний	64	20	32.7 (20.7–47.5)		25	7	22.2 (9.5–43.6)	
інвалідність	17	6	25.8 (9.4–53.7)		10	4	40.0 (14.1–72.9)	
інші	51	12	20.4 (11.1–34.6)		31	17	55.3 (35.9–73.2)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	32	8	23.1 (10.6–43.1)	0.3428	18	8	44.5 (22.9–68.4)	0.6867
3-10 тис	147	52	36.2 (28.0–45.3)		69	29	45.0 (32.3–58.3)	
10-20 тис	162	54	32.9 (25.4–41.4)		77	30	38.6 (27.8–50.6)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
≥20 тис	74	20	25.2 (16.2–37.0)		37	17	51.3 (32.9–69.3)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	437	151	33.6 (28.8–38.7)	0.0136	185	73	40.0 (32.2–48.3)	0.2334
так	63	12	17.8 (10.1–29.6)		47	21	50.4 (35.3–65.4)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	416	138	32.8 (28.0–38.1)	0.3050	181	76	42.2 (34.5–50.4)	0.8771
так	83	25	26.8 (18.0–37.9)		51	18	40.8 (25.9–57.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	461	148	31.4 (26.9–36.2)	0.2384	212	86	41.2 (34.1–48.8)	0.6023
так	35	14	41.7 (25.4–60.1)		18	6	34.4 (15.1–60.8)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	85	28	28.5 (19.4–39.9)	0.5093	36	10	34.3 (17.3–56.7)	0.4278
негативний	415	135	32.5 (27.7–37.7)		196	84	43.5 (36.0–51.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	267	92	33.6 (27.6–40.1)		127	43	35.4 (26.4–45.6)	
стимулятори	193	61	31.1 (24.2–38.8)		85	45	53.2 (41.5–64.5)	
опі+стимул	40	10	22.1 (11.6–38.0)		20	6	34.1 (15.3–59.9)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	288	98	33.3 (27.6–39.6)	0.4948	134	44	34.8 (26.0–44.7)	0.0391
стимулятори	210	65	30.4 (23.9–37.8)		97	50	52.3 (41.4–63.0)	
інші	2	0	0.0		1	0	0.0	

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	34	7.0	(4.9–9.9)
так, з інших причин	56	11.3	(8.5–15.0)
ні	400	81.7	(77.5–85.2)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	10	20.1	(10.8–34.2)
інша країна	4	14.9	(5.8–33.4)
інша область	6	17.0	(7.6–33.7)
інше місто	13	29.8	(17.5–45.9)
інший район	8	12.9	(6.3–24.5)
інший будинок	3	5.3	(1.7–15.6)
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			
та сама область	83	92.1	(83.6–96.4)
інша область	7	7.9	(3.6–16.4)
інша країна	0	0.0	



Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)



Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)

Результати для міста: Запоріжжя




Рис. А. Мережа рекрутингу RDS у місті Запоріжжя

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	500	41.1	(40.5–41.7)	40	(37–45)
Вік першого неін'єкційного вживання наркотиків	354	17.2	(16.8–17.6)	17	(15–18)
Років з початку неін'єкційного вживання наркотиків	354	23.7	(22.9–24.5)	23	(19–28)
Вік першого ін'єкційного вживання наркотиків	483	19.2	(18.8–19.5)	18	(17–20)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків	483	22.0	(21.4–22.7)	22	(18–26)
Особистий місячний дохід, грн	472	6,977.6	(6604.8–7350.3)	6,000	(5000–9000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

	Сайт	n	%	ДІ
Стать				
чоловік	Запоріжжя	415	83.2	(79.4–86.5)
жінка	Запоріжжя	85	16.8	(13.5–20.6)
Вікова категорія 4				
<25	Запоріжжя	4	0.8	(0.3–2.1)
25-34	Запоріжжя	60	12.2	(9.3–15.9)
35-44	Запоріжжя	287	57.3	(52.5–61.9)
45+	Запоріжжя	149	29.7	(25.5–34.3)
Сімейний стан				
одружений або проживають разом	Запоріжжя	83	16.3	(13.0–20.1)
одружений, але має іншого партнера	Запоріжжя	45	9.7	(7.0–13.1)
не одружений, але є партнер	Запоріжжя	144	28.4	(24.3–32.8)
одружений, але не живуть разом	Запоріжжя	31	6.1	(4.2–8.7)
не одружений та не мають партнера	Запоріжжя	197	39.6	(35.1–44.3)
Партнерський статус				
живе сам	Запоріжжя	228	45.7	(41.0–50.4)
живе з партнером	Запоріжжя	272	54.3	(49.6–59.0)
Освіта 3 категорії				
незак. середня школа	Запоріжжя	258	53.2	(48.4–57.9)
середня школа	Запоріжжя	137	27.2	(23.2–31.6)
> середня школа	Запоріжжя	105	19.6	(16.3–23.5)
Поточна професія				
учень школи	Запоріжжя	0	0.0	
студент коледжу/університету	Запоріжжя	0	0.0	
постійна робота	Запоріжжя	61	11.0	(8.5–14.0)
непостійна робота	Запоріжжя	297	61.3	(56.6–65.8)
безробітний	Запоріжжя	113	23.0	(19.2–27.3)
домогосподарка	Запоріжжя	2	0.4	(0.1–1.5)
інвалідність	Запоріжжя	22	3.8	(2.5–5.8)
військовий	Запоріжжя	3	0.4	(0.1–1.4)
інші	Запоріжжя	1	0.1	(0.0–0.8)
Безхатченко				
ніколи	Запоріжжя	400	83.5	(79.8–86.6)
так, 12м+ тому	Запоріжжя	84	15.8	(12.7–19.3)
так, за останні 12м	Запоріжжя	3	0.8	(0.3–2.5)

	Сайт	n	%	ДІ
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Запоріжжя	84	95.2	(86.1–98.5)
так	Запоріжжя	3	4.8	(1.5–13.9)
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Запоріжжя	33	6.1	(4.3–8.6)
3-10 тис	Запоріжжя	347	75.3	(71.0–79.1)
10-20 тис	Запоріжжя	84	17.2	(13.9–21.0)
≥20 тис	Запоріжжя	8	1.4	(0.7–3.0)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Запоріжжя	31	5.7	(4.0–8.2)
≥2684	Запоріжжя	441	94.3	(91.8–96.0)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Запоріжжя	2	0.4	(0.1–1.7)
3-5	Запоріжжя	7	1.6	(0.7–3.3)
6-10	Запоріжжя	18	3.4	(2.1–5.4)
≥11	Запоріжжя	456	94.7	(92.2–96.4)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Сайт	n	%	ДІ
власне житло	Запоріжжя	146	28.0	(24.0–32.4)
у друзів або родичів	Запоріжжя	183	37.0	(32.5–41.7)
оренда	Запоріжжя	99	20.3	(16.7–24.5)
різне	Запоріжжя	96	19.4	(15.9–23.5)
на вулиці (безхатько)	Запоріжжя	3	0.8	(0.2–2.4)
у притулку для біженців	Запоріжжя	0	0.0	




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)



Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії									
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	500	330	66.2 (61.4–70.6)	20	3.9 (2.4–6.2)	146	28.5 (24.4–33.0)	4	1.4 (0.4–4.8)	1.0000
Стать											
	чоловік	415	274	66.9 (61.7–71.6)	17	4.1 (2.4–6.8)	120	27.4 (23.0–32.2)	4	1.7 (0.5–5.7)	0.5900

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії									
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
жінка	85	56	62.6 (50.1–73.7)	3	3.1 (1.0–9.6)	26	34.3 (23.4–47.0)	0	0.0	
Вікова категорія 4										
<25	4	3	63.4 (4.2–98.6)	1	36.6 (1.4–95.8)	0	0.0	0	0.0	0.0462
25-34	60	38	66.1 (52.1–77.8)	6	7.9 (3.4–17.4)	16	26.0 (15.7–39.7)	0	0.0	
35-44	287	200	70.8 (64.8–76.2)	8	2.7 (1.2–5.6)	77	24.7 (19.9–30.1)	2	1.8 (0.4–8.7)	
45+	149	89	57.3 (48.0–66.0)	5	3.9 (1.5–9.7)	53	37.7 (29.2–47.1)	2	1.1 (0.3–4.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	2	1	50.0 (0.0–100.0)	1	50.0 (0.0–100.0)	0	0.0	0	0.0	
3-5	7	6	81.3 (23.4–98.4)	1	18.7 (1.6–76.6)	0	0.0	0	0.0	
6-10	18	14	79.1 (52.3–92.9)	0	0.0	4	20.9 (7.1–47.7)	0	0.0	
≥11	456	297	65.3 (60.3–70.0)	16	3.4 (2.0–5.8)	139	29.8 (25.4–34.6)	4	1.5 (0.4–5.3)	
Партнерський статус										
живе сам	228	175	78.3 (72.2–83.3)	3	1.0 (0.3–3.1)	48	19.9 (15.1–25.8)	2	0.8 (0.2–3.3)	0.0000
живе з партнером	272	155	56.0 (49.3–62.4)	17	6.4 (3.8–10.5)	98	35.8 (29.7–42.3)	2	1.9 (0.4–9.2)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	61	44	71.7 (58.4–82.0)	3	6.0 (1.9–17.8)	14	22.3 (13.4–34.8)	0	0.0	0.7072
неповний робочий день або тимчасово	297	196	67.2 (61.0–72.8)	8	2.5 (1.2–5.4)	90	28.3 (23.2–34.2)	3	1.9 (0.5–7.8)	
безробітний	113	73	62.0 (51.4–71.5)	6	5.7 (2.4–12.9)	33	31.5 (22.4–42.1)	1	0.9 (0.1–6.4)	

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
інвалідність	22	13	61.8 (39.1–80.3)	3	10.8 (3.1–31.2)	6	27.5 (12.1–51.1)	0	0.0	
інші	6	3	49.9 (10.4–89.6)	0	0.0	3	50.1 (10.4–89.6)	0	0.0	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	33	26	78.4 (60.1–89.7)	0	0.0	6	17.9 (7.9–35.7)	1	3.7 (0.5–23.2)	0.4233
3-10 тис	347	225	65.1 (59.2–70.5)	12	3.5 (1.9–6.5)	107	29.8 (24.7–35.4)	3	1.7 (0.4–6.8)	
10-20 тис	84	57	68.5 (57.4–77.8)	4	4.7 (1.7–12.1)	23	26.8 (18.2–37.7)	0	0.0	
≥20 тис	8	5	59.8 (19.0–90.4)	1	20.6 (2.0–76.9)	2	19.6 (3.3–63.6)	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	362	259	72.0 (66.6–76.9)	15	4.1 (2.4–6.9)	87	23.7 (19.1–29.0)	1	0.2 (0.0–1.7)	0.8069
так	45	33	73.0 (57.1–84.6)	4	6.7 (2.4–17.3)	8	20.3 (10.2–36.4)	0	0.0	

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	385	262	69.3 (64.1–74.0)	12	2.8 (1.5–5.2)	110	27.7 (23.1–32.7)	1	0.2 (0.0–1.6)	0.0000
так	96	59	58.9 (47.4–69.5)	7	8.3 (3.8–17.4)	27	26.4 (18.2–36.7)	3	6.4 (1.6–22.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	407	277	68.9 (63.9–73.5)	17	4.2 (2.5–6.9)	112	26.7 (22.4–31.6)	1	0.2 (0.0–1.5)	0.0000
так	56	37	61.0 (44.9–75.0)	3	4.8 (1.5–14.6)	13	22.9 (13.2–36.8)	3	11.2 (2.8–35.7)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	21	17	78.5 (50.2–93.0)	2	13.8 (2.8–47.0)	2	7.7 (1.7–28.6)	0	0.0	0.1294

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
негативний	479	313	65.6 (60.8–70.2)	18	3.5 (2.1–5.7)	144	29.4 (25.1–34.1)	4	1.5 (0.4–5.0)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	458	321	70.7 (65.9–75.0)	2	0.7 (0.2–2.9)	134	28.4 (24.1–33.1)	1	0.2 (0.0–1.3)	0.0000
стимулятори	34	6	15.3 (6.5–31.8)	17	49.8 (32.0–67.6)	11	34.9 (19.4–54.3)	0	0.0	
інші	3	1	31.6 (0.2–99.0)	1	21.6 (0.1–98.2)	0	0.0	1	46.8 (0.4–99.4)	

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
	n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
Частота ін'єкцій: останні 24 години									
0 разів	11	3.1	2	10.8	3	2.2	0	0.0	0.1621
1 раз	255	80.0	13	67.9	130	90.5	4	100.0	
2-3 рази	58	15.2	4	17.7	12	6.8	0	0.0	
4+ рази	6	1.6	1	3.6	1	0.4	0	0.0	
N	330		20		146		4		
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)									
1 раз	255	82.6	13	76.1	130	92.6	4	100.0	0.1706
2-3 рази	58	15.7	4	19.9	12	7.0	0	0.0	
4+ рази	6	1.7	1	4.1	1	0.4	0	0.0	
N	319		18		143		4		
Частота ін'єкцій: останній тиждень									
0 разів	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0000
1-6 разів	51	15.2	14	75.1	38	23.8	3	87.8	
кожен день	277	84.3	6	24.9	108	76.2	1	12.2	
N	330		20		146		4		
Частота ін'єкцій: останні 30 днів									
1-9 разів	5	1.2	1	4.3	1	0.7	0	0.0	0.0000
10-19 разів	12	3.6	3	15.1	5	3.0	0	0.0	
20-29 разів	48	14.4	12	65.4	39	24.8	3	87.8	
кожен день	265	80.8	4	15.2	101	71.4	1	12.2	
N	330		20		146		4		
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів									
0-9 разів	6	1.5	1	5.4	1	0.5	0	0.0	0.0000
10-19 разів	9	2.6	3	18.8	4	2.6	0	0.0	
20-29 разів	55	16.7	9	56.9	38	24.6	2	86.0	
кожен день	257	79.2	4	18.9	101	72.3	1	14.0	
N	327		17		144		3		

Таблиця 2.4. Ін'єкційний вид наркотику на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	31	6.2	0	0.0	1	100.0
3-10 тис	325	76.2	19	62.1	0	0.0
10-20 тис	73	16.5	11	31.4	0	0.0
≥20 тис	6	1.1	2	6.6	0	0.0
N	435		32		1	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
Разом		опіоїди		стимулятори		інші		
n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
готую сам								
106	17.9	97	17.8	8	21.5	1	21.6	0.8148
приготовлене друзями								
50	10.2	50	11.0	0	0.0	0	0.0	0.1145
від дилера								
296	63.3	269	62.6	24	73.0	1	31.6	0.2886
куплене в Інтернеті								
181	40.0	174	41.2	6	24.1	1	46.8	0.1998
з аптеки								
4	0.7	3	0.6	1	2.3	0	0.0	0.4534
N								
637		593		39		3		
з програми ЗПТ								
		0	0.0	0	0.0	0	0.0	
інше								
		0	0.0	0	0.0	0	0.0	




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін’єкції використовував чистий шприц			
так	381	78.6	(74.6–82.1)
Джерело шприца для останньої ін’єкції			
купив в аптеці	201	38.9	(34.4–43.6)
отримав в аптеці	64	13.2	(10.3–16.7)
отримав від НУО	196	41.4	(36.8–46.2)
отримав від друга	24	4.6	(3.0–6.9)
отримав вживаний від друга	4	0.7	(0.3–1.9)
використовував вживаний свій	7	1.2	(0.6–2.6)
отримав заповнений	0	0.0	
інші	0	0.0	
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	88	17.4	(14.2–21.2)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	33	6.3	(4.4–9.0)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	39	7.9	(5.7–10.8)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	43	8.5	(6.3–11.4)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	43	9.5	(7.0–12.7)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	87	17.4	(14.0–21.3)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	140	32.4	(27.8–37.4)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	1	1.7	(0.2–11.1)
часто	24	27.3	(18.8–37.8)
половина	6	6.6	(2.9–14.1)
іноді	10	12.4	(6.7–21.8)
рідко	40	45.3	(34.9–56.1)
ніколи	6	6.7	(2.9–14.7)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	9	1.6	(0.8–3.2)
часто	207	46.3	(41.4–51.3)
половина	49	9.0	(6.8–11.9)
іноді	29	6.0	(4.0–8.8)
рідко	80	16.0	(12.9–19.7)
ніколи	96	21.0	(17.3–25.4)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			
1-9	23	56.5	(40.2–71.6)
10-29	9	26.2	(14.1–43.4)

	n	%	ДІ
30+	7	17.3	(8.3–32.5)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	1	3.4	(0.5–20.7)
2-3	23	68.1	(50.2–81.8)
4-9	5	13.1	(5.3–28.9)
10+	5	15.4	(6.4–32.9)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	6	22.1	(9.5–43.3)
від друзів	23	70.9	(50.9–85.1)
із закладки	3	7.0	(2.2–20.3)
Хтось використав один шприц для ін'єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	406	94.0	(91.5–95.9)
так	30	6.0	(4.1–8.5)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін'єкцій (%)




Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	481	88	17.4 (14.2–21.2)	1.0000	446	33	6.3 (4.4–9.0)	1.0000
Стать									
	чоловік	399	73	17.3 (13.8–21.4)	0.8520	366	31	7.3 (5.0–10.4)	0.0773
	жінка	82	15	18.2 (11.0–28.6)		80	2	2.1 (0.5–8.7)	
Вікова категорія 4									
	<25	4	0	0.0	0.7230	4	1	36.6 (1.4–95.8)	0.0983
	25-34	58	12	19.4 (10.9–32.2)		55	5	8.4 (3.3–19.9)	
	35-44	280	52	18.2 (14.0–23.3)		261	18	5.9 (3.6–9.5)	
	45+	139	24	15.7 (10.5–22.8)		126	9	5.5 (2.8–10.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків									
	≤2	2	1	50.0 (0.0–100.0)	0.1057	2	0	0.0	0.4687
	3-5	7	0	0.0		7	1	18.7 (1.6–76.6)	
	6-10	17	0	0.0		18	1	3.4 (0.4–23.4)	
	≥11	440	82	17.7 (14.3–21.6)		403	29	6.0 (4.1–8.7)	
Партнерський статус									

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	219	28	11.8 (8.1–16.7)	0.0029	210	10	3.9 (2.1–7.3)	0.0402
живе з партнером	262	60	22.2 (17.4–27.9)		236	23	8.5 (5.5–13.0)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	60	8	14.2 (7.1–26.5)	0.9540	61	7	12.1 (5.6–24.0)	0.3370
неповний робочий день або тимчасово	288	55	17.8 (13.8–22.8)		260	16	5.2 (3.1–8.7)	
безробітний	106	21	18.2 (11.9–26.9)		98	8	6.5 (3.1–13.0)	
інвалідність	21	3	14.5 (4.4–38.9)		20	2	7.0 (1.5–26.7)	
інші	6	1	22.8 (1.7–83.3)		6	0	0.0	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	32	5	18.2 (7.5–38.2)	0.9926	30	1	2.7 (0.4–18.3)	0.0000
3-10 тис	335	60	16.7 (13.0–21.1)		306	20	5.8 (3.6–9.0)	
10-20 тис	82	13	16.8 (9.9–27.3)		77	4	4.7 (1.7–12.3)	
≥20 тис	8	2	19.6 (3.3–63.6)		8	5	59.8 (19.0–90.4)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	349	66	18.0 (14.3–22.6)	0.4654	339	20	4.9 (3.1–7.6)	0.0014
так	45	10	22.7 (12.3–38.0)		42	8	17.3 (8.5–32.1)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	373	59	15.1 (11.8–19.2)	0.0075	350	17	4.0 (2.4–6.5)	0.0003
так	92	26	27.5 (18.9–38.2)		81	13	14.9 (8.3–25.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	397	71	17.1 (13.7–21.3)	0.3096	367	26	6.2 (4.1–9.3)	0.7273
так	52	12	23.2 (13.0–37.9)		52	5	7.4 (3.0–17.3)	
Результат тесту на ВІЛ								

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	21	5	21.6 (8.4–45.2)	0.6043	20	2	7.3 (1.6–27.4)	0.8339
негативний	460	83	17.3 (14.0–21.1)		426	31	6.3 (4.3–9.1)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	321	49	14.9 (11.3–19.3)	0.2608	309	13	4.1 (2.3–7.3)	0.0044
стимулятори	20	6	26.7 (11.2–51.5)		19	5	23.8 (8.9–49.9)	
опі+стимул	137	33	23.0 (16.5–31.2)		114	14	9.4 (5.4–15.7)	
інші	3	0	0.0		4	1	12.2 (0.3–87.7)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	441	78	16.9 (13.6–20.8)	0.1266	406	26	5.6 (3.8–8.4)	0.0268
стимулятори	34	9	26.7 (13.8–45.3)		33	6	15.7 (6.6–33.0)	
інші	2	1	59.4 (0.3–99.8)		3	1	21.6 (0.1–98.2)	

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	432	39	7.9 (5.7–10.8)	1.0000	451	43	8.5 (6.3–11.4)	1.0000
Стать									
	чоловік	352	34	8.5 (6.0–11.8)	0.3123	371	39	9.2 (6.7–12.5)	0.2785
	жінка	80	5	5.3 (2.1–12.6)		80	4	5.2 (1.9–13.8)	
Вікова категорія 4									
	<25	3	0	0.0	0.9503	3	0	0.0	0.0430
	25-34	52	5	9.0 (3.6–21.1)		54	11	18.0 (9.7–30.7)	
	35-44	253	23	7.8 (5.2–11.7)		258	19	6.3 (4.0–9.9)	
	45+	124	11	7.7 (4.2–13.8)		136	13	8.9 (5.1–15.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків									
	≤2	2	0	0.0	0.5433	2	1	50.0 (0.0–100.0)	0.0910

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	7	0	0.0		7	0	0.0	
6-10	17	0	0.0		16	0	0.0	
≥11	393	37	8.2 (5.9–11.2)		414	41	8.8 (6.5–11.9)	
Партнерський статус								
живе сам	194	16	7.0 (4.2–11.3)	0.4949	212	18	7.0 (4.3–11.0)	0.2652
живе з партнером	238	23	8.7 (5.7–13.0)		239	25	9.8 (6.6–14.4)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	58	11	19.4 (10.8–32.4)	0.0009	58	16	27.2 (16.9–40.7)	0.0000
неповний робочий день або тимчасово	253	17	5.7 (3.5–9.1)		267	17	5.5 (3.4–8.7)	
безробітний	95	9	7.8 (3.9–15.0)		98	9	8.3 (4.2–15.7)	
інвалідність	20	0	0.0		22	1	3.7 (0.5–24.7)	
інші	6	2	34.5 (5.0–84.1)		5	0	0.0	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	31	2	5.8 (1.3–22.9)	0.0081	32	1	3.1 (0.4–20.1)	0.0002
3-10 тис	294	23	6.6 (4.4–10.0)		306	21	6.2 (4.0–9.5)	
10-20 тис	75	8	11.5 (5.7–21.6)		80	14	16.2 (9.5–26.1)	
≥20 тис	8	4	39.2 (10.3–78.4)		8	4	39.2 (10.3–78.4)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	330	21	5.8 (3.7–8.9)	0.0000	337	23	6.1 (4.0–9.1)	0.0000
так	40	15	33.5 (20.4–49.8)		43	12	25.0 (14.1–40.2)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	345	23	6.0 (4.0–9.0)	0.0020	357	21	5.1 (3.3–7.8)	0.0000

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
так	73	14	16.7 (9.7–27.3)		81	19	21.9 (13.9–32.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	360	30	7.3 (5.1–10.5)	0.2146	369	31	7.3 (5.1–10.3)	0.0093
так	48	7	12.3 (5.7–24.6)		52	10	18.3 (9.7–32.0)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	21	4	16.4 (5.7–39.1)	0.1261	21	4	15.7 (5.4–38.0)	0.1999
негативний	411	35	7.5 (5.3–10.4)		430	39	8.1 (5.9–11.1)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	295	23	7.1 (4.7–10.6)	0.4493	302	22	6.3 (4.1–9.6)	0.0278
стимулятори	18	4	18.6 (6.3–43.8)		18	6	31.6 (13.4–58.1)	
опі+стимул	115	12	8.9 (5.0–15.5)		127	15	11.0 (6.6–17.9)	
інші	4	0	0.0		4	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	396	31	7.1 (4.9–10.0)	0.0104	411	34	7.5 (5.3–10.5)	0.0049
стимулятори	30	8	21.7 (10.4–40.0)		33	9	23.3 (11.8–41.1)	
інші	3	0	0.0		3	0	0.0	

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	415	91.4	(88.5–93.7)	71	87.8	(77.7–93.7)	344	92.2	(89.1–94.4)	0.2303
N	458			80			378			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	367	89.2	(85.5–92.0)	64	90.9	(81.4–95.8)	303	88.8	(84.6–92.0)	0.6125
N	410			71			339			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	216	50.8	(45.5–56.1)	52	75.3	(62.9–84.6)	164	46.1	(40.4–51.8)	0.0000
N	410			69			341			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	140	86.0	(79.9–90.5)	47	96.5	(86.1–99.2)	93	81.4	(73.3–87.5)	0.0090

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
N	165			49			116			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	41	26.0	(19.5–33.9)	6	13.7	(5.7–29.3)	35	31.9	(23.6–41.5)	0.0349
N	155			48			107			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	1	0.7	(0.1–4.8)	0	0.0		1	1.0	(0.1–7.0)	0.4880
N	160			50			110			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										
так	125	39.0	(33.4–44.9)	41	67.2	(54.0–78.1)	84	32.0	(26.4–38.3)	0.0000
N	320			64			256			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	118	40.0	(34.1–46.1)	41	72.2	(58.8–82.6)	77	31.9	(26.0–38.4)	0.0000
N	296			59			237			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	96	50.5	(42.8–58.1)	36	77.4	(63.4–87.1)	60	41.2	(33.0–50.0)	0.0000
N	193			49			144			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так				0	0.0		0	0.0		
N				49			108			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	47	10.0	(7.5–13.2)	12	15.4	(8.7–25.9)	35	8.9	(6.4–12.3)	0.0931
N	408			71			337			
Надавав секс-послуги за гроші										

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
так	32	7.3	(5.2–10.3)	11	14.2	(7.8–24.4)	21	5.9	(3.8–9.0)	0.0154
N	389			70			319			
Платив за секс коли-небудь										
так	64	14.8	(11.6–18.8)	2	2.8	(0.7–11.0)	62	17.4	(13.6–22.1)	0.0022
N	374			69			305			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	16	24.6	(15.4–36.9)	1	44.7	(4.6–93.1)	15	23.9	(14.7–36.3)	0.5004
N	64			2			62			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	193	48.0	(42.6–53.3)	53	74.7	(61.9–84.3)	140	42.5	(36.8–48.5)	
випадковий	199	50.5	(45.2–55.9)	17	25.3	(15.7–38.1)	182	55.7	(49.7–61.5)	
ком. секс (я заплатив)	8	1.5	(0.7–3.1)	0	0.0		8	1.8	(0.9–3.7)	
ком. секс (мені заплатили)	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	400			70			330			
З ким останнім був секс										
чоловік	71	17.9	(14.1–22.5)	63	89.7	(79.4–95.2)	8	2.8	(1.4–5.6)	
жінка	316	82.1	(77.5–85.9)	7	10.3	(4.8–20.6)	309	97.2	(94.4–98.6)	
men and women	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	387			70			317			
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	386	95.6	(93.2–97.2)	70	98.8	(91.5–99.8)	316	95.0	(92.2–96.8)	0.1319
N	407			71			336			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	11	2.8	(1.5–5.1)	1	0.9	(0.1–6.3)	10	3.1	(1.6–6.0)	0.2006
N	407			71			336			
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	40	8.5	(6.2–11.5)	4	4.6	(1.7–12.0)	36	9.3	(6.7–12.8)	0.1657
N	407			71			336			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	140	86.0	(79.9–90.5)	47	96.5	(86.1–99.2)	93	81.4	(73.3–87.5)	0.0090
N	165			49			116			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	41	26.0	(19.5–33.9)	6	13.7	(5.7–29.3)	35	31.9	(23.6–41.5)	0.0349
N	155			48			107			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	1	0.7	(0.1–4.8)	0	0.0		1	1.0	(0.1–7.0)	0.4880
N	160			50			110			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні										
1	70	97.6	(90.1–99.4)	12	100.0		58	97.1	(88.5–99.3)	
2-4	2	2.4	(0.6–9.9)	0	0.0		2	2.9	(0.7–11.5)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
N	72			12			60			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові										
1	19	67.1	(47.5–82.1)	2	75.7	(21.3–97.3)	17	66.1	(45.2–82.2)	
2-4	9	32.9	(17.9–52.5)	1	24.3	(2.7–78.7)	8	33.9	(17.8–54.8)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	28			3			25			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього										
1	63	78.2	(67.4–86.2)	9	73.8	(42.0–91.6)	54	79.0	(67.2–87.3)	0.8130
2-4	16	20.3	(12.6–30.9)	3	26.2	(8.4–58.0)	13	19.3	(11.4–30.9)	
5+	1	1.5	(0.2–9.9)	0	0.0		1	1.7	(0.2–11.4)	
N	80			12			68			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так				0	0.0		0	0.0		
N				49			108			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	320	195	61.0 (55.1–66.6)	125	39.0 (33.4–44.9)	1.0000
Стать							
	чоловік	256	172	68.0 (61.7–73.6)	84	32.0 (26.4–38.3)	0.0000
	жінка	64	23	32.8 (21.9–46.0)	41	67.2 (54.0–78.1)	
Вікова категорія 4							
	<25	4	2	44.7 (3.0–95.5)	2	55.3 (4.5–97.0)	0.6432
	25-34	39	26	63.8 (46.2–78.4)	13	36.2 (21.6–53.8)	
	35-44	191	118	63.0 (55.6–69.9)	73	37.0 (30.1–44.4)	
	45+	86	49	55.8 (43.9–67.1)	37	44.2 (32.9–56.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	2	2	100.0	0	0.0	0.1333
	3-5	6	2	26.6 (4.1–75.4)	4	73.4 (24.6–95.9)	
	6-10	13	9	73.8 (43.6–91.1)	4	26.2 (8.9–56.4)	
	≥11	287	174	60.5 (54.2–66.4)	113	39.5 (33.6–45.8)	
Партнерський статус							

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	148	105	71.2 (63.0–78.2)	43	28.8 (21.8–37.0)	0.0015
живе з партнером	172	90	52.6 (44.4–60.7)	82	47.4 (39.3–55.6)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	47	25	49.9 (35.2–64.5)	22	50.1 (35.5–64.8)	0.2096
неповний робочий день або тимчасово	192	113	59.9 (52.2–67.2)	79	40.1 (32.8–47.8)	
безробітний	68	46	67.0 (54.2–77.6)	22	33.0 (22.4–45.8)	
інвалідність	11	9	80.4 (44.2–95.5)	2	19.6 (4.5–55.8)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	22	21	94.2 (66.9–99.3)	1	5.8 (0.7–33.1)	0.0012
3-10 тис	220	140	64.3 (57.1–70.9)	80	35.7 (29.1–42.9)	
10-20 тис	56	25	43.8 (30.7–57.9)	31	56.2 (42.1–69.3)	
≥20 тис	8	4	47.8 (13.3–84.6)	4	52.2 (15.4–86.7)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	245	136	55.5 (48.7–62.0)	109	44.5 (38.0–51.3)	0.0585
так	33	25	73.9 (54.8–86.8)	8	26.1 (13.2–45.2)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	253	153	61.3 (54.9–67.3)	100	38.7 (32.7–45.1)	0.2504
так	52	36	70.3 (55.4–81.9)	16	29.7 (18.1–44.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	268	162	61.1 (54.9–67.0)	106	38.9 (33.0–45.1)	0.4926
так	32	21	67.9 (48.0–82.9)	11	32.1 (17.1–52.0)	
Результат тесту на ВІЛ						

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	17	10	63.6 (37.7–83.5)	7	36.4 (16.5–62.3)	0.8235
негативний	303	185	60.8 (54.8–66.6)	118	39.2 (33.4–45.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	223	138	62.0 (55.1–68.4)	85	38.0 (31.6–44.9)	0.4763
стимулятори	11	7	68.7 (35.2–89.9)	4	31.3 (10.1–64.8)	
опі+стимул	83	48	55.3 (43.1–66.8)	35	44.7 (33.2–56.9)	
інші	3	2	85.6 (8.3–99.7)	1	14.4 (0.3–91.7)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	296	178	60.0 (53.9–65.8)	118	40.0 (34.2–46.1)	
стимулятори	21	14	63.3 (38.4–82.7)	7	36.7 (17.3–61.6)	
інші	0	0	0.0	0	0.0	

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										
так	80	60.2	(51.4–68.4)	35	80.0	(65.8–89.2)	45	50.1	(39.7–60.5)	0.0008
N	139			46			93			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	15	34.3	(21.5–50.0)	4	60.1	(23.1–88.3)	11	29.2	(16.8–45.7)	0.1292
N	47			7			40			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	1	31.4	(4.4–81.9)	0	0.0		1	31.4	(4.4–81.9)	
N	4			0			4			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	3	2.0	(0.6–6.2)	1	1.9	(0.3–12.7)	2	2.1	(0.5–8.1)	0.0017
часто	67	51.1	(42.2–60.0)	33	75.8	(61.0–86.3)	34	38.1	(28.4–48.9)	
половина	5	4.1	(1.6–9.7)	0	0.0		5	6.2	(2.5–14.5)	
іноді	4	3.4	(1.1–9.8)	0	0.0		4	5.1	(1.7–14.5)	
рідко	22	15.5	(10.2–22.8)	2	3.7	(0.9–14.6)	20	21.8	(14.3–31.8)	
ніколи	36	23.9	(17.4–31.8)	10	18.6	(9.7–32.6)	26	26.7	(18.6–36.8)	
N	137			46			91			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	4	7.6	(2.8–19.1)	0	0.0		4	9.2	(3.4–22.6)	0.1300
часто	7	17.6	(8.3–33.6)	3	51.9	(17.6–84.5)	4	10.5	(4.0–25.2)	
половина	3	6.2	(2.0–18.2)	1	8.3	(1.0–44.1)	2	5.8	(1.5–20.6)	
іноді	5	12.5	(4.8–28.6)	0	0.0		5	15.1	(5.9–33.4)	

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
рідко	13	27.9	(16.5–43.1)	2	25.7	(5.8–66.0)	11	28.3	(16.0–45.0)	
ніколи	14	28.2	(17.0–42.9)	1	14.2	(1.8–59.5)	13	31.0	(18.5–47.2)	
N	46			7			39			
Частота використання презервативів: комерційний (я заплатив) партнер										
завжди	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
часто	1	31.4	(4.4–81.9)	0	0.0		1	31.4	(4.4–81.9)	
половина	1	21.2	(2.6–72.7)	0	0.0		1	21.2	(2.6–72.7)	
іноді	1	31.4	(4.4–81.9)	0	0.0		1	31.4	(4.4–81.9)	
рідко	1	16.1	(1.9–65.1)	0	0.0		1	16.1	(1.9–65.2)	
ніколи	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	4			0			4			
Частота використання презервативів: комерційний (мені заплатили) партнер										
завжди	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
часто	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
половина	1	9.4	(1.2–47.3)	0	0.0		1	11.0	(1.4–52.5)	
іноді	3	48.7	(15.5–83.0)	1	100.0		2	40.4	(9.1–82.1)	
рідко	3	41.9	(12.4–78.5)	0	0.0		3	48.7	(13.8–84.9)	
ніколи	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	7			1			6			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (мені заплатили) партнер										
так				0	0.0		0	0.0		
N				1			6			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

			Результат тесту на ВІЛ				
		N	позитивний		негативний		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	21	4.1 (2.6–6.3)	479	95.9 (93.7–97.4)	1.0000
Стать							
	чоловік	415	14	3.5 (2.0–5.9)	401	96.5 (94.1–98.0)	0.1191
	жінка	85	7	7.1 (3.3–14.5)	78	92.9 (85.5–96.7)	
Вікова категорія 4							
	<25	4	0	0.0	4	100.0	0.6903
	25-34	60	2	2.9 (0.7–11.5)	58	97.1 (88.5–99.3)	
	35-44	287	16	5.0 (3.0–8.2)	271	95.0 (91.8–97.0)	
	45+	149	3	2.8 (0.8–9.0)	146	97.2 (91.0–99.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	2	0	0.0	2	100.0	0.7932
	3-5	7	0	0.0	7	100.0	
	6-10	18	0	0.0	18	100.0	
	≥11	456	19	4.1 (2.5–6.5)	437	95.9 (93.5–97.5)	
Партнерський статус							

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	228	9	3.9 (2.0–7.4)	219	96.1 (92.6–98.0)	0.8395
живе з партнером	272	12	4.2 (2.3–7.6)	260	95.8 (92.4–97.7)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	61	2	3.2 (0.8–12.7)	59	96.8 (87.3–99.2)	0.2464
неповний робочий день або тимчасово	297	10	3.2 (1.7–6.2)	287	96.8 (93.8–98.3)	
безробітний	113	9	7.6 (3.9–14.3)	104	92.4 (85.7–96.1)	
інвалідність	22	0	0.0	22	100.0	
інші	6	0	0.0	6	100.0	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	33	1	3.7 (0.5–23.2)	32	96.3 (76.8–99.5)	0.1805
3-10 тис	347	17	4.7 (2.9–7.7)	330	95.3 (92.3–97.1)	
10-20 тис	84	0	0.0	84	100.0	
≥20 тис	8	1	10.5 (0.9–60.2)	7	89.5 (39.8–99.1)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	362	19	5.1 (3.2–8.0)	343	94.9 (92.0–96.8)	0.8542
так	45	2	4.4 (1.0–17.1)	43	95.6 (82.9–99.0)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	385	12	3.4 (1.9–6.0)	373	96.6 (94.0–98.1)	0.0505
так	96	9	7.9 (4.0–14.9)	87	92.1 (85.1–96.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	407	17	4.2 (2.5–6.8)	390	95.8 (93.2–97.5)	0.4857
так	56	4	6.1 (2.2–15.9)	52	93.9 (84.1–97.8)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	330	17	4.8 (3.0–7.7)	313	95.2 (92.3–97.0)	0.1294

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
стимулятори	20	2	14.3 (2.9–48.5)	18	85.7 (51.5–97.1)	
опі+стимул	146	2	1.1 (0.3–4.4)	144	98.9 (95.6–99.7)	
інші	4	0	0.0	4	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	458	19	3.8 (2.4–6.0)	439	96.2 (94.0–97.6)	0.4465
стимулятори	34	2	8.7 (1.8–33.2)	32	91.3 (66.8–98.2)	
інші	3	0	0.0	3	100.0	




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)




Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)




Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
		N	ні		так	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	481	385	80.1 (75.9–83.7)	96	19.9 (16.3–24.1)	1.0000
Стать							
	чоловік	398	318	79.8 (75.1–83.8)	80	20.2 (16.2–24.9)	0.7110
	жінка	83	67	81.6 (71.4–88.8)	16	18.4 (11.2–28.6)	

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	4	2	41.0 (2.7–94.7)	2	59.0 (5.3–97.3)	0.1709
25-34	59	49	84.7 (73.0–91.9)	10	15.3 (8.1–27.0)	
35-44	278	227	81.0 (75.1–85.7)	51	19.0 (14.3–24.9)	
45+	140	107	77.4 (69.4–83.8)	33	22.6 (16.2–30.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	2	2	100.0	0	0.0	0.4905
3-5	7	6	81.3 (23.4–98.4)	1	18.7 (1.6–76.6)	
6-10	18	17	94.7 (67.0–99.4)	1	5.3 (0.6–33.0)	
≥11	437	351	80.2 (75.8–84.0)	86	19.8 (16.0–24.2)	
Партнерський статус						
живе сам	222	196	89.7 (85.1–93.1)	26	10.3 (6.9–14.9)	0.0000
живе з партнером	259	189	71.7 (65.2–77.4)	70	28.3 (22.6–34.8)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	58	45	76.0 (62.2–85.9)	13	24.0 (14.1–37.8)	0.3574
неповний робочий день або тимчасово	286	238	82.7 (77.2–87.1)	48	17.3 (12.9–22.8)	
безробітний	108	78	74.5 (65.0–82.2)	30	25.5 (17.8–35.0)	
інвалідність	22	18	80.7 (55.9–93.3)	4	19.3 (6.7–44.1)	
інші	6	5	88.3 (30.9–99.2)	1	11.7 (0.8–69.1)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	33	22	65.6 (46.8–80.6)	11	34.4 (19.4–53.2)	0.1141
3-10 тис	333	272	81.4 (76.3–85.7)	61	18.6 (14.3–23.7)	
10-20 тис	80	61	76.9 (65.9–85.2)	19	23.1 (14.8–34.1)	
≥20 тис	8	5	59.8 (19.0–90.4)	3	40.2 (9.6–81.0)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	349	292	84.3 (80.0–87.9)	57	15.7 (12.1–20.0)	0.1949
так	44	33	76.5 (61.0–87.1)	11	23.5 (12.9–39.0)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	396	342	86.6 (82.7–89.8)	54	13.4 (10.2–17.3)	0.0000
так	52	18	31.0 (19.3–45.8)	34	69.0 (54.2–80.7)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	21	12	63.1 (39.8–81.6)	9	36.9 (18.4–60.2)	0.0505
негативний	460	373	80.9 (76.6–84.5)	87	19.1 (15.5–23.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	321	262	82.6 (77.9–86.5)	59	17.4 (13.5–22.1)	0.0000
стимулятори	19	12	58.0 (31.9–80.3)	7	42.0 (19.7–68.1)	
опі+стимул	137	110	80.8 (73.0–86.8)	27	19.2 (13.2–27.0)	
інші	4	1	12.2 (0.3–87.7)	3	87.8 (12.3–99.7)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	441	360	82.1 (78.1–85.6)	81	17.9 (14.4–21.9)	0.0629
стимулятори	32	21	67.1 (47.8–82.0)	11	32.9 (18.0–52.2)	
інші	3	2	53.2 (0.6–99.6)	1	46.8 (0.4–99.4)	




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	57.8	58.5	42.2	0.1523
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	60.0	60.2	53.5	0.5623

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом	негативний	позитивний	
	%	%	%	p-значення
невиявлений = непередаваний	61.5	61.4	64.1	0.8058
ПКП знижує ризик	61.0	61.3	53.8	0.5181
АРТ слід починати негайно	47.7	47.6	51.1	0.7618
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	25.2	25.1	26.7	0.8863
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	40.5	41.0	27.5	0.2312
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	62.2	62.3	58.6	0.7403
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	49.4	49.9	37.6	0.2758
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	55.4	56.1	39.2	0.1396
лікування слід починати негайно	58.7	58.5	63.2	0.6907
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	36.2	36.8	23.2	0.2769
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	13.7	13.6	15.9	0.7534
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	61.0	61.2	54.7	0.5715
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	19.8	19.5	26.2	0.5022
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	41.2	42.2	18.8	0.0403
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	17.1	16.2	37.5	0.0208
лікування слід починати негайно	53.0	52.8	57.3	0.7042
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	38.2	38.7	24.8	0.1911
ВГС на 100% передається від матері до дитини	9.4	8.6	28.0	0.0040
ВГС передається через кров і статевим шляхом	63.8	63.9	62.1	0.8800
лікування ВГС не існує	14.0	13.0	39.1	0.0016
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	29.7	28.7	52.1	0.0298
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	31.8	31.1	46.0	0.1787

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	309	65.0	(60.2–69.4)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	330	76.5	(71.9–80.6)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	39	47.0	(36.1–58.2)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	23	28.9	(19.7–40.2)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	282	89.6	(85.3–92.8)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	279	99.7	(97.9–100.0)
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	4	1.1	(0.4–3.0)
негативний	312	98.9	(97.0–99.6)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	37	47.0	(35.7–58.5)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	0	0.0	
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	96	41.0	(34.4–47.9)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	2	2.0	(0.5–7.7)
негативний	90	96.3	(90.4–98.6)
не може розкрити	2	1.7	(0.4–6.8)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

			Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	82	43	53.0 (41.8–63.9)	39	47.0 (36.1–58.2)	1.0000
Стать							
	чоловік	69	38	54.6 (42.3–66.3)	31	45.4 (33.7–57.7)	0.5018
	жінка	13	5	44.0 (19.9–71.4)	8	56.0 (28.6–80.1)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	1	0	0.0	1	100.0	0.4048
25-34	14	9	64.4 (35.8–85.4)	5	35.6 (14.6–64.2)	
35-44	40	18	46.9 (31.5–62.9)	22	53.1 (37.1–68.5)	
45+	27	16	59.4 (39.6–76.5)	11	40.6 (23.5–60.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	0	0	0.0	0	0.0	
3-5	1	0	0.0	1	100.0	
6-10	5	1	18.8 (2.1–71.5)	4	81.2 (28.5–97.9)	
≥11	73	40	56.0 (44.1–67.3)	33	44.0 (32.7–55.9)	
Партнерський статус						
живе сам	32	17	53.9 (36.2–70.7)	15	46.1 (29.3–63.8)	0.9004
живе з партнером	50	26	52.4 (38.2–66.3)	24	47.6 (33.7–61.8)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	25	15	60.8 (39.8–78.5)	10	39.2 (21.5–60.2)	0.1467
неповний робочий день або тимчасово	27	16	57.8 (38.0–75.4)	11	42.2 (24.6–62.0)	
безробітний	21	7	34.6 (17.1–57.5)	14	65.4 (42.5–82.9)	
інвалідність	7	5	74.8 (33.2–94.7)	2	25.2 (5.3–66.8)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	16	4	25.0 (9.1–52.5)	12	75.0 (47.5–90.9)	0.0019
3-10 тис	42	25	59.8 (44.0–73.8)	17	40.2 (26.2–56.0)	
10-20 тис	15	11	77.7 (51.7–91.9)	4	22.3 (8.1–48.3)	
≥20 тис	6	1	11.3 (0.9–63.6)	5	88.7 (36.4–99.1)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	60	28	47.1 (34.5–60.1)	32	52.9 (39.9–65.5)	0.0791
так	17	12	71.5 (45.7–88.2)	5	28.5 (11.8–54.3)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

	N	Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
		ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	52	28	52.8 (38.8–66.3)	24	47.2 (33.7–61.2)	0.9180
так	26	13	54.0 (34.2–72.7)	13	46.0 (27.3–65.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	54	30	55.1 (41.2–68.2)	24	44.9 (31.8–58.8)	0.8264
так	26	13	52.4 (32.7–71.3)	13	47.6 (28.7–67.3)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	6	2	35.4 (8.0–77.6)	4	64.6 (22.4–92.0)	0.3861
негативний	76	41	54.4 (42.7–65.6)	35	45.6 (34.4–57.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	56	24	44.6 (31.7–58.3)	32	55.4 (41.7–68.3)	0.1838
стимулятори	7	5	61.4 (20.8–90.5)	2	38.6 (9.5–79.2)	
опі+стимул	18	13	71.9 (46.5–88.3)	5	28.1 (11.7–53.5)	
інші	1	1	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	66	31	48.5 (36.3–60.9)	35	51.5 (39.1–63.7)	0.3023
стимулятори	14	10	67.0 (37.1–87.5)	4	33.0 (12.5–62.9)	
інші	1	1	100.0	0	0.0	

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)		Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	n	% (ДІ)	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
	Разом	21	17.4 (6.4–39.3)	1.0000			4	3	79.8 (28.8–97.5)	1.0000
Стать										
	чоловік	14	17.3 (5.3–43.8)	0.9771	3	100.0	3	2	71.3 (18.0–96.6)	0.4882
	жінка	7	17.8 (2.5–65.1)		1	100.0	1	1	100.0	
Вікова категорія 4										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)		Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	n	% (ДІ)	N	n	% (ДІ)	p-значення
<25	0	0.0		0	0.0	0	0	0.0	
25-34	2	59.7 (8.0–96.2)		1	100.0	1	1	100.0	
35-44	16	17.3 (5.5–43.1)		3	100.0	3	2	71.3 (17.9–96.6)	
45+	3	0.0		0	0.0	0	0	0.0	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків									
≤2	0	0.0				0	0	0.0	
3-5	0	0.0				0	0	0.0	
6-10	0	0.0				0	0	0.0	
≥11	19	19.1 (7.0–42.4)				4	3	79.8 (28.8–97.5)	
Партнерський статус									
живе сам	9	20.1 (4.8–55.7)	0.7778	2	100.0	2	1	59.7 (8.3–96.0)	0.3038
живе з партнером	12	15.4 (3.6–46.6)		2	100.0	2	2	100.0	
Поточний статус зайнятості									
повний робочий день	2	100.0		2	100.0	2	1	59.7 (8.0–96.2)	
неповний робочий день або тимчасово	10	7.2 (1.0–38.6)		1	100.0	1	1	100.0	
безробітний	9	12.2 (1.7–53.4)		1	100.0	1	1	100.0	
інвалідність	0	0.0		0	0.0	0	0	0.0	
інші	0	0.0		0	0.0	0	0	0.0	
Категорія місячного доходу									
<3 тис	1	100.0		1	100.0	1	1	100.0	
3-10 тис	17	10.6 (2.5–34.9)		2	100.0	2	1	59.7 (8.4–96.0)	
10-20 тис	0	0.0		0	0.0	0	0	0.0	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)		Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	n	% (ДІ)	N	n	% (ДІ)	p-значення
≥20 тис	1	100.0		1	100.0	1	1	100.0	
Був позбавлений волі будь-коли									
ні	19	19.1 (7.0–42.4)	0.5038			4	3	79.8 (28.8–97.5)	
так	2	0.0				0	0	0.0	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)		Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)		
	N	% (ДІ)	p-значення	n	% (ДІ)	N	n	% (ДІ)
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	12	0.0	0.0025			0	0	0.0
так	9	47.3 (18.7–77.7)				4	3	79.8 (28.4–97.5)
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	17	16.6 (5.3–41.8)	0.8155	3	100.0	3	2	74.7 (21.0–97.1)
так	4	21.4 (2.6–73.5)		1	100.0	1	1	100.0
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	21	17.4 (6.0–40.9)				4	3	79.8 (26.0–97.8)
негативний	0	0.0				0	0	0.0
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	17	17.7 (5.7–43.5)		3	100.0	3	2	74.7 (21.0–97.1)
стимулятори	2	0.0		0	0.0	0	0	0.0
опі+стимул	2	45.6 (4.9–93.2)		1	100.0	1	1	100.0
інші	0	0.0		0	0.0	0	0	0.0
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	19	20.2 (7.6–43.9)				4	3	79.8 (28.8–97.5)
стимулятори	2	0.0				0	0	0.0
інші	0	0.0				0	0	0.0

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	1	20.2	(2.5–71.2)
1-2 тижні тому	0	0.0	
3-4 тижні тому	0	0.0	
1-3 місяці тому	0	0.0	
ніколи	3	79.8	(28.8–97.5)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	0	0.0	
ліків не було	1	100.0	
був під впливом	0	0.0	
не хотів, щоб інші бачили	0	0.0	
інші	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	0	0.0	
відсутність часу на відвідування клініки	0	0.0	
відсутність мотивації відвідувати клініку	0	0.0	
пропуск візиту, важко повернутися	0	0.0	
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	0	0.0	
вживання наркотиків	1	100.0	
побічні ефекти або ускладнення	0	0.0	
немає розуміння як	0	0.0	
втрачено або продано всі АРВ-препарати	0	0.0	
Причини відмови від ДРТ			
вживання алкоголю	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
довго чекав і пішов	1	100.0	
Час на АРТ			
≤3м	1	100.0	
4-24м	0	0.0	
25-60м	0	0.0	
5 років +	0	0.0	

9. Доконтактна профілактика




Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

			Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
		N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього											
	Разом	477	38	7.8 (5.4–11.0)	8	1.5 (0.7–3.0)	68	13.2 (10.4–16.7)	363	77.6 (73.3–81.3)	1.0000
Стать											
	чоловік	392	29	7.5 (4.9–11.2)	7	1.5 (0.7–3.2)	59	14.2 (10.9–18.2)	297	76.8 (72.0–81.1)	0.5903
	жінка	85	9	9.0 (4.6–17.0)	1	1.3 (0.2–8.7)	9	8.8 (4.5–16.6)	66	80.9 (71.2–87.9)	
Вікова категорія 4											
	<25	3	0	0.0	0	0.0	1	24.1 (0.6–94.2)	2	75.9 (5.8–99.4)	0.9811
	25-34	58	4	5.6 (2.0–15.0)	0	0.0	10	15.4 (8.1–27.3)	44	79.0 (66.3–87.8)	
	35-44	272	20	8.0 (4.8–13.2)	5	1.5 (0.6–3.7)	38	13.2 (9.5–18.1)	209	77.2 (71.2–82.3)	
	45+	144	14	8.3 (4.8–13.8)	3	2.0 (0.6–6.5)	19	12.1 (7.7–18.6)	108	77.6 (69.9–83.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків											
	≤2	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	
	3-5	7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
6-10	18	0	0.0	0	0.0	4	20.7 (7.2–47.0)	14	79.3 (53.0–92.8)	
≥11	434	36	8.1 (5.6–11.6)	8	1.6 (0.8–3.3)	60	12.8 (9.9–16.5)	330	77.5 (72.9–81.4)	
Партнерський статус										
живе сам	222	12	5.0 (2.8–8.7)	1	0.3 (0.0–2.3)	32	12.8 (9.0–17.9)	177	81.9 (76.2–86.5)	0.0280
живе з партнером	255	26	10.2 (6.5–15.6)	7	2.5 (1.1–5.3)	36	13.6 (9.7–18.7)	186	73.7 (67.3–79.3)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	60	2	3.3 (0.8–13.0)	3	4.9 (1.5–14.7)	14	19.7 (11.6–31.5)	41	72.0 (59.3–82.0)	0.1492
неповний робочий день або тимчасово	281	27	9.6 (6.2–14.5)	4	1.2 (0.4–3.4)	31	10.4 (7.2–14.7)	219	78.9 (73.1–83.7)	
безробітний	108	7	5.5 (2.6–11.4)	1	0.8 (0.1–5.5)	21	18.7 (12.1–27.8)	79	75.0 (65.5–82.6)	
інвалідність	21	2	7.4 (1.6–28.5)	0	0.0	2	10.6 (2.4–36.0)	17	82.0 (58.0–93.7)	
інші	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	31	3	9.1 (2.7–26.6)	1	3.2 (0.4–21.0)	7	22.2 (10.4–41.2)	20	65.5 (46.4–80.6)	0.4255
3-10 тис	330	24	7.4 (4.6–11.6)	4	1.0 (0.4–2.9)	43	12.6 (9.3–16.9)	259	79.0 (73.7–83.5)	
10-20 тис	80	7	8.6 (4.0–17.2)	3	3.4 (1.1–10.3)	14	14.6 (8.5–24.0)	56	73.4 (62.6–82.0)	
≥20 тис	8	2	19.6 (3.3–63.6)	0	0.0	3	28.6 (6.4–70.3)	3	51.8 (15.4–86.3)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	354	19	4.6 (2.9–7.2)	5	1.3 (0.5–3.3)	53	13.4 (10.2–17.4)	277	80.6 (76.1–84.4)	0.6121
так	42	4	8.9 (3.2–22.5)	1	2.0 (0.3–13.4)	6	11.5 (5.0–24.3)	31	77.6 (62.7–87.7)	

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	369	2	0.3 (0.1–1.1)	3	0.7 (0.2–2.2)	43	10.8 (7.9–14.5)	321	88.2 (84.4–91.2)	0.0000
так	91	35	38.9 (28.2–50.7)	5	5.0 (2.0–12.0)	23	23.9 (15.8–34.5)	28	32.2 (22.7–43.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	388	12	2.6 (1.5–4.7)	6	1.4 (0.6–3.2)	50	11.6 (8.7–15.3)	320	84.3 (80.3–87.7)	0.0000
так	53	22	45.9 (31.0–61.6)	2	3.1 (0.7–12.1)	12	21.3 (11.9–35.3)	17	29.7 (18.3–44.3)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	20	3	11.7 (3.4–33.2)	0	0.0	6	27.5 (11.7–52.0)	11	60.8 (37.0–80.4)	0.1853
негативний	457	35	7.6 (5.2–10.9)	8	1.5 (0.7–3.1)	62	12.6 (9.8–16.1)	352	78.3 (73.9–82.1)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	316	21	5.9 (3.8–9.0)	5	1.5 (0.6–3.6)	50	14.7 (11.1–19.2)	240	78.0 (72.9–82.3)	0.0000
стимулятори	20	2	9.0 (2.0–33.0)	0	0.0	3	18.1 (4.8–49.3)	15	72.9 (44.8–89.9)	
опі+стимул	137	12	7.8 (4.4–13.7)	3	1.7 (0.5–5.4)	14	9.2 (5.3–15.3)	108	81.3 (73.8–87.0)	
інші	4	3	87.8 (12.3–99.7)	0	0.0	1	12.2 (0.3–87.7)	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	437	32	6.6 (4.7–9.3)	6	1.2 (0.5–2.8)	64	13.7 (10.7–17.4)	335	78.4 (74.2–82.2)	0.1088
стимулятори	32	3	6.4 (1.9–19.2)	2	5.2 (1.2–19.6)	4	11.1 (3.9–27.6)	23	77.3 (59.9–88.6)	
інші	3	1	46.8 (0.4–99.4)	0	0.0	0	0.0	2	53.2 (0.6–99.6)	

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	38	7.8	(5.4–11.0)
приймав в минулому	8	1.5	(0.7–3.0)
ніколи не приймав	68	13.2	(10.4–16.7)
не знає що це	363	77.6	(73.3–81.3)
Обізнаність про ДКП			
ні	363	76.8	(72.4–80.6)
так	117	23.2	(19.4–27.6)
Використання ДКП зараз			
ні	439	92.2	(89.0–94.6)
так	38	7.8	(5.4–11.0)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	76	65.5	(54.9–74.6)
так	38	34.5	(25.4–45.1)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)



Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)




Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	3	7.1	(2.3–20.2)
клініка закрита після лютого 2022 року	6	13.8	(6.0–28.6)
слабкий або відсутній ефект	9	23.6	(12.6–39.8)
побічні ефекти	5	12.7	(5.3–27.3)
не хочу відвідувати клініку	9	23.4	(12.4–40.0)
не хочу кидати наркотики	3	8.0	(2.4–23.4)
важко дістатися до клініки	3	8.0	(2.6–22.3)
не потребує	4	8.6	(3.2–21.2)
не подобається ставлення лікаря	0	0.0	
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	14	29.7	(18.0–44.8)
не змінилось	21	48.8	(34.1–63.8)
зменшилося	9	21.5	(11.4–36.9)
Чи купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	85	16.4	(13.3–20.1)
так, бупренорфін	17	3.8	(2.3–6.2)
не купував	358	79.7	(75.7–83.2)
Де купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	358	82.4	(78.5–85.7)
купляв на чорн. ринку	73	14.8	(11.8–18.4)
купляв в приватній клініці	13	2.9	(1.6–5.0)
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорн.ринку			
ін'єкційно	58	69.1	(57.5–78.6)
ін'єкційно у суміші	4	5.0	(1.9–12.8)
ковтав або розсмоктував	11	15.8	(8.9–26.6)
нюхав	8	10.1	(5.1–19.2)

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього										
Разом	463	56	11.7 (8.9–15.4)	36	7.3 (5.2–10.1)	97	19.3 (15.8–23.3)	274	61.7 (56.9–66.3)	1.0000
Стать										
чоловік	382	47	12.0 (8.8–16.1)	31	7.3 (5.1–10.4)	73	18.0 (14.3–22.4)	231	62.8 (57.4–67.8)	0.4635
жінка	81	9	10.7 (5.5–20.0)	5	7.1 (2.9–16.2)	24	25.9 (17.6–36.5)	43	56.3 (44.9–67.0)	
Вікова категорія 4										
<25	4	0	0.0	1	22.3 (0.7–92.2)	0	0.0	3	77.7 (7.8–99.3)	0.1767
25-34	56	7	9.6 (4.4–19.7)	7	10.6 (4.9–21.6)	14	20.8 (12.0–33.6)	28	59.0 (44.6–72.0)	
35-44	266	25	9.9 (6.3–15.1)	14	4.9 (2.9–8.3)	55	19.0 (14.6–24.4)	172	66.2 (59.8–72.0)	
45+	137	24	16.8 (11.3–24.2)	14	10.1 (5.9–16.8)	28	19.7 (13.6–27.8)	71	53.4 (44.3–62.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	
3-5	7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	100.0	
6-10	17	2	12.3 (2.7–41.2)	0	0.0	4	20.4 (6.9–47.1)	11	67.3 (40.6–86.1)	
≥11	420	51	11.8 (8.8–15.7)	34	7.6 (5.4–10.6)	91	20.0 (16.3–24.3)	244	60.5 (55.4–65.4)	
Партнерський статус										
живе сам	209	21	9.0 (5.8–13.6)	4	1.9 (0.7–5.0)	36	14.9 (10.7–20.4)	148	74.2 (67.7–79.8)	0.0000
живе з партнером	254	35	14.0 (9.8–19.8)	32	11.8 (8.3–16.4)	61	23.0 (17.9–28.9)	126	51.2 (44.6–57.9)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	60	12	18.5 (10.5–30.7)	3	5.9 (1.8–17.6)	15	23.9 (14.6–36.6)	30	51.7 (38.6–64.5)	0.1327
неповний робочий день або тимчасово	266	22	8.9 (5.5–14.1)	19	6.6 (4.2–10.3)	62	21.5 (16.8–27.1)	163	63.0 (56.5–69.0)	

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	110	17	14.0 (8.6–21.9)	9	7.1 (3.6–13.5)	16	12.9 (7.7–21.1)	68	66.0 (56.1–74.6)	
інвалідність	21	4	17.8 (6.2–41.6)	4	20.8 (7.2–47.0)	3	13.3 (4.0–36.1)	10	48.1 (26.7–70.3)	
інші	6	1	22.8 (1.7–83.3)	1	13.3 (0.9–72.1)	1	11.7 (0.8–69.1)	3	52.3 (11.3–90.4)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	31	8	24.5 (11.9–43.8)	4	16.0 (5.9–36.6)	8	23.2 (11.4–41.5)	11	36.3 (20.7–55.4)	0.0868
3-10 тис	321	29	9.4 (6.2–13.9)	25	7.1 (4.8–10.5)	73	21.0 (16.7–26.1)	194	62.5 (56.6–68.0)	
10-20 тис	76	13	15.7 (9.1–25.8)	4	5.2 (1.9–13.6)	13	15.7 (9.1–25.8)	46	63.4 (51.7–73.8)	
≥20 тис	8	2	19.6 (3.3–63.6)	0	0.0	2	19.6 (3.3–63.6)	4	60.8 (21.6–89.7)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	344	38	9.8 (7.1–13.3)	26	7.0 (4.7–10.2)	73	19.3 (15.4–23.9)	207	64.0 (58.5–69.1)	0.1473
так	42	7	17.0 (8.0–32.7)	3	7.2 (2.2–21.3)	13	29.6 (17.4–45.6)	19	46.2 (31.0–62.2)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	360	18	4.4 (2.7–6.9)	20	4.8 (3.1–7.5)	75	18.4 (14.7–22.8)	247	72.4 (67.5–76.9)	0.0000
так	88	34	39.7 (28.8–51.7)	15	17.9 (10.8–28.2)	18	20.8 (12.9–31.8)	21	21.7 (14.1–31.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	407	0	0.0	36	8.3 (5.9–11.4)	97	21.9 (18.0–26.3)	274	69.9 (65.1–74.3)	0.0000
так	56	56	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	21	4	16.4 (5.7–39.1)	0	0.0	8	40.8 (20.3–65.0)	9	42.8 (22.3–66.1)	0.0444

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
негативний	442	52	11.5 (8.6–15.3)	36	7.6 (5.5–10.5)	89	18.3 (14.9–22.3)	265	62.6 (57.6–67.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	314	37	10.5 (7.6–14.4)	19	6.2 (3.9–9.6)	58	17.0 (13.1–21.8)	200	66.3 (60.6–71.5)	0.0000
стимулятори	20	3	13.4 (3.9–37.2)	6	24.7 (10.0–49.1)	4	29.8 (10.7–60.1)	7	32.1 (14.3–57.3)	
опі+стимул	125	13	10.3 (5.9–17.2)	11	7.8 (4.2–14.0)	34	23.8 (17.1–32.1)	67	58.1 (48.8–66.9)	
інші	4	3	87.8 (12.3–99.7)	0	0.0	1	12.2 (0.3–87.7)	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	423	47	10.3 (7.7–13.6)	26	5.9 (4.0–8.6)	92	19.9 (16.2–24.1)	258	64.0 (59.1–68.6)	0.0002
стимулятори	33	5	12.8 (5.1–28.5)	9	27.3 (14.1–46.2)	5	17.4 (6.6–38.6)	14	42.6 (25.6–61.5)	
інші	3	1	46.8 (0.4–99.4)	1	21.6 (0.1–98.2)	0	0.0	1	31.6 (0.2–99.0)	




Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)



Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

		n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь				
	так	270	62.5	(57.6–67.2)
Кількість передозувань протягом життя				
	1	64	29.3	(23.0–36.6)
	2-4	125	56.5	(49.0–63.7)
	5+	28	14.2	(9.4–20.9)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	так	31	7.7	(5.3–10.9)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)				
	так	31	12.8	(8.9–18.0)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців				
	1	24	85.3	(65.9–94.5)

	n	%	ДІ
2-4	4	14.7	(5.5–34.1)
5+	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)			
метадон	9	68.4	(38.9–88.0)
інші опіоїди	0	0.0	
стимулятор	3	24.0	(7.6–54.5)
інші	1	7.6	(1.0–39.3)
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)			
метадон+стимулятор	0	0.0	
метадон+барбіт. або димедр.	0	0.0	
метадон+інше	0	0.0	
інші	6	100.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)			
метадон	3	20.9	(6.5–49.9)
інші опіоїди	5	36.1	(14.8–64.8)
стимулятор	1	12.8	(1.8–53.5)
інші	3	30.2	(10.2–62.4)
Знання та досвід налоксону			
ніколи не чув	216	47.3	(42.5–52.1)
знає, але не користувався	133	24.5	(20.8–28.6)
користувався	58	11.7	(8.8–15.3)
користувались друзі	61	11.6	(9.0–14.8)
користувався сам та друзі	23	4.9	(3.3–7.4)

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	416	385	92.3 (89.1–94.7)	31	7.7 (5.3–10.9)	1.0000
Стать						
чоловік	353	325	91.9 (88.2–94.5)	28	8.1 (5.5–11.8)	0.3628
жінка	63	60	95.2 (85.8–98.5)	3	4.8 (1.5–14.2)	
Вікова категорія 4						
<25	3	3	100.0	0	0.0	0.8659
25-34	51	46	89.7 (76.5–95.9)	5	10.3 (4.1–23.5)	
35-44	249	231	92.8 (88.6–95.6)	18	7.2 (4.4–11.4)	
45+	113	105	92.3 (84.4–96.4)	8	7.7 (3.6–15.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	1	1	100.0	0	0.0	0.4059

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців					
	N	ні		так			
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)		p-значення
3-5	5	5	100.0	0	0.0		
6-10	15	13	80.8 (45.4–95.5)	2	19.2 (4.5–54.6)		
≥11	380	354	93.1 (89.7–95.4)	26	6.9 (4.6–10.3)		
Партнерський статус							
живе сам	179	173	96.2 (91.2–98.4)	6	3.8 (1.6–8.8)		0.0252
живе з партнером	237	212	89.4 (84.5–92.9)	25	10.6 (7.1–15.5)		
Поточний статус зайнятості							
повний робочий день	53	50	93.3 (80.4–97.9)	3	6.7 (2.1–19.6)		0.2797
неповний робочий день або тимчасово	240	224	93.9 (89.9–96.4)	16	6.1 (3.6–10.1)		
безробітний	97	88	89.6 (80.4–94.8)	9	10.4 (5.2–19.6)		
інвалідність	19	16	80.9 (52.2–94.2)	3	19.1 (5.8–47.8)		
інші	6	6	100.0	0	0.0		
Категорія місячного доходу							
<3 тис	32	30	91.2 (69.8–97.9)	2	8.8 (2.1–30.2)		0.6688
3-10 тис	287	266	92.7 (88.6–95.3)	21	7.3 (4.7–11.4)		
10-20 тис	66	61	93.1 (84.1–97.2)	5	6.9 (2.8–15.9)		
≥20 тис	8	7	79.4 (23.1–98.0)	1	20.6 (2.0–76.9)		
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	300	276	91.6 (87.6–94.5)	24	8.4 (5.5–12.4)		0.3291
так	39	37	95.8 (84.0–99.0)	2	4.2 (1.0–16.0)		

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

	Мав передозування протягом останніх 12 місяців					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	323	310	95.8 (92.7–97.6)	13	4.2 (2.4–7.3)	0.0000
так	81	63	77.5 (66.0–85.9)	18	22.5 (14.1–34.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						

	N	Мав передозування протягом останніх 12 місяців			
		ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	338	319	93.9 (90.4–96.2)	19	6.1 (3.8–9.6)	0.0214
так	49	41	84.2 (70.2–92.4)	8	15.8 (7.6–29.8)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	19	17	90.4 (65.6–97.9)	2	9.6 (2.1–34.4)	0.7401
негативний	397	368	92.4 (89.1–94.8)	29	7.6 (5.2–10.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	268	247	91.8 (87.5–94.8)	21	8.2 (5.2–12.5)	0.1521
стимулятори	16	13	79.0 (45.3–94.5)	3	21.0 (5.5–54.7)	
опі+стимул	129	123	95.6 (90.3–98.0)	6	4.4 (2.0–9.7)	
інші	3	2	86.0 (9.0–99.7)	1	14.0 (0.3–91.0)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	383	355	92.2 (88.7–94.7)	28	7.8 (5.3–11.3)	0.8845
стимулятори	27	24	91.6 (75.6–97.5)	3	8.4 (2.5–24.4)	
інші	3	3	100.0	0	0.0	

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	491	216	47.3 (42.5–52.1)	194	36.1 (31.8–40.7)	81	16.6 (13.3–20.6)	1.0000
Стать								
чоловік	406	164	43.6 (38.4–49.0)	171	38.6 (33.8–43.8)	71	17.7 (13.9–22.3)	0.0022
жінка	85	52	65.0 (53.7–74.9)	23	23.8 (15.8–34.2)	10	11.2 (6.0–20.0)	
Вікова категорія 4								
<25	3	2	52.9 (2.2–98.2)	1	47.1 (1.8–97.8)	0	0.0	0.7058

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
25-34	59	23	48.2 (34.0–62.7)	26	37.2 (25.1–51.0)	10	14.7 (7.7–26.0)	
35-44	282	137	50.3 (44.1–56.5)	101	33.3 (27.8–39.3)	44	16.4 (11.9–22.0)	
45+	147	54	41.0 (32.2–50.4)	66	40.8 (32.5–49.5)	27	18.2 (12.5–25.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.3754
3-5	7	6	81.3 (23.4–98.4)	1	18.7 (1.6–76.6)	0	0.0	
6-10	17	6	34.5 (14.8–61.6)	8	46.4 (23.0–71.4)	3	19.1 (5.7–47.9)	
≥11	449	195	46.8 (41.8–51.9)	179	36.3 (31.7–41.1)	75	16.9 (13.4–21.2)	
Партнерський статус								
живе сам	224	109	53.6 (46.6–60.5)	80	31.5 (25.6–38.1)	35	14.8 (10.6–20.4)	0.0546
живе з партнером	267	107	41.9 (35.5–48.6)	114	40.0 (33.8–46.4)	46	18.1 (13.3–24.1)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	61	20	35.9 (24.3–49.5)	35	54.8 (41.6–67.4)	6	9.2 (4.1–19.5)	0.0019
неповний робочий день або тимчасово	290	148	52.7 (46.4–58.9)	100	32.0 (26.6–37.9)	42	15.3 (11.1–20.8)	
безробітний	111	41	42.8 (32.8–53.4)	46	37.0 (28.1–46.8)	24	20.2 (13.6–29.1)	
інвалідність	22	6	31.0 (14.0–55.5)	8	32.2 (15.6–55.1)	8	36.7 (18.4–59.8)	
інші	6	0	0.0	5	81.6 (20.7–98.7)	1	18.4 (1.3–79.3)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	33	5	17.6 (7.2–37.0)	20	55.5 (37.3–72.4)	8	26.9 (13.7–46.2)	0.0046

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
3-10 тис	339	156	48.5 (42.6–54.4)	127	34.4 (29.2–39.9)	56	17.1 (13.0–22.2)	
10-20 тис	84	39	51.5 (40.3–62.5)	34	37.3 (27.3–48.4)	11	11.2 (6.2–19.6)	
≥20 тис	8	2	19.6 (3.3–63.6)	6	80.4 (36.4–96.7)	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	360	198	58.8 (53.3–64.1)	128	32.3 (27.5–37.6)	34	8.9 (6.2–12.4)	0.0000
так	45	9	23.1 (12.2–39.3)	26	53.8 (38.4–68.5)	10	23.1 (12.4–38.8)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

	Знання та досвід налоксону (3 категорії)							
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	377	195	55.6 (50.2–60.8)	134	31.7 (27.0–36.7)	48	12.8 (9.6–16.8)	0.0000
так	95	16	17.2 (10.4–27.1)	51	53.1 (41.9–64.0)	28	29.7 (20.2–41.4)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	399	197	52.7 (47.5–57.9)	150	34.4 (29.7–39.5)	52	12.8 (9.8–16.7)	0.0000
так	56	7	12.6 (5.8–25.1)	30	48.9 (34.5–63.5)	19	38.5 (24.5–54.7)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	21	10	48.0 (26.2–70.6)	8	33.0 (15.8–56.5)	3	19.0 (5.4–49.1)	0.9411
негативний	470	206	47.3 (42.4–52.2)	186	36.2 (31.8–40.9)	78	16.5 (13.1–20.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	327	167	54.0 (48.3–59.7)	129	36.3 (31.1–42.0)	31	9.6 (6.7–13.6)	0.0000
стимулятори	20	2	16.0 (3.5–49.8)	12	52.7 (28.4–75.8)	6	31.3 (12.9–58.4)	
опі+стимул	140	47	38.0 (29.0–47.8)	52	34.2 (26.4–42.9)	41	27.8 (20.7–36.3)	
інші	4	0	0.0	1	15.2 (0.3–90.4)	3	84.8 (9.6–99.7)	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	450	209	49.9 (45.0–54.9)	175	35.6 (31.1–40.4)	66	14.5 (11.4–18.2)	0.0065
стимулятори	33	6	20.8 (8.8–41.7)	16	47.1 (29.5–65.5)	11	32.1 (17.4–51.5)	
інші	3	0	0.0	2	68.4 (1.0–99.8)	1	31.6 (0.2–99.0)	

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	321	66.5	(61.8–70.9)
	гепатит C	287	59.9	(55.0–64.5)
	сифіліс	84	17.7	(14.3–21.7)
	гонорея	58	13.1	(10.1–16.8)
	хламідіоз	28	6.6	(4.5–9.6)
	герпес	49	11.0	(8.3–14.5)
	папіломавірус	18	4.3	(2.7–6.9)
	туберкульоз	110	24.7	(20.7–29.1)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	252	81.2	(76.3–85.3)
	пролікувався неуспішно	27	8.5	(5.7–12.4)
	не завершив	28	8.4	(5.8–12.2)
	зараз лікується	5	1.2	(0.5–3.0)
	ніколи не лікувався	3	0.7	(0.2–2.2)
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	141	52.8	(46.3–59.2)
	пролікувався неуспішно	81	30.6	(24.9–37.0)
	не завершив	26	9.0	(6.1–13.1)
	зараз лікується	6	2.0	(0.9–4.5)
	ніколи не лікувався	17	5.6	(3.4–9.2)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	65	78.4	(67.2–86.5)
	пролікувався неуспішно	15	20.7	(12.7–32.0)
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	1	0.9	(0.1–6.1)
	ніколи не лікувався	0	0.0	
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	73	75.4	(65.5–83.1)
	пролікувався неуспішно	15	15.1	(9.0–24.2)
	не завершив	7	6.5	(3.1–13.3)
	зараз лікується	2	1.6	(0.4–6.2)
	ніколи не лікувався	1	1.4	(0.2–9.3)

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

	n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців			
так	185	40.7	(35.9–45.6)
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	120	26.0	(21.8–30.6)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	90	77.8	(69.1–84.6)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	8	6.6	(3.2–13.0)
приватна клініка	9	5.9	(3.0–11.3)
приватна лабораторія	8	7.5	(3.6–14.9)
протитуберкульозного диспансеру	2	1.9	(0.5–7.6)
наркологічний диспансер	0	0.0	
ІПСШ	5	3.5	(1.4–8.3)
швидкої допомоги	16	12.4	(7.5–19.7)
мобільна амбулаторія	1	0.7	(0.1–5.0)
інше	1	0.9	(0.1–6.1)
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	71	73.8	(63.9–81.8)
лікарня, ВІЛ-клініка	4	3.3	(1.1–9.1)
приватна клініка	7	5.6	(2.6–11.7)
приватна лабораторія	5	5.9	(2.3–14.3)
протитуберкульозний диспансер	1	0.8	(0.1–5.8)
наркологічна клініка	0	0.0	
ІПСШ клініка	3	2.4	(0.8–7.2)
швидка допомога	9	8.2	(4.2–15.3)
мобільна клініка	0	0.0	
інші	0	0.0	
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	100	90.8	(83.8–95.0)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	315	68.3	(63.6–72.6)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	36	10.9	(7.9–15.1)
раз на місяць	145	49.6	(43.5–55.7)
3-4 рази в 12 місяців	40	11.4	(8.2–15.4)
тільки один раз	88	28.1	(22.9–34.0)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	470	440	93.8 (91.2–95.7)	30	6.2 (4.3–8.8)	1.0000
Стать							
	чоловік	389	364	93.9 (91.0–95.9)	25	6.1 (4.1–9.0)	0.8867
	жінка	81	76	93.4 (84.7–97.3)	5	6.6 (2.7–15.3)	
Вікова категорія 4							
	<25	4	4	100.0	0	0.0	0.2114
	25-34	56	53	94.8 (84.6–98.4)	3	5.2 (1.6–15.4)	
	35-44	270	256	95.4 (92.2–97.3)	14	4.6 (2.7–7.8)	
	45+	140	127	90.2 (83.6–94.3)	13	9.8 (5.7–16.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	2	2	100.0	0	0.0	0.6449
	3-5	7	7	100.0	0	0.0	
	6-10	17	17	100.0	0	0.0	
	≥11	429	400	93.4 (90.6–95.4)	29	6.6 (4.6–9.4)	
Партнерський статус							

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	215	206	96.3 (92.9–98.1)	9	3.7 (1.9–7.1)	0.0395
живе з партнером	255	234	91.7 (87.5–94.6)	21	8.3 (5.4–12.5)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	60	58	96.4 (86.4–99.1)	2	3.6 (0.9–13.6)	0.3754
неповний робочий день або тимчасово	280	262	94.1 (90.6–96.3)	18	5.9 (3.7–9.4)	
безробітний	107	100	93.3 (86.3–96.9)	7	6.7 (3.1–13.7)	
інвалідність	20	18	88.0 (60.7–97.2)	2	12.0 (2.8–39.3)	
інші	3	2	70.1 (8.8–98.3)	1	29.9 (1.7–91.2)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	28	27	96.5 (77.8–99.6)	1	3.5 (0.4–22.2)	0.8026
3-10 тис	329	306	93.4 (90.1–95.6)	23	6.6 (4.4–9.9)	
10-20 тис	83	79	94.6 (86.0–98.0)	4	5.4 (2.0–14.0)	
≥20 тис	8	8	100.0	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	345	317	92.2 (88.8–94.6)	28	7.8 (5.4–11.2)	0.0705
так	43	43	100.0	0	0.0	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	361	334	92.9 (89.8–95.2)	27	7.1 (4.8–10.2)	0.1561
так	93	91	97.3 (89.7–99.4)	2	2.7 (0.6–10.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	383	354	92.8 (89.7–95.0)	29	7.2 (5.0–10.3)	0.1559
так	55	54	98.0 (86.8–99.7)	1	2.0 (0.3–13.2)	
Результат тесту на ВІЛ						

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	18	18	100.0	0	0.0	0.2854
негативний	452	422	93.6 (90.9–95.5)	30	6.4 (4.5–9.1)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	312	292	94.0 (90.8–96.2)	20	6.0 (3.8–9.2)	0.6328
стимулятори	20	20	100.0	0	0.0	
опі+стимул	134	124	92.0 (85.6–95.7)	10	8.0 (4.3–14.4)	
інші	4	4	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	429	400	93.5 (90.6–95.5)	29	6.5 (4.5–9.4)	0.6932
стимулятори	34	33	96.7 (78.7–99.6)	1	3.3 (0.4–21.3)	
інші	3	3	100.0	0	0.0	

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу депресії PHQ-9									
		N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	500	18	4.0 (2.3–6.9)	73	13.6 (10.8–17.0)	165	30.7 (26.6–35.0)	244	51.7 (47.0–56.5)	1.0000
Стать											
	чоловік	415	17	4.6 (2.6–8.0)	65	14.8 (11.6–18.7)	148	33.0 (28.4–37.9)	185	47.6 (42.4–52.9)	0.0005
	жінка	85	1	1.0 (0.1–7.1)	8	7.7 (3.7–15.3)	17	19.2 (12.0–29.4)	59	72.1 (61.2–80.8)	
Вікова категорія 4											
	<25	4	2	55.3 (4.5–97.0)	0	0.0	0	0.0	2	44.7 (3.0–95.5)	0.0003
	25-34	60	5	7.4 (3.0–17.2)	11	16.9 (9.1–29.3)	22	31.1 (20.3–44.5)	22	44.5 (30.6–59.4)	
	35-44	287	9	3.9 (1.7–8.9)	44	14.1 (10.5–18.7)	86	28.5 (23.4–34.3)	148	53.4 (47.2–59.5)	
	45+	149	2	1.3 (0.3–5.1)	18	11.6 (7.2–18.1)	57	35.4 (27.7–44.0)	72	51.7 (42.9–60.4)	

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	2	1	50.0 (0.0–100.0)	0	0.0	0	0.0	1	50.0 (0.0–100.0)	
3-5	7	3	44.3 (10.5–84.3)	0	0.0	0	0.0	4	55.7 (15.7–89.5)	
6-10	18	3	14.2 (4.1–38.8)	1	8.7 (1.1–45.6)	9	48.4 (25.1–72.4)	5	28.8 (11.3–56.2)	
≥11	456	9	2.5 (1.1–5.7)	66	13.3 (10.4–16.8)	154	31.6 (27.3–36.2)	227	52.6 (47.7–57.6)	
Партнерський статус										
живе сам	228	8	2.9 (1.4–5.8)	30	12.9 (9.0–18.1)	64	24.9 (19.6–31.0)	126	59.3 (52.5–65.8)	0.0246
живе з партнером	272	10	4.9 (2.3–10.1)	43	14.2 (10.5–19.0)	101	35.5 (29.7–41.8)	118	45.4 (38.9–52.0)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	61	5	8.7 (3.5–20.0)	13	21.2 (12.3–34.0)	19	28.6 (18.6–41.4)	24	41.5 (29.3–54.9)	0.1607
неповний робочий день або тимчасово	297	8	3.4 (1.4–8.2)	34	10.7 (7.6–14.8)	99	31.0 (25.8–36.8)	156	54.9 (48.7–61.0)	
безробітний	113	5	4.1 (1.7–9.6)	24	19.4 (13.0–28.0)	39	31.0 (22.9–40.4)	45	45.5 (35.6–55.9)	
інвалідність	22	0	0.0	1	2.6 (0.3–18.1)	6	29.2 (12.9–53.6)	15	68.2 (44.4–85.2)	
інші	6	0	0.0	1	22.8 (1.7–83.3)	2	33.8 (5.1–83.1)	3	43.4 (8.3–86.6)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	33	2	5.9 (1.4–21.8)	4	9.9 (3.4–25.5)	18	58.2 (40.2–74.3)	9	25.9 (13.4–44.1)	0.0006
3-10 тис	347	10	3.6 (1.6–7.6)	50	13.4 (10.2–17.5)	113	30.1 (25.3–35.4)	174	52.9 (47.1–58.6)	
10-20 тис	84	4	4.1 (1.5–10.8)	13	13.7 (7.8–22.8)	23	25.3 (17.0–35.9)	44	56.9 (45.7–67.4)	
≥20 тис	8	2	31.2 (5.6–77.6)	2	29.7 (5.1–76.9)	3	28.6 (6.4–70.3)	1	10.5 (0.9–60.2)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	362	12	3.0 (1.7–5.2)	46	11.3 (8.5–15.0)	94	24.0 (19.7–28.8)	210	61.7 (56.3–66.9)	0.0000

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	45	0	0.0	8	20.3 (10.2–36.4)	26	54.6 (39.1–69.2)	11	25.1 (14.0–40.9)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	18	4.0 (2.3–6.9)	73	13.6 (10.8–17.0)	165	30.7 (26.6–35.0)	244	51.7 (47.0–56.5)	1.0000
Стать										
чоловік	415	17	4.6 (2.6–8.0)	65	14.8 (11.6–18.7)	148	33.0 (28.4–37.9)	185	47.6 (42.4–52.9)	0.0005
жінка	85	1	1.0 (0.1–7.1)	8	7.7 (3.7–15.3)	17	19.2 (12.0–29.4)	59	72.1 (61.2–80.8)	
Вікова категорія 4										
<25	4	2	55.3 (4.5–97.0)	0	0.0	0	0.0	2	44.7 (3.0–95.5)	0.0003
25-34	60	5	7.4 (3.0–17.2)	11	16.9 (9.1–29.3)	22	31.1 (20.3–44.5)	22	44.5 (30.6–59.4)	
35-44	287	9	3.9 (1.7–8.9)	44	14.1 (10.5–18.7)	86	28.5 (23.4–34.3)	148	53.4 (47.2–59.5)	
45+	149	2	1.3 (0.3–5.1)	18	11.6 (7.2–18.1)	57	35.4 (27.7–44.0)	72	51.7 (42.9–60.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	2	1	50.0 (0.0–100.0)	0	0.0	0	0.0	1	50.0 (0.0–100.0)	
3-5	7	3	44.3 (10.5–84.3)	0	0.0	0	0.0	4	55.7 (15.7–89.5)	
6-10	18	3	14.2 (4.1–38.8)	1	8.7 (1.1–45.6)	9	48.4 (25.1–72.4)	5	28.8 (11.3–56.2)	
≥11	456	9	2.5 (1.1–5.7)	66	13.3 (10.4–16.8)	154	31.6 (27.3–36.2)	227	52.6 (47.7–57.6)	
Партнерський статус										
живе сам	228	8	2.9 (1.4–5.8)	30	12.9 (9.0–18.1)	64	24.9 (19.6–31.0)	126	59.3 (52.5–65.8)	0.0246

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе з партнером	272	10	4.9 (2.3–10.1)	43	14.2 (10.5–19.0)	101	35.5 (29.7–41.8)	118	45.4 (38.9–52.0)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	61	5	8.7 (3.5–20.0)	13	21.2 (12.3–34.0)	19	28.6 (18.6–41.4)	24	41.5 (29.3–54.9)	0.1607
неповний робочий день або тимчасово	297	8	3.4 (1.4–8.2)	34	10.7 (7.6–14.8)	99	31.0 (25.8–36.8)	156	54.9 (48.7–61.0)	
безробітний	113	5	4.1 (1.7–9.6)	24	19.4 (13.0–28.0)	39	31.0 (22.9–40.4)	45	45.5 (35.6–55.9)	
інвалідність	22	0	0.0	1	2.6 (0.3–18.1)	6	29.2 (12.9–53.6)	15	68.2 (44.4–85.2)	
інші	6	0	0.0	1	22.8 (1.7–83.3)	2	33.8 (5.1–83.1)	3	43.4 (8.3–86.6)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	33	2	5.9 (1.4–21.8)	4	9.9 (3.4–25.5)	18	58.2 (40.2–74.3)	9	25.9 (13.4–44.1)	0.0006
3-10 тис	347	10	3.6 (1.6–7.6)	50	13.4 (10.2–17.5)	113	30.1 (25.3–35.4)	174	52.9 (47.1–58.6)	
10-20 тис	84	4	4.1 (1.5–10.8)	13	13.7 (7.8–22.8)	23	25.3 (17.0–35.9)	44	56.9 (45.7–67.4)	
≥20 тис	8	2	31.2 (5.6–77.6)	2	29.7 (5.1–76.9)	3	28.6 (6.4–70.3)	1	10.5 (0.9–60.2)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	362	12	3.0 (1.7–5.2)	46	11.3 (8.5–15.0)	94	24.0 (19.7–28.8)	210	61.7 (56.3–66.9)	0.0000
так	45	0	0.0	8	20.3 (10.2–36.4)	26	54.6 (39.1–69.2)	11	25.1 (14.0–40.9)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	18	4.1 (2.4–7.0)	178	33.8 (29.6–38.3)	129	24.6 (20.8–28.9)	175	37.5 (32.9–42.3)	1.0000
Стать										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
чоловік	415	16	4.5 (2.5–7.9)	162	37.2 (32.4–42.3)	109	25.1 (20.9–29.8)	128	33.3 (28.5–38.5)	0.0002
жінка	85	2	2.3 (0.6–8.9)	16	17.0 (10.3–26.8)	20	22.2 (14.4–32.7)	47	58.5 (46.9–69.2)	
Вікова категорія 4										
<25	4	0	0.0	2	55.3 (4.5–97.0)	0	0.0	2	44.7 (3.0–95.5)	0.3577
25-34	60	4	6.0 (2.2–15.6)	25	37.4 (25.3–51.3)	12	17.5 (9.7–29.6)	19	39.1 (25.4–54.7)	
35-44	287	11	4.8 (2.3–9.8)	97	32.7 (27.3–38.7)	70	22.4 (17.9–27.8)	109	40.0 (34.1–46.2)	
45+	149	3	2.0 (0.6–6.1)	54	33.9 (26.3–42.4)	47	32.3 (24.4–41.3)	45	31.8 (23.9–41.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	2	0	0.0	1	50.0 (0.0–100.0)	0	0.0	1	50.0 (0.0–100.0)	0.9125
3-5	7	1	14.1 (1.1–70.1)	2	30.1 (5.0–77.9)	1	11.4 (0.9–64.7)	3	44.3 (10.5–84.3)	
6-10	18	1	5.3 (0.6–33.0)	7	35.7 (16.2–61.5)	5	30.2 (12.1–57.7)	5	28.8 (11.3–56.2)	
≥11	456	14	3.7 (1.9–6.9)	160	33.4 (29.0–38.1)	120	24.9 (20.9–29.4)	162	38.1 (33.2–43.1)	
Партнерський статус										
живе сам	228	8	3.1 (1.5–6.3)	76	31.8 (25.8–38.4)	43	15.5 (11.5–20.6)	101	49.5 (42.6–56.5)	0.0000
живе з партнером	272	10	4.9 (2.3–10.2)	102	35.5 (29.7–41.8)	86	32.2 (26.4–38.6)	74	27.4 (21.9–33.6)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	61	2	2.6 (0.6–10.2)	22	35.2 (23.8–48.5)	23	37.1 (25.5–50.4)	14	25.1 (15.2–38.4)	0.0359
неповний робочий день або тимчасово	297	9	3.9 (1.7–8.7)	100	31.7 (26.4–37.6)	66	20.8 (16.4–26.0)	122	43.5 (37.4–49.9)	

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	113	7	6.1 (2.9–12.6)	48	39.8 (30.7–49.7)	27	24.9 (16.6–35.5)	31	29.2 (20.9–39.2)	
інвалідність	22	0	0.0	4	19.9 (6.9–45.4)	10	43.7 (23.8–66.0)	8	36.4 (18.3–59.4)	
інші	6	0	0.0	4	69.9 (19.2–95.8)	2	30.1 (4.2–80.8)	0	0.0	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	33	2	5.9 (1.4–21.8)	12	38.3 (22.5–57.1)	13	37.6 (22.3–55.9)	6	18.2 (8.0–36.1)	0.0871
3-10 тис	347	14	4.7 (2.5–8.7)	125	34.3 (29.1–39.8)	79	22.0 (17.6–27.2)	129	39.0 (33.5–44.9)	
10-20 тис	84	1	0.9 (0.1–6.2)	26	27.8 (19.2–38.6)	26	29.7 (20.7–40.7)	31	41.5 (30.8–53.2)	
≥20 тис	8	0	0.0	4	52.2 (15.4–86.7)	4	47.8 (13.3–84.6)	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	362	9	2.4 (1.2–4.6)	103	26.1 (21.6–31.0)	84	22.4 (18.0–27.4)	166	49.2 (43.6–54.8)	0.0000
так	45	1	1.8 (0.2–12.3)	21	50.9 (35.8–65.8)	17	34.1 (21.5–49.5)	6	13.2 (5.8–27.1)	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	385	7	1.7 (0.8–3.6)	128	30.9 (26.3–35.9)	82	20.8 (16.7–25.5)	168	46.6 (41.3–52.0)	0.0000
так	96	11	14.7 (7.3–27.4)	42	43.9 (33.4–54.9)	38	37.2 (27.5–48.1)	5	4.2 (1.7–9.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	407	8	1.9 (0.9–3.7)	132	31.2 (26.7–36.1)	99	23.4 (19.2–28.1)	168	43.6 (38.4–48.8)	0.0000
так	56	10	23.7 (11.6–42.3)	27	44.5 (30.7–59.1)	16	27.1 (16.6–41.1)	3	4.7 (1.5–14.1)	
Результат тесту на ВІЛ										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	21	0	0.0	8	34.0 (16.4–57.6)	6	30.9 (13.1–57.0)	7	35.1 (16.6–59.4)	0.7803
негативний	479	18	4.3 (2.5–7.3)	170	33.8 (29.5–38.4)	123	24.3 (20.5–28.7)	168	37.6 (32.9–42.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	330	10	3.0 (1.6–5.6)	113	32.8 (27.7–38.3)	72	19.7 (15.8–24.4)	135	44.5 (38.8–50.3)	0.0000
стимулятори	20	0	0.0	8	38.7 (18.6–63.7)	9	50.3 (26.8–73.7)	3	10.9 (3.1–31.7)	
опі+стимул	146	6	3.8 (1.7–8.6)	57	37.1 (29.1–45.9)	46	32.2 (24.3–41.3)	37	26.8 (19.3–36.0)	
інші	4	2	72.6 (7.2–98.9)	0	0.0	2	27.4 (1.1–92.8)	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	458	14	3.0 (1.7–5.0)	166	34.4 (30.0–39.2)	109	22.9 (19.0–27.2)	169	39.8 (34.9–44.8)	0.0119
стимулятори	34	1	3.3 (0.4–21.3)	11	32.7 (18.2–51.6)	16	46.2 (29.0–64.4)	6	17.8 (7.2–37.6)	
інші	3	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	39	7.0	(5.1–9.6)
збут наркотиків	37	6.6	(4.7–9.0)
зберігання наркотиків	60	10.3	(8.0–13.2)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	36	6.6	(4.7–9.2)
збут наркотиків	32	5.3	(3.8–7.6)
зберігання наркотиків	49	8.0	(6.0–10.6)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	246	56.3	(51.3–61.2)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	45	9.9	(7.3–13.1)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	6	18.5	(8.5–35.9)
6м-2р	1	2.0	(0.3–13.0)
2-4р	14	40.8	(25.8–57.8)
4 роки +	16	38.7	(24.5–55.1)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	3	8.0	(2.6–22.2)
1-3р	11	30.6	(17.7–47.5)
3-5р	9	19.3	(10.0–34.0)
5-10р	10	22.5	(12.2–37.6)

	n	%	ДІ
10 років +	7	19.6	(9.6–36.1)
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	34	93.1	(80.3–97.8)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	89	15.7	(12.8–19.2)
так, за останні 6м	203	39.8	(35.3–44.6)
так, але 6+ місяців тому	204	44.4	(39.7–49.3)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	104	21.2	(17.6–25.3)
так, за останні 6м	165	32.1	(27.9–36.7)
так, але 6+ місяців тому	197	46.7	(41.8–51.7)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	141	28.2	(24.1–32.6)
так, за останні 6м	112	23.5	(19.7–27.8)
так, але 6+ місяців тому	204	48.3	(43.4–53.3)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	222	54.3	(49.2–59.2)
так	215	45.7	(40.8–50.8)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	129	27.3	(23.2–31.9)
так	319	72.7	(68.1–76.8)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
ні	58	15.7	(12.1–20.2)
так	258	84.3	(79.8–87.9)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців			

	n	%	ДІ
ні	126	25.3	(21.4–29.6)
так	343	74.7	(70.4–78.6)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

		Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	437	215	45.7 (40.8–50.8)	1.0000	316	258	84.3 (79.8–87.9)	1.0000
Стать									
	чоловік	354	186	49.0 (43.4–54.6)	0.0065	253	208	84.8 (79.8–88.7)	0.6159
	жінка	83	29	31.7 (22.2–43.0)		63	50	82.2 (70.6–89.9)	
Вікова категорія 4									
	<25	4	2	59.0 (5.3–97.3)	0.9053	3	1	28.8 (0.8–95.5)	0.0523
	25-34	52	27	45.9 (31.4–61.1)		39	31	80.9 (64.8–90.8)	
	35-44	253	119	44.5 (38.2–51.0)		194	163	86.2 (80.6–90.4)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
45+	128	67	47.7 (38.2–57.3)		80	63	83.4 (73.8–89.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	2	1	50.0 (0.0–100.0)	0.7272	2	1	50.0 (0.0–100.0)	0.0971
3-5	7	2	30.1 (5.0–77.9)		4	3	64.7 (9.8–96.9)	
6-10	16	9	56.3 (29.9–79.5)		15	10	64.4 (35.2–85.7)	
≥11	398	197	45.8 (40.6–51.1)		285	234	85.1 (80.5–88.7)	
Партнерський статус								
живе сам	203	84	37.1 (30.4–44.2)	0.0015	166	145	89.7 (84.4–93.3)	0.0047
живе з партнером	234	131	53.3 (46.3–60.2)		150	113	78.2 (70.6–84.3)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	60	39	63.5 (50.0–75.2)	0.0505	48	32	67.4 (52.3–79.6)	0.0006
неповний робочий день або тимчасово	257	113	41.3 (35.1–47.9)		192	167	88.8 (83.5–92.6)	
безробітний	96	51	47.0 (36.4–57.9)		59	47	84.8 (74.0–91.6)	
інвалідність	19	9	49.2 (26.5–72.1)		13	10	76.8 (43.5–93.4)	
інші	4	2	37.7 (4.4–88.9)		3	1	30.9 (1.9–91.3)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	28	22	76.8 (56.0–89.6)	0.0028	20	10	52.2 (30.0–73.5)	0.0000
3-10 тис	295	138	43.6 (37.6–49.8)		211	181	88.1 (83.1–91.8)	
10-20 тис	81	39	43.8 (33.0–55.3)		62	52	85.1 (73.9–92.0)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
≥20 тис	8	6	80.4 (36.4–96.7)		7	1	11.6 (1.0–63.4)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	337	136	36.3 (31.1–41.9)	0.0000	252	205	84.3 (79.3–88.2)	0.5327
так	41	28	71.0 (55.0–83.0)		27	21	79.7 (60.2–91.0)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	345	148	39.2 (33.9–44.7)	0.0000	257	213	85.4 (80.7–89.2)	0.1649
так	77	59	75.4 (63.6–84.4)		53	40	77.3 (62.9–87.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	366	162	41.3 (36.1–46.7)	0.0003	268	223	85.1 (80.3–88.9)	0.0291
так	46	33	70.6 (55.1–82.4)		31	19	69.0 (49.6–83.5)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	20	7	31.1 (14.1–55.4)	0.1846	16	12	75.8 (47.6–91.5)	0.3500
негативний	417	208	46.4 (41.3–51.6)		300	246	84.7 (80.1–88.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	300	140	44.0 (38.1–50.0)	0.7747	231	191	84.5 (79.2–88.7)	0.5867
стимулятори	19	10	49.3 (25.4–73.5)		9	6	66.9 (28.7–91.0)	
опі+стимул	116	64	49.6 (39.5–59.8)		74	59	84.5 (75.0–90.9)	
інші	2	1	50.0 (1.1–98.9)		2	2	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	400	197	45.6 (40.5–50.9)	0.9894	300	246	84.6 (80.1–88.3)	0.2400
стимулятори	32	15	45.7 (28.1–64.4)		11	8	67.1 (32.7–89.6)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
інші	2	1	40.6 (0.2–99.7)		2	1	68.4 (0.5–99.9)	

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	72	14.6	(11.6–18.2)
так, з інших причин	34	7.6	(5.4–10.8)
ні	370	77.8	(73.6–81.5)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	24	28.7	(19.6–40.1)
інша країна	9	12.4	(6.3–22.9)
інша область	9	10.2	(5.3–18.7)
інше місто	10	13.3	(7.2–23.3)
інший район	7	9.4	(4.5–18.8)
інший будинок	21	26.0	(17.3–37.0)
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			
та сама область	53	83.3	(72.8–90.3)
інша область	10	12.5	(6.7–22.1)
інша країна	3	4.3	(1.4–12.6)



Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)



Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)

Результати для міста: Київ




Рис. А. Мережа рекрутингу RDS у місті Київ

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	500	39.6	(38.9–40.4)	40	(36–44)
Вік першого неін'єкційного вживання наркотиків	479	16.4	(15.9–16.9)	15	(14–18)
Років з початку неін'єкційного вживання наркотиків	479	23.3	(22.4–24.2)	24	(20–28)
Вік першого ін'єкційного вживання наркотиків	496	20.4	(19.8–21.1)	19	(16–23)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків	496	19.2	(18.2–20.2)	21	(12–25)
Особистий місячний дохід, грн	473	10,233.3	(9169.5–11297.1)	9,000	(4600–15000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

	Сайт	n	%	ДІ
Стать				
чоловік	Київ	424	85.4	(80.9–88.9)
жінка	Київ	76	14.6	(11.1–19.1)
Вікова категорія 4				
<25	Київ	8	3.2	(1.4–7.1)
25-34	Київ	69	14.3	(11.0–18.4)
35-44	Київ	310	62.0	(56.5–67.2)
45+	Київ	113	20.5	(16.6–25.0)
Сімейний стан				
одружений або проживають разом	Київ	85	14.6	(11.4–18.4)
одружений, але має іншого партнера	Київ	13	3.8	(1.8–7.6)
не одружений, але є партнер	Київ	161	32.0	(27.0–37.5)
одружений, але не живуть разом	Київ	41	6.6	(4.6–9.4)
не одружений та не мають партнера	Київ	200	43.1	(37.5–48.8)
Партнерський статус				
живе сам	Київ	241	49.7	(44.0–55.3)
живе з партнером	Київ	259	50.3	(44.7–56.0)
Освіта 3 категорії				
незак. середня школа	Київ	57	11.8	(8.6–16.1)
середня школа	Київ	222	46.6	(41.0–52.3)
> середня школа	Київ	221	41.6	(36.2–47.2)
Поточна професія				
учень школи	Київ	0	0.0	
студент коледжу/університету	Київ	0	0.0	
постійна робота	Київ	90	17.1	(13.3–21.7)
непостійна робота	Київ	273	54.9	(49.2–60.5)
безробітний	Київ	104	20.7	(16.1–26.1)
домогосподарка	Київ	5	1.1	(0.4–3.3)
інвалідність	Київ	15	3.6	(1.8–7.2)
військовий	Київ	1	0.2	(0.0–1.5)
інші	Київ	11	2.3	(1.2–4.5)
Безхатченко				
ніколи	Київ	382	76.9	(72.1–81.1)

	Сайт	n	%	ДІ
так, 12м+ тому	Київ	102	20.3	(16.3–24.9)
так, за останні 12м	Київ	16	2.9	(1.7–4.9)
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Київ	102	87.6	(79.5–92.8)
так	Київ	16	12.4	(7.2–20.5)
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Київ	67	14.0	(10.2–18.8)
3-10 тис	Київ	179	37.7	(32.3–43.4)
10-20 тис	Київ	180	38.5	(33.0–44.4)
≥20 тис	Київ	47	9.8	(7.0–13.5)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Київ	65	13.5	(9.8–18.3)
≥2684	Київ	408	86.5	(81.7–90.2)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Київ	12	3.1	(1.7–5.8)
3-5	Київ	19	5.4	(3.1–9.3)
6-10	Київ	41	9.5	(6.8–13.2)
≥11	Київ	424	81.9	(77.0–85.9)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Сайт	n	%	ДІ
власне житло	Київ	284	56.4	(50.8–61.8)
у друзів або родичів	Київ	131	25.8	(21.3–30.8)
оренда	Київ	70	15.5	(11.9–19.9)
різне	Київ	19	3.4	(2.0–5.9)
на вулиці (безхатько)	Київ	18	3.1	(1.8–5.1)
у притулку для біженців	Київ	3	0.6	(0.2–1.9)




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

			Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	500	445	86.2 (81.6–89.8)	20	5.4 (3.3–8.7)	27	5.8 (3.8–8.7)	8	2.6 (1.0–6.7)	1.0000
Стать											
	чоловік	424	377	85.5 (80.2–89.5)	17	5.8 (3.5–9.7)	23	5.9 (3.8–9.2)	7	2.8 (1.0–7.6)	0.7031

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
жінка	76	68	90.5 (80.3–95.7)	3	2.7 (0.8–8.6)	4	5.0 (1.6–14.5)	1	1.9 (0.3–12.5)	
Вікова категорія 4										
<25	8	6	83.1 (37.3–97.6)	0	0.0	2	16.9 (2.4–62.7)	0	0.0	0.0424
25-34	69	52	73.4 (59.5–83.9)	4	6.4 (2.3–16.4)	11	17.8 (9.3–31.4)	2	2.4 (0.5–11.5)	
35-44	310	281	87.5 (81.1–91.9)	13	5.3 (2.8–9.8)	12	4.0 (2.1–7.3)	4	3.3 (1.0–10.2)	
45+	113	106	91.7 (81.6–96.5)	3	5.7 (1.8–17.0)	2	1.3 (0.3–5.1)	2	1.3 (0.3–5.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	12	9	73.6 (36.9–93.0)	1	5.9 (0.6–39.1)	1	11.7 (1.3–57.6)	1	8.8 (0.9–49.8)	0.0228
3-5	19	14	75.8 (47.7–91.5)	3	14.1 (3.8–41.0)	2	10.1 (2.0–38.0)	0	0.0	
6-10	41	30	73.6 (55.3–86.2)	2	5.8 (1.3–22.4)	9	20.6 (9.7–38.5)	0	0.0	
≥11	424	390	89.1 (83.9–92.7)	14	4.8 (2.6–8.6)	14	3.4 (1.9–6.1)	6	2.7 (0.9–7.9)	
Партнерський статус										
живе сам	241	218	88.7 (82.4–92.9)	10	5.1 (2.4–10.5)	10	5.5 (2.8–10.5)	3	0.7 (0.2–2.4)	0.1474
живе з партнером	259	227	83.7 (76.4–89.1)	10	5.7 (2.9–10.6)	17	6.1 (3.6–10.2)	5	4.6 (1.6–12.6)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	90	80	91.3 (82.7–95.9)	3	3.1 (0.7–12.1)	5	4.0 (1.5–10.4)	2	1.6 (0.4–6.8)	0.6916
неповний робочий день або тимчасово	273	243	82.9 (75.4–88.4)	13	7.1 (3.9–12.7)	13	6.3 (3.5–11.2)	4	3.7 (1.1–11.5)	
безробітний	104	91	88.4 (79.6–93.7)	4	4.6 (1.6–12.4)	8	6.6 (3.1–13.7)	1	0.3 (0.0–2.5)	

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
інвалідність	15	14	92.4 (54.8–99.2)	0	0.0	1	7.6 (0.8–45.2)	0	0.0	
інші	17	16	92.6 (57.9–99.1)	0	0.0	0	0.0	1	7.4 (0.9–42.1)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	67	58	81.9 (61.4–92.8)	3	3.9 (1.2–12.2)	3	4.6 (1.2–15.8)	3	9.6 (1.9–37.1)	0.2251
3-10 тис	179	159	85.8 (77.9–91.2)	5	4.5 (1.7–11.2)	12	8.2 (4.4–14.9)	3	1.5 (0.4–5.1)	
10-20 тис	180	162	87.5 (79.6–92.6)	10	7.5 (3.7–14.7)	7	3.5 (1.6–7.9)	1	1.5 (0.2–9.7)	
≥20 тис	47	41	86.0 (71.1–93.9)	2	4.9 (1.1–18.5)	3	6.2 (1.9–18.3)	1	2.9 (0.4–18.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	274	234	81.5 (74.4–87.0)	16	7.7 (4.5–13.0)	20	8.1 (5.0–12.9)	4	2.7 (0.6–10.8)	0.0858
так	225	210	91.9 (86.0–95.5)	4	2.5 (0.8–7.5)	7	3.0 (1.3–6.7)	4	2.6 (0.9–7.8)	

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	320	279	85.5 (79.8–89.8)	15	6.1 (3.5–10.3)	19	5.0 (3.0–8.3)	7	3.4 (1.3–8.6)	0.0229
так	174	163	90.8 (82.7–95.3)	3	1.2 (0.4–3.9)	7	7.7 (3.5–16.0)	1	0.3 (0.0–2.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	262	221	84.0 (78.1–88.6)	15	6.4 (3.7–10.7)	20	6.4 (4.0–10.0)	6	3.2 (1.2–8.5)	0.0365
так	231	217	93.2 (87.6–96.3)	5	2.0 (0.8–4.8)	7	4.1 (1.6–9.9)	2	0.7 (0.2–2.9)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	102	93	86.6 (74.5–93.5)	4	7.7 (2.7–20.2)	4	5.2 (1.8–14.1)	1	0.5 (0.1–3.6)	0.4692

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
негативний	398	352	86.1 (80.9–90.1)	16	4.9 (2.8–8.4)	23	5.9 (3.7–9.3)	7	3.1 (1.2–8.0)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	470	437	92.3 (88.7–94.8)	7	1.3 (0.5–3.2)	21	5.2 (3.2–8.3)	5	1.2 (0.4–3.7)	0.0000
стимулятори	20	4	27.2 (9.3–57.6)	11	59.0 (32.9–80.9)	5	13.8 (4.7–34.0)	0	0.0	
інші	7	3	22.4 (3.4–70.4)	1	11.5 (0.8–68.3)	1	9.2 (0.6–62.3)	2	56.9 (11.6–93.0)	

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
	n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
Частота ін'єкцій: останні 24 години									
0 разів	41	11.1	4	25.3	3	11.0	3	37.7	0.2908
1 раз	226	55.3	11	54.3	12	47.1	3	56.2	
2-3 рази	156	29.4	5	20.4	12	41.9	2	6.1	
4+ рази	22	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
N	445		20		27		8		
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)									
1 раз	226	62.2	11	72.8	12	52.9	3	90.3	0.5913
2-3 рази	156	33.1	5	27.2	12	47.1	2	9.7	
4+ рази	22	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
N	404		16		24		5		
Частота ін'єкцій: останній тиждень									
0 разів	3	1.0	0	0.0	0	0.0	2	30.8	0.0000
1-6 разів	125	36.0	11	63.8	9	38.8	3	52.8	
кожен день	317	63.0	9	36.2	18	61.2	3	16.4	
N	445		20		27		8		
Частота ін'єкцій: останні 30 днів									
1-9 разів	85	20.2	6	29.2	5	21.2	4	37.3	0.2880
10-19 разів	58	16.6	5	32.1	5	19.5	1	45.3	
20-29 разів	67	19.4	3	9.7	7	26.0	1	5.8	
кожен день	235	43.9	6	29.0	10	33.3	1	11.5	
N	445		20		27		7		
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів									
0-9 разів	30	8.5	5	33.9	0	0.0	3	37.7	0.0048
10-19 разів	61	17.6	4	29.3	6	26.3	1	40.6	
20-29 разів	69	18.7	2	3.4	4	18.8	1	5.2	
кожен день	280	55.2	7	33.3	16	54.9	3	16.4	
N	440		18		26		8		

Таблиця 2.4. Ін'єкційний вид наркотику на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	63	13.6	2	4.8	1	45.3
3-10 тис	171	38.9	6	32.2	1	9.2
10-20 тис	170	38.9	8	44.3	2	18.2
≥20 тис	39	8.6	4	18.7	3	27.3
N	443		20		7	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
Разом		опіоїди		стимулятори		інші		
n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
готую сам								
172	32.3	164	32.4	5	23.0	3	61.1	0.2607
приготовлене друзями								
20	5.8	18	5.9	1	4.3	1	6.6	0.9367
від дилера								
139	34.4	123	32.4	11	61.4	2	23.1	0.0454
куплене в Інтернеті								
51	13.6	47	13.5	3	17.8	1	9.2	0.8082
з аптеки								
153	24.7	151	26.9	2	5.5	0	0.0	0.0689
з програми ЗПТ								
30	3.3	30	3.7	0	0.0	0	0.0	0.6350
інше								
10	2.2	10	2.4	0	0.0	0	0.0	0.7472
N								
575		543		22		7		




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін’єкції використовував чистий шприц			
так	482	96.1	(93.3–97.7)
Джерело шприца для останньої ін’єкції			
купив в аптеці	432	88.8	(85.4–91.5)
отримав в аптеці	4	0.8	(0.3–2.5)
отримав від НУО	52	8.0	(5.8–10.9)
отримав від друга	2	0.3	(0.1–1.4)
отримав вживаний від друга	3	0.6	(0.2–2.1)
використовував вживаний свій	5	1.4	(0.6–3.4)
отримав заповнений	0	0.0	
інші	1	0.1	(0.0–0.4)
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	77	13.5	(10.4–17.4)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	47	9.2	(6.6–12.7)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	95	16.4	(12.9–20.5)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	85	15.7	(12.3–19.8)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	198	33.5	(28.6–38.7)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	32	5.8	(3.9–8.6)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	176	30.9	(26.3–36.0)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	8	10.6	(4.6–22.4)
часто	4	4.5	(1.5–13.1)
половина	7	10.8	(4.3–24.3)
іноді	8	14.8	(6.9–29.1)
рідко	20	27.1	(17.0–40.1)
ніколи	27	32.2	(21.2–45.8)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	61	14.2	(10.5–19.0)
часто	36	8.0	(5.2–12.1)
половина	61	12.3	(9.1–16.3)
іноді	67	13.6	(10.3–17.7)
рідко	83	17.6	(13.5–22.5)
ніколи	160	34.3	(28.9–40.2)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			
1-9	116	61.4	(52.7–69.5)
10-29	55	30.1	(22.8–38.6)

	n	%	ДІ
30+	17	8.5	(4.7–14.8)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	31	15.5	(10.2–23.0)
2-3	87	49.3	(40.4–58.2)
4-9	37	21.7	(15.2–29.9)
10+	25	13.5	(8.6–20.5)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	16	36.5	(21.9–54.2)
від друзів	19	49.1	(32.5–65.9)
із закладки	8	14.4	(6.4–29.3)
Хтось використав один шприц для ін'єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	432	88.4	(84.7–91.3)
так	61	11.6	(8.7–15.3)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін'єкцій (%)




Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	500	77	13.5 (10.4–17.4)	1.0000	496	47	9.2 (6.6–12.7)	1.0000
Стать								
чоловік	424	59	12.4 (9.2–16.4)	0.1322	421	40	9.1 (6.4–12.7)	0.8420
жінка	76	18	20.1 (11.2–33.3)		75	7	10.0 (3.9–23.4)	
Вікова категорія 4								
<25	8	1	11.4 (0.9–63.5)	0.5040	8	1	6.8 (0.5–49.5)	0.9804
25-34	69	11	14.3 (7.5–25.5)		69	8	10.4 (4.8–21.1)	
35-44	310	54	15.2 (11.0–20.6)		307	29	9.1 (6.0–13.6)	
45+	113	11	8.3 (4.2–15.7)		112	9	9.2 (4.1–19.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	12	0	0.0	0.0426	12	0	0.0	0.6662
3-5	19	7	34.6 (13.6–64.0)		19	2	7.4 (1.4–30.7)	
6-10	41	7	14.2 (6.0–30.1)		41	7	11.2 (4.9–23.9)	
≥11	424	62	12.5 (9.3–16.5)		420	38	9.5 (6.6–13.6)	
Партнерський статус								

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	241	38	14.5 (10.1–20.4)	0.5704	238	27	10.5 (6.8–15.8)	0.4106
живе з партнером	259	39	12.5 (8.6–18.0)		258	20	8.0 (4.8–13.0)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	90	10	7.6 (3.7–15.3)	0.2322	90	5	5.7 (2.1–14.8)	0.6651
неповний робочий день або тимчасово	273	48	16.2 (11.8–21.8)		270	31	10.7 (7.1–15.6)	
безробітний	104	14	10.1 (5.1–18.7)		104	7	7.4 (2.9–17.6)	
інвалідність	15	2	10.1 (1.6–43.0)		15	2	15.2 (3.0–51.0)	
інші	17	3	24.8 (6.6–60.5)		16	2	9.0 (1.9–33.8)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	67	9	9.4 (4.0–20.5)	0.4156	67	5	9.3 (3.6–22.3)	0.5568
3-10 тис	179	31	17.4 (11.9–24.8)		178	19	10.3 (6.1–16.9)	
10-20 тис	180	30	12.9 (8.1–19.8)		178	20	10.4 (6.2–16.9)	
≥20 тис	47	5	10.8 (4.2–25.0)		46	2	3.1 (0.7–12.4)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	274	44	14.0 (9.9–19.6)	0.7458	272	25	10.0 (6.4–15.3)	0.5579
так	225	33	12.9 (8.7–18.7)		223	22	8.3 (5.1–13.2)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	320	45	12.3 (8.9–16.8)	0.3712	319	32	9.5 (6.5–13.8)	0.7583
так	174	30	15.6 (10.2–23.3)		172	15	8.5 (4.6–15.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	262	41	13.6 (9.9–18.5)	0.6420	260	28	9.5 (6.4–13.9)	0.6131
так	231	33	12.1 (8.2–17.6)		229	18	8.0 (4.7–13.5)	
Результат тесту на ВІЛ								

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	102	16	15.2 (8.8–25.0)	0.6400	102	9	11.1 (5.1–22.4)	0.5762
негативний	398	61	13.2 (9.8–17.5)		394	38	8.8 (6.1–12.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	445	59	11.2 (8.3–15.1)	0.0150	441	38	8.7 (6.0–12.5)	0.4431
стимулятори	20	7	29.2 (12.0–55.5)		20	3	11.8 (3.1–36.0)	
опі+стимул	27	9	31.1 (15.3–52.9)		27	6	18.2 (7.1–39.6)	
інші	8	2	17.3 (2.3–64.7)		8	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	470	69	12.8 (9.6–16.7)	0.5469	466	44	8.9 (6.4–12.4)	0.8392
стимулятори	20	5	20.8 (7.7–45.2)		20	2	12.9 (2.8–43.8)	
інші	7	2	18.2 (2.1–69.2)		7	1	11.5 (0.8–68.3)	

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	498	95	16.4 (12.9–20.5)	1.0000	498	85	15.7 (12.3–19.8)	1.0000
Стать									
	чоловік	422	82	16.1 (12.5–20.6)	0.7763	423	69	14.8 (11.3–19.1)	0.2566
	жінка	76	13	17.8 (9.3–31.1)		75	16	21.1 (11.7–35.0)	
Вікова категорія 4									
	<25	8	2	12.4 (1.8–51.6)	0.2605	8	2	12.4 (1.8–51.6)	0.4836
	25-34	69	18	25.6 (15.4–39.4)		69	14	21.4 (12.3–34.5)	
	35-44	308	59	15.1 (11.1–20.3)		309	56	15.9 (11.7–21.3)	
	45+	113	16	14.4 (8.0–24.3)		112	13	11.5 (6.0–21.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків									
	≤2	12	1	5.9 (0.6–39.1)	0.4569	12	0	0.0	0.2143

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	19	3	9.8 (2.6–30.7)		19	2	5.8 (1.2–24.0)	
6-10	41	9	14.4 (6.9–27.8)		41	8	16.3 (7.7–31.4)	
≥11	422	82	17.6 (13.6–22.5)		422	75	17.0 (13.1–21.8)	
Партнерський статус								
живе сам	240	49	15.9 (11.4–21.7)	0.8088	240	41	15.1 (10.7–21.0)	0.7730
живе з партнером	258	46	16.8 (12.0–23.2)		258	44	16.2 (11.5–22.4)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	90	18	19.6 (11.2–32.1)	0.7695	90	17	19.2 (11.1–31.1)	0.4666
неповний робочий день або тимчасово	272	53	16.8 (12.3–22.5)		272	51	16.9 (12.4–22.6)	
безробітний	104	21	15.5 (8.9–25.5)		104	13	10.0 (4.9–19.3)	
інвалідність	15	1	7.6 (0.8–45.2)		15	3	22.9 (5.9–58.5)	
інші	16	2	9.8 (2.1–35.9)		16	1	7.7 (0.9–43.4)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	67	11	15.1 (7.7–27.5)	0.7054	67	8	11.3 (5.1–23.0)	0.0420
3-10 тис	178	29	14.1 (9.1–21.2)		179	28	16.4 (10.9–23.9)	
10-20 тис	179	40	18.2 (12.5–25.9)		180	42	19.9 (13.9–27.7)	
≥20 тис	47	11	20.8 (10.0–38.3)		45	3	2.8 (0.8–9.5)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	273	55	18.7 (13.7–24.9)	0.1774	274	45	16.5 (11.8–22.5)	0.6554
так	224	40	13.6 (9.4–19.2)		223	40	14.8 (10.3–20.7)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	320	62	16.7 (12.6–21.7)	0.7676	318	50	14.7 (10.8–19.6)	0.3374

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
так	173	31	15.5 (10.1–22.9)		174	33	18.6 (12.5–26.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	261	49	16.3 (12.1–21.5)	0.8363	260	46	15.7 (11.6–20.9)	0.9926
так	230	45	17.0 (12.3–23.1)		231	38	15.7 (11.1–21.9)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	102	21	22.8 (14.2–34.6)	0.1190	102	23	26.0 (16.7–38.1)	0.0112
негативний	396	74	15.0 (11.4–19.4)		396	62	13.4 (10.1–17.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	443	75	14.7 (11.3–19.0)	0.0127	443	69	14.1 (10.7–18.3)	0.0689
стимулятори	20	7	31.4 (12.7–59.0)		20	7	33.4 (13.9–60.9)	
опі+стимул	27	12	33.5 (17.2–55.1)		27	9	29.8 (14.3–51.7)	
інші	8	1	2.7 (0.2–28.0)		8	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	468	87	15.7 (12.2–19.8)	0.1081	468	79	15.1 (11.8–19.2)	0.5796
стимулятори	20	7	31.9 (13.2–59.1)		20	4	24.4 (8.2–53.8)	
інші	7	1	6.6 (0.4–53.4)		7	2	18.2 (2.1–69.2)	

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	482	96.4	(93.9–98.0)	69	89.8	(76.2–96.1)	413	97.6	(95.3–98.8)	0.0080
N	499			76			423			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	412	87.5	(83.4–90.8)	58	81.5	(61.1–92.5)	354	88.5	(84.7–91.5)	0.2980
N	481			69			412			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	275	62.5	(56.8–67.9)	43	65.3	(48.3–79.1)	232	62.1	(55.9–67.8)	0.7103
N	477			69			408			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	250	90.7	(85.6–94.2)	43	100.0		207	89.2	(83.2–93.2)	0.0657

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
N	274			43			231			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	43	17.3	(12.4–23.7)	1	6.4	(0.9–34.3)	42	19.1	(13.6–26.2)	0.2078
N	272			42			230			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	2	0.6	(0.2–2.4)	0	0.0		2	0.7	(0.2–2.8)	0.5648
N	271			43			228			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	2	0.9	(0.2–3.8)	1	1.8	(0.2–12.4)	1	0.7	(0.1–5.0)	0.4948
N	273			43			230			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										
так	182	39.5	(33.8–45.5)	19	21.9	(12.5–35.5)	163	42.2	(35.9–48.8)	0.0071
N	439			62			377			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	170	41.7	(35.6–48.0)	17	24.4	(14.0–39.0)	153	44.1	(37.4–51.1)	0.0140
N	393			55			338			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	108	37.7	(30.8–45.1)	10	15.8	(7.5–30.2)	98	41.2	(33.4–49.4)	0.0022
N	272			42			230			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	27	4.7	(3.0–7.2)	11	11.1	(5.5–21.2)	16	3.7	(2.1–6.3)	0.0097
N	482			69			413			
Надавав секс-послуги за гроші										

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
так	17	3.8	(2.2–6.4)	7	10.1	(4.3–21.8)	10	2.8	(1.4–5.6)	0.0145
N	480			68			412			
Платив за секс коли-небудь										
так	78	15.9	(12.4–20.2)	3	5.9	(1.3–22.4)	75	17.4	(13.5–22.2)	0.1020
N	479			68			411			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	20	22.0	(13.6–33.4)	1	20.7	(1.7–79.4)	19	22.0	(13.5–33.8)	0.9537
N	77			3			74			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	351	79.6	(74.4–83.9)	60	94.9	(82.0–98.7)	291	77.3	(71.6–82.2)	0.0005
випадковий	82	18.7	(14.5–23.8)	1	0.5	(0.1–3.8)	81	21.4	(16.6–27.1)	
ком. секс (я заплатив)	6	1.5	(0.6–3.6)	1	3.2	(0.4–19.9)	5	1.2	(0.5–3.4)	
ком. секс (мені заплатили)	1	0.2	(0.0–1.3)	1	1.4	(0.2–9.5)	0	0.0		
N	440			63			377			
З ким останнім був секс										
чоловік	60	12.2	(9.0–16.3)	59	95.0	(85.1–98.5)	1	0.3	(0.0–2.5)	
жінка	380	86.7	(82.5–90.0)	1	1.6	(0.2–11.1)	379	98.8	(96.4–99.6)	
men and women	4	1.1	(0.4–3.1)	2	3.3	(0.8–13.0)	2	0.8	(0.2–3.2)	
N	444			62			382			
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	429	96.8	(94.2–98.3)	61	96.3	(81.9–99.3)	368	96.9	(94.1–98.4)	0.8475
N	441			63			378			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	67	15.6	(11.9–20.1)	9	16.2	(7.9–30.1)	58	15.5	(11.6–20.4)	0.9082
N	441			63			378			
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	108	24.1	(19.6–29.3)	14	21.5	(11.9–35.7)	94	24.5	(19.6–30.2)	0.6560
N	441			63			378			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	250	90.7	(85.6–94.2)	43	100.0		207	89.2	(83.2–93.2)	0.0657
N	274			43			231			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	43	17.3	(12.4–23.7)	1	6.4	(0.9–34.3)	42	19.1	(13.6–26.2)	0.2078
N	272			42			230			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	2	0.6	(0.2–2.4)	0	0.0		2	0.7	(0.2–2.8)	0.5648
N	271			43			228			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	2	0.9	(0.2–3.8)	1	1.8	(0.2–12.4)	1	0.7	(0.1–5.0)	0.4948
N	273			43			230			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні										

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
1	176	92.1	(86.2–95.7)	29	90.7	(73.2–97.2)	147	92.4	(85.6–96.2)	0.8220
2-4	13	7.2	(3.8–13.0)	3	9.3	(2.8–26.8)	10	6.8	(3.3–13.4)	
5+	1	0.7	(0.1–4.7)	0	0.0		1	0.8	(0.1–5.6)	
N	190			32			158			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові										
1	15	50.8	(30.7–70.6)	0	0.0		15	50.8	(30.7–70.6)	
2-4	14	46.3	(27.1–66.7)	0	0.0		14	46.3	(27.1–66.7)	
5+	1	2.9	(0.4–18.3)	0	0.0		1	2.9	(0.4–18.3)	
N	30			0			30			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: комерційний (мені платили)										
1	1	69.8	(12.5–97.4)	0	0.0		1	100.0		
2-4	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
5+	1	30.2	(2.6–87.5)	1	100.0		0	0.0		
N	2			1			1			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього										
1	168	82.9	(75.5–88.4)	29	93.0	(74.3–98.4)	139	81.1	(72.7–87.4)	0.3342
2-4	26	14.3	(9.3–21.5)	2	7.0	(1.6–25.7)	24	15.6	(9.9–23.7)	
5+	5	2.8	(1.1–7.0)	0	0.0		5	3.3	(1.3–8.2)	
N	199			31			168			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	439	257	60.5 (54.5–66.2)	182	39.5 (33.8–45.5)	1.0000
Стать							
	чоловік	377	214	57.8 (51.2–64.1)	163	42.2 (35.9–48.8)	0.0071
	жінка	62	43	78.1 (64.5–87.5)	19	21.9 (12.5–35.5)	
Вікова категорія 4							
	<25	6	4	70.6 (19.7–95.9)	2	29.4 (4.1–80.3)	0.6522
	25-34	64	38	58.9 (44.2–72.1)	26	41.1 (27.9–55.8)	
	35-44	270	151	58.3 (50.2–66.0)	119	41.7 (34.0–49.8)	
	45+	99	64	67.0 (55.3–77.0)	35	33.0 (23.0–44.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	11	4	36.0 (11.4–71.2)	7	64.0 (28.8–88.6)	0.3316
	3-5	17	7	48.1 (19.4–78.1)	10	51.9 (21.9–80.6)	
	6-10	35	20	56.8 (37.4–74.2)	15	43.2 (25.8–62.6)	
	≥11	373	224	62.6 (55.9–68.8)	149	37.4 (31.2–44.1)	
Партнерський статус							

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	196	90	47.2 (38.0–56.5)	106	52.8 (43.5–62.0)	0.0000
живе з партнером	243	167	71.9 (64.6–78.2)	76	28.1 (21.8–35.4)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	81	46	62.1 (48.2–74.2)	35	37.9 (25.8–51.8)	0.9979
неповний робочий день або тимчасово	233	134	60.5 (52.6–67.8)	99	39.5 (32.2–47.4)	
безробітний	95	60	60.4 (44.9–74.1)	35	39.6 (25.9–55.1)	
інвалідність	14	7	58.6 (23.1–87.0)	7	41.4 (13.0–76.9)	
інші	16	10	56.7 (28.6–81.0)	6	43.3 (19.0–71.4)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	59	34	60.1 (42.9–75.1)	25	39.9 (24.9–57.1)	0.4515
3-10 тис	151	83	55.4 (44.9–65.4)	68	44.6 (34.6–55.1)	
10-20 тис	162	101	66.1 (56.4–74.7)	61	33.9 (25.3–43.6)	
≥20 тис	43	24	57.1 (39.6–73.0)	19	42.9 (27.0–60.4)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	240	132	56.1 (48.2–63.8)	108	43.9 (36.2–51.8)	0.1170
так	199	125	65.7 (56.3–74.1)	74	34.3 (25.9–43.7)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	283	165	60.8 (53.4–67.7)	118	39.2 (32.3–46.6)	0.8796
так	150	88	59.8 (50.1–68.9)	62	40.2 (31.1–49.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	226	136	61.2 (53.6–68.3)	90	38.8 (31.7–46.4)	0.8484
так	206	119	60.2 (52.4–67.5)	87	39.8 (32.5–47.6)	
Результат тесту на ВІЛ						

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	87	43	45.0 (32.7–57.9)	44	55.0 (42.1–67.3)	0.0105
негативний	352	214	63.5 (56.8–69.8)	138	36.5 (30.2–43.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	389	228	60.3 (53.8–66.5)	161	39.7 (33.5–46.2)	0.3897
стимулятори	18	10	56.6 (29.5–80.3)	8	43.4 (19.7–70.5)	
опі+стимул	25	13	53.9 (31.8–74.6)	12	46.1 (25.4–68.2)	
інші	7	6	88.9 (34.4–99.2)	1	11.1 (0.8–65.6)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	412	242	60.3 (54.0–66.2)	170	39.7 (33.8–46.0)	0.8802
стимулятори	18	12	66.1 (37.9–86.2)	6	33.9 (13.8–62.1)	
інші	7	2	54.5 (10.1–92.7)	5	45.5 (7.3–89.9)	

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										
так	96	37.8	(30.5–45.7)	9	14.0	(6.4–27.8)	87	42.4	(34.0–51.3)	0.0006
N	248			43			205			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	26	51.9	(34.6–68.7)	2	100.0		24	48.4	(31.3–65.8)	0.1793
N	44			2			42			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	2	63.1	(19.9–92.2)	0	0.0		2	63.1	(19.9–92.2)	
N	5			0			5			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (мені заплатили) партнер										
так	1	83.6	(24.0–98.8)	0	0.0		1	83.6	(24.0–98.8)	
N	2			0			2			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	57	20.3	(15.1–26.7)	6	10.1	(3.9–24.0)	51	22.2	(16.3–29.6)	0.1150
часто	19	8.6	(5.0–14.4)	5	9.5	(3.2–24.9)	14	8.4	(4.5–15.2)	
половина	14	5.8	(3.3–10.1)	0	0.0		14	7.0	(4.0–12.0)	
іноді	14	6.5	(3.0–13.5)	2	3.2	(0.7–13.4)	12	7.1	(3.1–15.5)	
рідко	17	9.0	(5.3–14.8)	2	6.6	(1.6–23.5)	15	9.5	(5.4–16.1)	
ніколи	117	49.8	(41.9–57.7)	26	70.5	(52.9–83.5)	91	45.8	(37.2–54.7)	
N	238			41			197			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	18	32.1	(18.7–49.1)	1	22.4	(1.7–82.9)	17	32.8	(18.9–50.5)	0.0101

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
часто	3	8.7	(2.3–27.9)	1	77.6	(17.1–98.3)	2	3.6	(0.7–16.4)	
половина	6	7.6	(2.9–18.1)	0	0.0		6	8.1	(3.2–19.4)	
іноді	1	3.5	(0.5–21.4)	0	0.0		1	3.8	(0.5–22.7)	
рідко	4	14.2	(5.3–33.1)	0	0.0		4	15.3	(5.7–35.0)	
ніколи	12	33.9	(19.2–52.7)	0	0.0		12	36.4	(20.8–55.5)	
N	44			2			42			
Частота використання презервативів: комерційний (я заплатив) партнер										
завжди	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
часто	1	6.6	(0.8–38.6)	0	0.0		1	6.6	(0.8–38.7)	
половина	2	26.7	(5.1–71.2)	0	0.0		2	26.7	(5.1–71.2)	
іноді	1	33.5	(5.4–81.8)	0	0.0		1	33.5	(5.4–81.8)	
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	2	33.2	(7.4–75.6)	0	0.0		2	33.2	(7.4–75.6)	
N	6			0			6			
Частота використання презервативів: комерційний (мені заплатили) партнер										
завжди	1	19.4	(2.2–71.7)	1	100.0		0	0.0		
часто	1	8.8	(1.0–49.2)	0	0.0		1	10.9	(1.1–58.3)	
половина	1	26.9	(3.3–79.9)	0	0.0		1	33.4	(3.6–86.9)	
іноді	1	44.9	(7.4–89.2)	0	0.0		1	55.7	(9.2–93.9)	
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	4			1			3			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

		Результат тесту на ВІЛ					
		N	позитивний		негативний		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	102	17.9 (14.3–22.2)	398	82.1 (77.8–85.7)	1.0000
Стать							
	чоловік	424	82	17.4 (13.6–22.1)	342	82.6 (77.9–86.4)	0.5240
	жінка	76	20	20.9 (12.2–33.6)	56	79.1 (66.4–87.8)	
Вікова категорія 4							
	<25	8	1	11.4 (0.9–63.5)	7	88.6 (36.5–99.1)	0.0348
	25-34	69	5	8.0 (2.9–20.1)	64	92.0 (79.9–97.1)	
	35-44	310	63	17.0 (12.6–22.4)	247	83.0 (77.6–87.4)	
	45+	113	33	28.9 (19.9–39.9)	80	71.1 (60.1–80.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	12	0	0.0	12	100.0	0.0179
	3-5	19	1	1.3 (0.1–10.7)	18	98.7 (89.3–99.9)	
	6-10	41	4	10.4 (3.5–27.1)	37	89.6 (72.9–96.5)	
	≥11	424	97	20.8 (16.5–25.8)	327	79.2 (74.2–83.5)	
Партнерський статус							

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	241	50	20.4 (14.8–27.4)	191	79.6 (72.6–85.2)	0.2139
живе з партнером	259	52	15.5 (11.3–20.9)	207	84.5 (79.1–88.7)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	90	16	16.3 (9.2–27.2)	74	83.7 (72.8–90.8)	0.9814
неповний робочий день або тимчасово	273	52	18.2 (13.4–24.4)	221	81.8 (75.6–86.6)	
безробітний	104	26	18.7 (11.3–29.3)	78	81.3 (70.7–88.7)	
інвалідність	15	5	21.5 (6.2–53.4)	10	78.5 (46.6–93.8)	
інші	17	3	14.7 (4.1–40.9)	14	85.3 (59.1–95.9)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	67	16	15.0 (8.0–26.4)	51	85.0 (73.6–92.0)	0.2393
3-10 тис	179	42	22.0 (15.6–30.1)	137	78.0 (69.9–84.4)	
10-20 тис	180	27	14.4 (9.2–21.8)	153	85.6 (78.2–90.8)	
≥20 тис	47	6	11.7 (4.8–25.7)	41	88.3 (74.3–95.2)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	274	49	15.7 (11.3–21.3)	225	84.3 (78.7–88.7)	0.2101
так	225	53	20.8 (15.1–27.9)	172	79.2 (72.1–84.9)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	320	61	15.8 (11.8–20.8)	259	84.2 (79.2–88.2)	0.0333
так	174	40	25.1 (18.0–34.0)	134	74.9 (66.0–82.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	262	48	16.5 (12.3–21.9)	214	83.5 (78.1–87.7)	0.1271
так	231	52	22.6 (16.9–29.6)	179	77.4 (70.4–83.1)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	445	93	18.0 (14.2–22.6)	352	82.0 (77.4–85.8)	0.4692

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
стимулятори	20	4	25.8 (8.7–55.8)	16	74.2 (44.2–91.3)	
опі+стимул	27	4	16.1 (5.4–39.2)	23	83.9 (60.8–94.6)	
інші	8	1	3.4 (0.2–33.1)	7	96.6 (66.9–99.8)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	470	97	18.1 (14.4–22.6)	373	81.9 (77.4–85.6)	0.6755
стимулятори	20	3	18.7 (5.4–47.9)	17	81.3 (52.1–94.6)	
інші	7	1	6.6 (0.4–53.4)	6	93.4 (46.6–99.6)	




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)




Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)




Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
		N	ні	так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	494	320	77.2 (73.0–81.0)	174	22.8 (19.0–27.0)	1.0000
Стать							
	чоловік	418	281	79.1 (74.6–82.9)	137	20.9 (17.1–25.4)	0.0384
	жінка	76	39	66.6 (53.1–77.8)	37	33.4 (22.2–46.9)	

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	8	8	100.0	0	0.0	0.2741
25-34	69	49	78.0 (65.6–86.9)	20	22.0 (13.1–34.4)	
35-44	304	194	77.6 (72.0–82.3)	110	22.4 (17.7–28.0)	
45+	113	69	72.1 (62.4–80.2)	44	27.9 (19.8–37.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	12	12	100.0	0	0.0	0.0093
3-5	19	18	98.3 (86.9–99.8)	1	1.7 (0.2–13.1)	
6-10	40	31	81.4 (64.7–91.3)	9	18.6 (8.7–35.3)	
≥11	419	256	74.4 (69.5–78.8)	163	25.6 (21.2–30.5)	
Партнерський статус						
живе сам	237	149	76.7 (70.3–82.0)	88	23.3 (18.0–29.7)	0.7842
живе з партнером	257	171	77.8 (71.8–82.8)	86	22.2 (17.2–28.2)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	90	63	85.0 (77.1–90.6)	27	15.0 (9.4–22.9)	0.4073
неповний робочий день або тимчасово	270	172	74.8 (68.7–80.0)	98	25.2 (20.0–31.3)	
безробітний	102	65	78.5 (68.2–86.1)	37	21.5 (13.9–31.8)	
інвалідність	15	8	68.3 (33.9–90.0)	7	31.7 (10.0–66.1)	
інші	16	11	78.2 (49.7–92.9)	5	21.8 (7.1–50.3)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	67	39	69.7 (55.0–81.3)	28	30.3 (18.7–45.0)	0.3746
3-10 тис	176	113	75.8 (68.4–82.0)	63	24.2 (18.0–31.6)	
10-20 тис	178	120	80.8 (73.9–86.2)	58	19.2 (13.8–26.1)	
≥20 тис	47	31	79.1 (64.0–88.9)	16	20.9 (11.1–36.0)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	268	181	78.5 (72.7–83.4)	87	21.5 (16.6–27.3)	0.5240
так	225	139	75.9 (69.3–81.5)	86	24.1 (18.5–30.7)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	259	226	88.5 (83.9–91.9)	33	11.5 (8.1–16.1)	0.0000
так	228	89	37.8 (30.8–45.3)	139	62.2 (54.7–69.2)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	101	61	68.0 (56.8–77.5)	40	32.0 (22.5–43.2)	0.0333
негативний	393	259	79.2 (74.7–83.2)	134	20.8 (16.8–25.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	442	279	76.2 (71.6–80.2)	163	23.8 (19.8–28.4)	0.0229
стимулятори	18	15	94.4 (81.0–98.5)	3	5.6 (1.5–19.0)	
опі+стимул	26	19	69.0 (44.9–85.8)	7	31.0 (14.2–55.1)	
інші	8	7	97.3 (72.0–99.8)	1	2.7 (0.2–28.0)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	464	292	75.3 (70.7–79.4)	172	24.7 (20.6–29.3)	0.0980
стимулятори	20	18	94.2 (74.0–99.0)	2	5.8 (1.0–26.0)	
інші	7	7	100.0	0	0.0	




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	91.1	90.4	94.2	0.2186
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	30.4	28.9	37.4	0.1715

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
невиявлений = непередаваний	42.6	38.5	61.2	0.0007
ПКП знижує ризик	43.9	40.2	61.0	0.0020
АРТ слід починати негайно	75.5	72.8	88.2	0.0033
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	47.8	46.6	53.5	0.3070
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	53.6	53.1	56.3	0.6339
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	90.0	89.8	91.1	0.7128
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	62.0	61.9	62.4	0.9373
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	82.0	81.4	84.6	0.5491
лікування слід починати негайно	85.1	87.2	75.3	0.0175
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	64.1	63.8	65.2	0.8241
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	16.6	16.5	16.7	0.9679
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	86.5	87.8	80.5	0.1424
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	50.2	52.6	39.4	0.0462
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	56.4	55.6	60.1	0.5030
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	10.1	9.2	14.2	0.2532
лікування слід починати негайно	83.7	83.3	85.6	0.6389
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	55.9	54.6	62.0	0.2687
ВГС на 100% передається від матері до дитини	12.5	11.5	17.2	0.2167
ВГС передається через кров і статевим шляхом	87.9	87.3	90.3	0.5135
лікування ВГС не існує	45.8	44.0	54.0	0.1383
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	69.5	66.5	83.0	0.0055
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	56.7	55.4	63.0	0.2532

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	402	79.3	(73.8–83.9)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	448	86.9	(82.0–90.6)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	214	51.8	(45.3–58.1)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	149	33.9	(28.0–40.2)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	433	98.8	(97.4–99.4)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	427	98.8	(96.7–99.6)
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	80	15.5	(12.0–19.8)
негативний	357	84.5	(80.2–88.0)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	242	57.9	(51.4–64.0)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	6	1.7	(0.7–4.1)
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	169	73.1	(65.3–79.7)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	29	12.2	(7.9–18.5)
негативний	136	86.4	(80.0–91.0)
не може розкрити	3	1.3	(0.4–4.5)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	393	179	48.2 (41.9–54.7)	214	51.8 (45.3–58.1)	1.0000
Стать							
	чоловік	334	150	47.4 (40.5–54.3)	184	52.6 (45.7–59.5)	0.5490
	жінка	59	29	53.0 (36.1–69.2)	30	47.0 (30.8–63.9)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	3	1	28.8 (2.1–88.6)	2	71.2 (11.4–97.9)	0.1588
25-34	49	28	58.4 (41.3–73.6)	21	41.6 (26.4–58.7)	
35-44	254	104	44.0 (36.0–52.3)	150	56.0 (47.7–64.0)	
45+	87	46	57.2 (44.9–68.7)	41	42.8 (31.3–55.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	9	6	58.4 (20.7–88.3)	3	41.6 (11.7–79.3)	0.6441
3-5	9	5	54.1 (20.7–84.2)	4	45.9 (15.8–79.3)	
6-10	25	15	59.2 (35.5–79.3)	10	40.8 (20.7–64.5)	
≥11	349	152	46.4 (39.6–53.3)	197	53.6 (46.7–60.4)	
Партнерський статус						
живе сам	186	74	43.6 (34.5–53.1)	112	56.4 (46.9–65.5)	0.1688
живе з партнером	207	105	52.6 (43.8–61.3)	102	47.4 (38.7–56.2)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	76	34	49.7 (35.1–64.4)	42	50.3 (35.6–64.9)	0.7780
неповний робочий день або тимчасово	213	96	45.5 (37.4–53.8)	117	54.5 (46.2–62.6)	
безробітний	79	36	55.9 (40.1–70.6)	43	44.1 (29.4–59.9)	
інвалідність	12	7	40.3 (11.9–77.1)	5	59.7 (22.9–88.1)	
інші	13	6	53.5 (23.8–80.9)	7	46.5 (19.1–76.2)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	52	21	42.6 (25.7–61.5)	31	57.4 (38.5–74.3)	0.8016
3-10 тис	141	64	52.3 (41.9–62.4)	77	47.7 (37.6–58.1)	
10-20 тис	148	75	47.4 (37.2–57.9)	73	52.6 (42.1–62.8)	
≥20 тис	35	13	47.8 (29.4–66.9)	22	52.2 (33.1–70.6)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	209	102	52.2 (43.6–60.6)	107	47.8 (39.4–56.4)	0.2221
так	183	77	44.1 (34.8–53.8)	106	55.9 (46.2–65.2)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	242	120	50.3 (42.4–58.3)	122	49.7 (41.7–57.6)	0.1968
так	147	58	42.0 (32.5–52.0)	89	58.0 (48.0–67.5)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	190	106	52.9 (44.7–61.1)	84	47.1 (38.9–55.3)	0.0010
так	201	72	34.1 (27.1–41.8)	129	65.9 (58.2–72.9)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	82	45	53.4 (40.2–66.2)	37	46.6 (33.8–59.8)	0.4131
негативний	311	134	47.2 (40.0–54.4)	177	52.8 (45.6–60.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	359	159	47.2 (40.6–53.9)	200	52.8 (46.1–59.4)	0.1564
стимулятори	9	6	87.7 (60.2–97.1)	3	12.3 (2.9–39.8)	
опі+стимул	18	11	55.5 (28.7–79.4)	7	44.5 (20.6–71.3)	
інші	7	3	31.3 (4.1–82.9)	4	68.7 (17.1–95.9)	
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	373	167	48.2 (41.7–54.8)	206	51.8 (45.2–58.3)	0.7764
стимулятори	11	7	56.4 (22.1–85.5)	4	43.6 (14.5–77.9)	
інші	7	4	36.5 (5.9–84.0)	3	63.5 (16.0–94.1)	

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	102	61.9 (49.7–72.8)	1.0000	67	68.7 (54.0–80.5)	1.0000	50	36	65.7 (48.1–79.9)	1.0000
Стать											
	чоловік	82	60.3 (46.7–72.5)	0.5096	52	65.6 (49.1–79.1)	0.3442	37	26	63.6 (43.8–79.6)	0.6496
	жінка	20	69.8 (42.5–87.8)		15	81.7 (45.2–96.0)		13	10	73.0 (32.1–93.9)	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4										
<25	1	100.0	0.4289	1	100.0	0.6095	1	1	100.0	0.4286
25-34	5	62.2 (16.4–93.2)		3	61.6 (10.8–95.5)		2	1	20.3 (1.5–81.1)	
35-44	63	53.7 (38.8–68.0)		36	75.5 (53.6–89.1)		29	22	68.7 (44.9–85.5)	
45+	33	74.2 (48.2–89.9)		27	58.6 (36.7–77.5)		18	12	63.8 (35.7–84.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
3-5	1	100.0		1	100.0		1	0	0.0	
6-10	4	64.9 (17.0–94.3)		2	57.0 (7.0–95.9)		1	1	100.0	
≥11	97	61.6 (49.0–72.8)		64	69.2 (54.0–81.1)		48	35	64.6 (46.6–79.3)	
Партнерський статус										
живе сам	50	61.7 (44.0–76.7)	0.9624	32	65.1 (44.0–81.6)	0.5424	23	19	75.9 (50.0–90.8)	0.1860
живе з партнером	52	62.2 (45.8–76.3)		35	73.3 (52.7–87.1)		27	17	54.1 (31.7–75.0)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	16	40.7 (17.8–68.4)	0.3617	8	45.5 (14.2–80.8)	0.5772	5	3	52.1 (14.5–87.4)	0.4887
неповний робочий день або тимчасово	52	70.2 (52.4–83.4)		37	70.5 (51.0–84.6)		27	17	58.6 (36.1–78.0)	
безробітний	26	58.7 (33.9–79.7)		17	73.1 (40.8–91.5)		14	12	80.4 (39.3–96.3)	
інвалідність	5	44.4 (9.1–86.4)		3	100.0		3	3	100.0	
інші	3	66.3 (12.8–96.4)		2	49.1 (4.6–95.1)		1	1	100.0	
Категорія місячного доходу										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	16	68.2 (37.6–88.4)	0.0101	11	91.4 (55.6–98.9)	0.1983	10	9	95.9 (73.3–99.5)	0.0195
3-10 тис	42	77.8 (58.2–89.8)		33	77.4 (57.0–89.9)		26	15	53.3 (31.1–74.3)	
10-20 тис	27	34.7 (17.9–56.5)		12	50.9 (21.9–79.3)		8	8	100.0	
≥20 тис	6	48.1 (13.6–84.5)		3	51.9 (7.8–93.2)		1	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	49	63.1 (45.4–77.8)	0.8504	34	54.4 (34.1–73.3)	0.0236	24	19	65.6 (37.7–85.8)	0.9932
так	53	60.8 (43.8–75.6)		33	82.5 (65.7–92.0)		26	17	65.8 (42.9–83.1)	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	61	52.2 (37.3–66.7)	0.0026	34	67.1 (46.1–83.0)	0.7846	26	18	70.7 (47.1–86.7)	0.5005
так	40	85.0 (68.4–93.7)		33	70.8 (49.8–85.6)		24	18	59.6 (34.2–80.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	48	56.8 (41.3–71.0)	0.0501	28	60.1 (40.4–76.9)	0.0318	17	9	54.9 (30.8–76.9)	0.1428
так	52	76.5 (62.2–86.5)		38	84.5 (68.3–93.3)		32	26	79.4 (53.3–92.9)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	102	61.9 (49.6–72.9)		67	68.7 (53.8–80.5)		50	36	65.7 (47.9–80.0)	
негативний	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
опіоїди	93	63.8 (51.1–74.9)	0.4833	62	72.5 (57.3–83.9)	0.1562	48	35	68.5 (50.7–82.1)	
стимулятори	4	34.7 (5.3–83.4)		2	0.0		0	0	0.0	
опі+стимул	4	67.0 (19.1–94.6)		2	56.1 (6.5–95.9)		1	0	0.0	
інші	1	100.0		1	100.0		1	1	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	97	63.6 (51.1–74.5)	0.5628	65	72.9 (58.2–83.9)		50	36	65.7 (48.1–79.9)	
стимулятори	3	54.0 (8.2–93.9)		2	0.0		0	0	0.0	
інші	1	0.0		0	0.0		0	0	0.0	

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	3	6.2	(1.6–20.9)
1-2 тижні тому	2	1.9	(0.4–8.1)
3-4 тижні тому	2	5.4	(1.3–19.4)
1-3 місяці тому	9	21.6	(10.2–40.0)
ніколи	34	64.9	(47.5–79.1)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	9	55.7	(29.3–79.2)
ліків не було	6	25.3	(8.7–54.6)
був під впливом	2	15.9	(3.8–47.3)
не хотів, щоб інші бачили	0	0.0	
інші	1	3.2	(0.4–20.2)
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	9	45.0	(23.2–69.0)
відсутність часу на відвідування клініки	6	26.5	(11.2–50.6)
відсутність мотивації відвідувати клініку	8	37.0	(17.6–61.7)
пропуск візиту, важко повернутися	6	31.9	(14.2–56.9)
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	5	31.3	(13.4–57.1)
вживання наркотиків	7	35.3	(16.4–60.4)
побічні ефекти або ускладнення	5	31.8	(13.4–58.3)
немає розуміння як	3	18.3	(5.7–45.2)
втрачено або продано всі АРВ-препарати	4	24.0	(9.0–50.2)
Причини відмови від ДРТ			
вживання алкоголю	5	29.8	(12.5–55.6)
Причини відмови від АРТ			
довго чекав і пішов	4	23.3	(8.5–49.9)

	n	%	ДІ
Час на АРТ			
≤3м	4	26.1	(10.1–52.7)
4-24м	7	30.6	(13.5–55.6)
25-60м	5	22.2	(7.1–51.8)
5 років +	7	21.1	(8.3–44.0)

9. Доконтактна профілактика



Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців						
		N	приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Всього								
	Разом	498	10	2.7 (1.4–5.3)	52	9.8 (6.9–13.9)	436	87.5 (83.1–90.8)
Стать								
	чоловік	422	9	2.6 (1.3–5.1)	43	9.9 (6.6–14.4)	370	87.6 (82.8–91.2)
	жінка	76	1	3.7 (0.5–22.4)	9	9.6 (4.4–19.8)	66	86.7 (73.5–93.9)
Вікова категорія 4								
	<25	8	0	0.0	1	5.5 (0.4–43.9)	7	94.5 (56.1–99.6)
	25-34	69	0	0.0	3	3.0 (0.8–10.3)	66	97.0 (89.7–99.2)
	35-44	308	6	2.9 (1.2–6.8)	33	11.0 (6.9–17.1)	269	86.1 (79.7–90.7)
	45+	113	4	4.4 (1.5–12.3)	15	11.7 (6.5–20.2)	94	83.9 (74.4–90.3)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
	≤2	12	0	0.0	0	0.0	12	100.0
	3-5	19	1	10.0 (1.2–50.1)	4	10.8 (3.2–30.8)	14	79.2 (49.3–93.7)
	6-10	41	1	2.9 (0.4–18.9)	5	11.6 (3.7–31.0)	35	85.5 (66.4–94.6)
	≥11	422	8	2.4 (1.1–4.9)	43	10.0 (6.7–14.7)	371	87.6 (82.8–91.3)
Партнерський статус								
	живе сам	240	7	3.9 (1.8–8.1)	27	9.6 (6.0–14.9)	206	86.5 (80.5–90.9)
	живе з партнером	258	3	1.6 (0.4–6.3)	25	10.1 (5.8–16.8)	230	88.4 (81.4–93.0)
Поточний статус зайнятості								

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців					
	N	приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
повний робочий день	89	0	0.0	9	7.9 (3.6–16.6)	80	92.1 (83.4–96.4)
неповний робочий день або тимчасово	272	8	3.5 (1.7–7.2)	32	13.2 (8.5–20.0)	232	83.3 (76.4–88.5)
безробітний	104	1	1.3 (0.2–9.1)	10	5.7 (2.8–11.4)	93	92.9 (86.3–96.5)
інвалідність	15	0	0.0	0	0.0	15	100.0
інші	17	1	14.7 (1.9–60.8)	1	1.6 (0.2–13.0)	15	83.7 (40.7–97.5)
Категорія місячного доходу							
<3 тис	67	0	0.0	8	15.1 (5.1–36.7)	59	84.9 (63.3–94.9)
3-10 тис	178	5	3.6 (1.5–8.7)	17	9.7 (5.6–16.3)	156	86.6 (79.4–91.6)
10-20 тис	179	2	1.7 (0.3–8.9)	18	8.2 (4.5–14.7)	159	90.1 (82.9–94.4)
≥20 тис	47	2	6.6 (1.6–23.8)	3	4.2 (1.0–16.5)	42	89.2 (73.1–96.1)
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	273	3	2.1 (0.7–6.7)	28	10.6 (6.4–17.1)	242	87.3 (80.4–92.0)
так	224	7	3.5 (1.6–7.5)	24	8.9 (5.5–14.0)	193	87.7 (81.9–91.8)

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців					
	N	приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	318	6	2.3 (0.9–5.4)	28	8.7 (5.3–13.8)	284	89.1 (83.7–92.8)
так	174	4	4.4 (1.5–11.8)	23	13.9 (8.7–21.3)	147	81.8 (73.3–88.0)
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	261	8	3.0 (1.4–6.2)	23	9.4 (5.9–14.7)	230	87.6 (82.0–91.6)
так	230	1	1.6 (0.2–10.5)	29	11.7 (8.0–16.8)	200	86.7 (80.7–91.1)
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	102	7	9.3 (4.3–19.1)	13	10.2 (5.5–18.1)	82	80.5 (70.1–87.9)
негативний	396	3	1.3 (0.4–4.3)	39	9.7 (6.4–14.5)	354	89.0 (84.0–92.6)
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
опіоїди	444	9	2.7 (1.3–5.6)	43	8.4 (5.8–11.9)	392	88.9 (84.9–91.9)
стимулятори	19	1	6.9 (0.8–39.2)	3	13.8 (2.8–46.8)	15	79.3 (48.3–94.0)
опі+стимул	27	0	0.0	5	13.5 (4.8–32.6)	22	86.5 (67.4–95.2)

	N	Використання ДКП протягом останніх 12 місяців					
		приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
інші	8	0	0.0	1	40.6 (4.8–90.2)	7	59.4 (9.8–95.2)
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання							
опіоїди	468	9	2.6 (1.3–5.3)	50	9.0 (6.5–12.5)	409	88.4 (84.5–91.4)
стимулятори	20	1	5.8 (0.7–34.7)	1	8.6 (1.1–45.0)	18	85.7 (54.4–96.8)
інші	7	0	0.0	1	45.3 (5.5–92.2)	6	54.7 (7.8–94.5)

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	10	2.7	(1.4–5.3)
приймав в минулому	0	0.0	
ніколи не приймав	52	9.8	(6.9–13.9)
не знає що це	436	87.5	(83.1–90.8)
Обізнаність про ДКП			
ні	436	87.1	(82.8–90.5)
так	64	12.9	(9.5–17.2)
Використання ДКП зараз			
ні	488	97.3	(94.7–98.6)
так	10	2.7	(1.4–5.3)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	52	78.3	(62.4–88.7)
так	10	21.7	(11.3–37.6)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)




Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)




Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	6	13.6	(5.4–30.3)
клініка закрита після лютого 2022 року	3	18.8	(5.7–47.2)
слабкий або відсутній ефект	3	14.5	(4.5–38.0)
побічні ефекти	1	4.0	(0.6–23.8)
не хочу відвідувати клініку	5	18.3	(7.1–39.8)
не хочу кидати наркотики	3	6.2	(1.5–21.7)
важко дістатися до клініки	2	3.3	(0.8–12.7)
не потребує	4	16.2	(5.6–38.8)
не подобається ставлення лікаря	1	5.0	(0.7–28.4)
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	7	32.5	(15.5–55.8)
не змінилось	14	58.3	(36.5–77.3)

	n	%	ДІ
зменшилося	7	9.2	(3.9–20.0)
Чи купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	331	65.4	(59.7–70.6)
так, бупренорфін	7	1.4	(0.6–3.3)
не купував	151	33.2	(28.0–38.8)
Де купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	151	33.8	(28.5–39.5)
купляв на чорн. ринку	253	52.2	(46.4–57.9)
купляв в приватній клініці	75	14.1	(10.6–18.5)
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорн.ринку			
ін'єкційно	292	87.4	(82.0–91.4)
ін'єкційно у суміші	20	4.6	(2.8–7.5)
ковтав або розсмоктував	23	7.2	(4.1–12.4)
нюхав	2	0.8	(0.2–3.4)

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	493	231	22.1 (18.8–25.9)	20	5.1 (3.2–8.0)	58	17.3 (13.0–22.6)	184	55.5 (49.9–60.9)	1.0000
Стать										
чоловік	417	194	21.6 (18.1–25.6)	15	4.5 (2.7–7.5)	50	17.1 (12.6–22.6)	158	56.9 (50.9–62.7)	0.5473
жінка	76	37	25.4 (16.4–37.1)	5	8.5 (3.0–21.8)	8	18.9 (8.1–38.0)	26	47.3 (33.0–62.0)	
Вікова категорія 4										
<25	8	1	5.5 (0.4–43.9)	0	0.0	4	38.1 (8.6–80.1)	3	56.4 (16.0–89.7)	0.5460
25-34	68	26	21.1 (12.8–32.7)	1	1.5 (0.2–10.5)	8	14.1 (6.9–26.5)	33	63.3 (49.7–75.0)	
35-44	306	153	22.5 (18.3–27.3)	13	5.9 (3.3–10.2)	33	17.9 (12.1–25.6)	107	53.8 (46.3–61.1)	
45+	111	51	24.5 (17.6–33.0)	6	6.0 (2.6–13.3)	13	14.6 (8.4–24.3)	41	54.9 (44.0–65.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	12	1	2.3 (0.2–19.3)	0	0.0	0	0.0	11	97.7 (80.7–99.8)	0.0056
3-5	18	2	3.0 (0.6–13.8)	1	4.1 (0.5–28.0)	2	9.9 (1.9–38.2)	13	83.0 (57.0–94.7)	

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
6-10	40	10	13.4 (6.0–27.1)	0	0.0	8	19.5 (9.3–36.3)	22	67.1 (49.8–80.8)	
≥11	419	218	25.4 (21.4–29.8)	19	6.0 (3.7–9.5)	47	18.2 (13.3–24.4)	135	50.4 (44.1–56.7)	
Партнерський статус										
живе сам	239	112	22.1 (17.4–27.6)	10	5.3 (2.8–9.9)	29	19.0 (12.7–27.4)	88	53.6 (45.4–61.5)	0.8340
живе з партнером	254	119	22.2 (17.6–27.5)	10	4.9 (2.5–9.4)	29	15.6 (10.4–22.8)	96	57.3 (49.6–64.7)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	90	43	21.5 (14.7–30.3)	5	7.5 (3.0–17.6)	8	10.7 (5.1–20.8)	34	60.3 (47.7–71.6)	0.1688
неповний робочий день або тимчасово	268	121	22.1 (17.7–27.2)	12	6.1 (3.3–10.8)	35	16.3 (11.7–22.3)	100	55.5 (48.3–62.4)	
безробітний	102	57	26.3 (18.0–36.6)	3	2.3 (0.7–7.4)	11	22.9 (11.7–39.8)	31	48.6 (34.8–62.7)	
інвалідність	15	5	11.4 (3.4–32.2)	0	0.0	3	45.1 (13.4–81.4)	7	43.5 (14.9–77.2)	
інші	17	5	14.7 (4.7–37.7)	0	0.0	1	5.9 (0.7–36.3)	11	79.4 (53.8–92.7)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	66	32	22.5 (13.8–34.4)	3	3.8 (1.1–11.8)	6	17.9 (6.8–39.6)	25	55.8 (39.1–71.2)	0.7391
3-10 тис	176	82	20.9 (15.9–26.9)	8	5.2 (2.6–10.3)	23	19.6 (12.6–29.2)	63	54.3 (45.0–63.2)	
10-20 тис	179	86	23.8 (18.1–30.7)	6	5.3 (2.3–12.0)	22	17.0 (10.6–26.0)	65	53.9 (44.4–63.1)	
≥20 тис	46	16	16.0 (8.2–28.7)	0	0.0	4	10.6 (3.9–25.9)	26	73.4 (57.7–84.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	270	124	21.7 (17.4–26.7)	13	6.4 (3.6–11.2)	26	12.3 (8.3–17.8)	107	59.7 (52.6–66.4)	0.0302
так	222	106	22.5 (17.5–28.4)	7	3.5 (1.6–7.4)	32	23.6 (16.0–33.2)	77	50.4 (41.7–59.2)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

	N	Отримував ЗПТ (з усіх)								
		приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	315	89	10.8 (8.4–13.9)	16	5.5 (3.3–9.2)	42	17.0 (12.0–23.5)	168	66.6 (60.0–72.7)	0.0000
так	172	139	60.7 (50.6–69.9)	4	3.9 (1.4–10.2)	16	19.2 (12.1–29.1)	13	16.3 (9.6–26.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	262	0	0.0	20	6.5 (4.1–10.3)	58	22.2 (16.8–28.9)	184	71.2 (64.4–77.2)	0.0000
так	231	231	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	100	52	28.0 (19.9–37.8)	8	11.8 (5.8–22.3)	14	21.1 (12.5–33.3)	26	39.2 (27.9–51.8)	0.0066
негативний	393	179	20.9 (17.3–24.9)	12	3.6 (2.0–6.7)	44	16.5 (11.8–22.6)	158	59.0 (52.7–65.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	438	217	24.0 (20.2–28.1)	19	5.8 (3.6–9.2)	51	18.2 (13.4–24.1)	151	52.1 (46.1–58.1)	0.0991
стимулятори	20	5	8.2 (2.8–21.3)	0	0.0	1	6.7 (0.8–38.7)	14	85.1 (62.3–95.2)	
опі+стимул	27	7	15.5 (5.7–35.4)	1	2.1 (0.3–15.1)	6	22.9 (9.5–45.6)	13	59.5 (37.8–78.1)	
інші	8	2	6.1 (0.8–34.1)	0	0.0	0	0.0	6	93.9 (65.9–99.2)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	463	229	24.2 (20.6–28.3)	18	5.3 (3.3–8.5)	58	19.1 (14.4–24.8)	158	51.4 (45.5–57.2)	0.0038
стимулятори	20	2	2.5 (0.5–11.3)	1	1.9 (0.2–14.7)	0	0.0	17	95.5 (84.6–98.8)	
інші	7	0	0.0	1	6.6 (0.4–53.4)	0	0.0	6	93.4 (46.6–99.6)	




Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)




Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

	n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь			
так	214	39.1	(33.9–44.7)
Кількість передозувань протягом життя			
1	45	22.5	(16.1–30.7)
2-4	99	50.4	(41.8–59.1)
5+	57	27.0	(19.7–35.8)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців			
так	30	6.2	(3.8–10.0)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)			
так	30	16.1	(10.2–24.6)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців			
1	12	38.4	(18.5–63.1)
2-4	11	39.7	(17.2–67.6)
5+	5	21.9	(8.3–46.5)
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)			
метадон	9	79.5	(40.1–95.7)
інші опіоїди	2	20.5	(4.3–59.9)
стимулятор	0	0.0	
інші	0	0.0	
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)			
метадон+стимулятор	4	71.8	(29.1–94.1)
метадон+барбіт. або димедр.	2	19.6	(3.1–65.1)
метадон+інше	1	3.2	(0.3–23.5)
інші	1	5.4	(0.6–35.4)
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)			
метадон	6	63.2	(30.3–87.2)
інші опіоїди	1	5.5	(0.7–32.1)
стимулятор	0	0.0	
інші	4	31.3	(9.9–65.3)
Знання та досвід налоксону			
ніколи не чув	122	30.5	(25.3–36.2)

	n	%	ДІ
знає, але не користувався	229	45.7	(40.1–51.4)
користувався	98	15.7	(12.4–19.7)
користувались друзі	44	6.9	(4.8–9.8)
користувався сам та друзі	7	1.2	(0.5–2.9)

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	495	465	93.8 (90.0–96.2)	30	6.2 (3.8–10.0)	1.0000
Стать						
чоловік	419	398	94.7 (90.5–97.1)	21	5.3 (2.9–9.5)	0.1272
жінка	76	67	88.6 (75.9–95.0)	9	11.4 (5.0–24.1)	
Вікова категорія 4						
<25	8	6	60.8 (13.7–93.8)	2	39.2 (6.2–86.3)	0.0038
25-34	69	64	94.3 (83.9–98.2)	5	5.7 (1.8–16.1)	
35-44	305	285	94.7 (91.3–96.8)	20	5.3 (3.2–8.7)	
45+	113	110	95.7 (85.1–98.9)	3	4.3 (1.1–14.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	11	10	91.0 (49.4–99.0)	1	9.0 (1.0–50.6)	0.1963
3-5	19	18	80.1 (31.4–97.3)	1	19.9 (2.7–68.6)	
6-10	41	40	98.1 (87.0–99.8)	1	1.9 (0.2–13.0)	
≥11	420	393	94.2 (91.0–96.3)	27	5.8 (3.7–9.0)	
Партнерський статус						
живе сам	236	222	96.0 (92.6–97.9)	14	4.0 (2.1–7.4)	0.0882
живе з партнером	259	243	91.6 (84.6–95.5)	16	8.4 (4.5–15.4)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	89	81	93.8 (86.5–97.3)	8	6.2 (2.7–13.5)	0.0556
неповний робочий день або тимчасово	271	262	96.4 (92.7–98.3)	9	3.6 (1.7–7.3)	
безробітний	103	91	85.8 (70.5–93.8)	12	14.2 (6.2–29.5)	

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
	інвалідність	15	15	100.0	0	0.0	
	інші	16	15	92.1 (56.1–99.1)	1	7.9 (0.9–43.9)	
Категорія місячного доходу							
	<3 тис	66	62	92.6 (77.3–97.9)	4	7.4 (2.1–22.7)	0.5326
	3-10 тис	177	169	96.0 (91.3–98.2)	8	4.0 (1.8–8.7)	
	10-20 тис	178	165	91.5 (82.5–96.1)	13	8.5 (3.9–17.5)	
	≥20 тис	47	45	95.4 (82.0–99.0)	2	4.6 (1.0–18.0)	
Був позбавлений волі будь-коли							
	ні	271	254	93.1 (86.7–96.6)	17	6.9 (3.4–13.3)	0.5591
	так	223	211	94.8 (90.3–97.2)	12	5.2 (2.8–9.7)	

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	317	297	93.5 (88.6–96.4)	20	6.5 (3.6–11.4)	0.6488
так	173	164	94.8 (89.1–97.6)	9	5.2 (2.4–10.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	260	247	94.4 (89.4–97.1)	13	5.6 (2.9–10.6)	0.3009
так	228	211	91.3 (85.2–95.0)	17	8.7 (5.0–14.8)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	101	99	98.5 (93.6–99.7)	2	1.5 (0.3–6.4)	0.0247
негативний	394	366	92.7 (88.2–95.6)	28	7.3 (4.4–11.8)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	440	420	94.7 (90.3–97.1)	20	5.3 (2.9–9.7)	0.0398
стимулятори	20	18	97.0 (86.9–99.4)	2	3.0 (0.6–13.1)	
опі+стимул	27	21	83.9 (64.8–93.6)	6	16.1 (6.4–35.2)	
інші	8	6	79.3 (30.3–97.1)	2	20.7 (2.9–69.7)	

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	465	437	93.6 (89.5–96.1)	28	6.4 (3.9–10.5)	0.4774
стимулятори	20	19	98.1 (85.3–99.8)	1	1.9 (0.2–14.7)	
інші	7	6	88.5 (31.7–99.2)	1	11.5 (0.8–68.3)	

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	500	122	30.5 (25.3–36.2)	273	52.6 (47.0–58.2)	105	16.9 (13.5–21.0)	1.0000
Стать								
чоловік	424	107	30.8 (25.3–37.0)	233	54.1 (48.0–60.1)	84	15.0 (11.7–19.2)	0.1254
жінка	76	15	28.4 (15.5–46.1)	40	43.9 (30.5–58.3)	21	27.7 (16.7–42.3)	
Вікова категорія 4								
<25	8	4	64.9 (22.3–92.3)	2	22.7 (3.6–69.8)	2	12.4 (1.8–51.6)	0.3406
25-34	69	18	32.0 (20.2–46.6)	35	52.8 (39.1–66.2)	16	15.2 (8.2–26.4)	
35-44	310	71	28.3 (21.8–35.8)	177	54.4 (46.9–61.7)	62	17.3 (12.8–22.9)	
45+	113	29	30.7 (21.3–42.1)	59	51.7 (40.7–62.5)	25	17.6 (11.2–26.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	12	7	53.7 (22.0–82.6)	5	46.3 (17.4–78.0)	0	0.0	0.0037
3-5	19	13	71.6 (41.9–89.8)	5	18.4 (6.0–44.2)	1	10.0 (1.2–50.1)	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
6-10	41	13	33.0 (18.8–51.2)	22	58.4 (40.8–74.2)	6	8.5 (3.3–20.4)	
≥11	424	88	26.6 (21.2–32.9)	239	54.7 (48.4–60.8)	97	18.7 (14.8–23.4)	
Партнерський статус								
живе сам	241	62	32.3 (24.8–40.8)	130	52.8 (44.6–60.9)	49	14.9 (10.6–20.4)	0.5640
живе з партнером	259	60	28.7 (21.8–36.7)	143	52.4 (44.6–60.2)	56	18.9 (13.9–25.2)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	90	27	31.9 (21.1–45.2)	42	52.6 (39.3–65.5)	21	15.5 (9.1–25.2)	0.9749
неповний робочий день або тимчасово	273	59	28.3 (21.9–35.6)	158	55.0 (47.7–62.1)	56	16.7 (12.3–22.3)	
безробітний	104	28	32.4 (20.2–47.6)	54	49.4 (35.7–63.2)	22	18.2 (10.9–28.9)	
інвалідність	15	3	42.6 (11.7–80.7)	10	44.7 (15.4–78.2)	2	12.7 (2.4–46.2)	
інші	17	4	29.8 (10.3–61.2)	9	46.1 (21.2–73.0)	4	24.1 (6.4–59.8)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	67	21	41.6 (26.2–58.8)	40	49.2 (33.1–65.4)	6	9.3 (3.6–21.7)	0.3312
3-10 тис	179	36	26.5 (18.6–36.2)	108	58.0 (48.6–66.9)	35	15.5 (10.5–22.2)	
10-20 тис	180	43	29.4 (21.1–39.2)	86	49.2 (39.7–58.7)	51	21.4 (15.3–29.3)	
≥20 тис	47	16	34.2 (20.2–51.7)	23	52.0 (35.1–68.4)	8	13.8 (5.9–29.1)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	274	83	37.9 (30.8–45.6)	142	46.6 (39.4–54.0)	49	15.4 (11.0–21.1)	0.0086

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	225	39	21.3 (14.4–30.4)	131	60.1 (51.3–68.3)	55	18.5 (13.5–24.9)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	320	102	36.7 (30.2–43.7)	163	49.3 (42.4–56.1)	55	14.1 (10.4–18.8)	0.0000
так	174	19	9.8 (5.8–15.9)	107	64.2 (55.3–72.3)	48	26.0 (18.9–34.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	262	86	34.6 (28.1–41.8)	136	51.1 (44.1–58.1)	40	14.3 (10.4–19.3)	0.0001
так	231	34	15.7 (10.9–22.1)	134	58.2 (50.7–65.4)	63	26.0 (20.1–33.0)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	102	22	23.6 (14.6–35.8)	59	55.5 (43.5–66.8)	21	20.9 (13.0–31.9)	0.3511
негативний	398	100	32.0 (26.1–38.5)	214	52.0 (45.6–58.4)	84	16.0 (12.4–20.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	445	99	27.9 (22.5–34.1)	251	54.6 (48.6–60.6)	95	17.4 (13.7–21.9)	0.0079
стимулятори	20	12	74.9 (49.9–89.9)	6	22.1 (8.1–47.6)	2	3.0 (0.6–13.1)	
опі+стимул	27	7	24.3 (10.7–46.4)	13	50.6 (29.6–71.4)	7	25.1 (10.9–47.8)	
інші	8	4	36.0 (6.0–83.3)	3	53.6 (10.9–91.6)	1	10.3 (0.8–62.7)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	470	103	27.2 (22.0–33.1)	262	54.2 (48.3–60.0)	105	18.6 (14.9–23.1)	0.0007
стимулятори	20	14	77.3 (50.7–91.8)	6	22.7 (8.2–49.3)	0	0.0	
інші	7	2	15.8 (1.9–64.5)	5	84.2 (35.5–98.1)	0	0.0	

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	76	13.4	(10.2–17.4)
	гепатит C	254	43.2	(37.7–48.9)
	сифіліс	8	1.1	(0.5–2.5)
	гонорея	13	2.4	(1.3–4.3)
	хламідіоз	8	1.4	(0.6–3.1)
	герпес	34	6.3	(4.2–9.2)
	папіломавірус	9	1.7	(0.8–3.6)
	туберкульоз	29	5.4	(3.3–8.9)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	25	40.5	(27.5–54.9)
	пролікувався неуспішно	9	15.8	(7.5–30.2)
	не завершив	6	7.9	(3.0–19.2)
	зараз лікується	2	3.5	(0.7–15.6)
	ніколи не лікувався	32	32.4	(21.3–46.0)
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	42	17.7	(11.9–25.6)
	пролікувався неуспішно	26	9.9	(6.2–15.4)
	не завершив	18	7.1	(4.1–12.1)
	зараз лікується	11	6.1	(3.0–11.8)
	ніколи не лікувався	151	59.1	(51.0–66.8)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	7	100.0	
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	0	0.0	
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	25	87.6	(65.7–96.3)
	пролікувався неуспішно	2	7.1	(1.7–26.0)
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	1	5.3	(0.7–30.0)
	ніколи не лікувався	0	0.0	

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

		n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців				
	так	178	37.5	(32.1–43.4)

	n	%	ДІ
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	127	26.4	(21.4–32.0)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	64	48.6	(36.8–60.5)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	67	54.8	(42.7–66.3)
приватна клініка	1	0.6	(0.1–4.2)
приватна лабораторія	1	0.2	(0.0–1.6)
протитуберкульозного диспансеру	1	1.0	(0.1–7.1)
наркологічний диспансер	0	0.0	
ІПСШ	2	1.2	(0.3–5.2)
швидкої допомоги	10	6.8	(3.1–14.2)
мобільна амбулаторія	0	0.0	
інше	1	0.7	(0.1–4.9)
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	55	41.7	(30.4–54.1)
лікарня, ВІЛ-клініка	61	51.7	(39.7–63.5)
приватна клініка	1	0.6	(0.1–4.2)
приватна лабораторія	0	0.0	
протитуберкульозний диспансер	1	1.1	(0.1–7.2)
наркологічна клініка	0	0.0	
ІПСШ клініка	2	1.2	(0.3–5.3)
швидка допомога	5	3.0	(1.1–7.8)
мобільна клініка	0	0.0	
інші	1	0.7	(0.1–4.9)
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	116	94.4	(88.5–97.4)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	340	65.5	(59.9–70.7)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	33	9.9	(6.6–14.7)
раз на місяць	22	5.9	(3.5–9.7)
3-4 рази в 12 місяців	95	29.7	(23.5–36.8)
тільки один раз	162	54.4	(47.1–61.6)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	454	357	75.9 (70.4–80.7)	97	24.1 (19.3–29.6)	1.0000
Стать							
	чоловік	384	303	75.8 (69.7–81.0)	81	24.2 (19.0–30.3)	0.9096
	жінка	70	54	76.6 (62.0–86.8)	16	23.4 (13.2–38.0)	
Вікова категорія 4							
	<25	8	4	45.4 (10.6–85.4)	4	54.6 (14.6–89.4)	0.0373
	25-34	62	40	65.7 (51.1–77.8)	22	34.3 (22.2–48.9)	
	35-44	282	225	77.4 (70.3–83.2)	57	22.6 (16.8–29.7)	
	45+	102	88	84.4 (74.2–91.1)	14	15.6 (8.9–25.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	9	8	87.5 (39.3–98.7)	1	12.5 (1.3–60.7)	0.2314
	3-5	17	12	60.6 (27.2–86.4)	5	39.4 (13.6–72.8)	
	6-10	39	26	64.8 (46.7–79.5)	13	35.2 (20.5–53.3)	
	≥11	385	308	78.0 (72.2–82.9)	77	22.0 (17.1–27.8)	
Партнерський статус							

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	210	166	78.3 (71.0–84.2)	44	21.7 (15.8–29.0)	0.3814
живе з партнером	244	191	73.8 (65.5–80.7)	53	26.2 (19.3–34.5)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	84	68	81.2 (69.2–89.2)	16	18.8 (10.8–30.8)	0.4289
неповний робочий день або тимчасово	253	200	76.4 (69.5–82.1)	53	23.6 (17.9–30.5)	
безробітний	87	67	68.3 (50.8–81.9)	20	31.7 (18.1–49.2)	
інвалідність	15	13	87.3 (53.8–97.6)	2	12.7 (2.4–46.2)	
інші	14	8	66.0 (35.6–87.2)	6	34.0 (12.8–64.4)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	57	50	90.7 (79.6–96.1)	7	9.3 (3.9–20.4)	0.0968
3-10 тис	161	129	75.5 (66.3–82.8)	32	24.5 (17.2–33.7)	
10-20 тис	167	126	73.8 (63.6–82.0)	41	26.2 (18.0–36.4)	
≥20 тис	43	31	67.8 (49.4–81.9)	12	32.2 (18.1–50.6)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	252	193	75.5 (68.2–81.6)	59	24.5 (18.4–31.8)	0.8547
так	201	163	76.5 (67.5–83.6)	38	23.5 (16.4–32.5)	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	298	225	73.6 (66.8–79.4)	73	26.4 (20.6–33.2)	0.0539
так	151	127	83.5 (75.0–89.5)	24	16.5 (10.5–25.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	238	174	73.6 (66.7–79.5)	64	26.4 (20.5–33.3)	0.0131
так	209	179	84.8 (78.1–89.7)	30	15.2 (10.3–21.9)	
Результат тесту на ВІЛ						

	N	Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
		ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	93	73	71.9 (58.9–82.1)	20	28.1 (17.9–41.1)	0.4381
негативний	361	284	76.8 (70.6–82.1)	77	23.2 (17.9–29.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	405	328	77.3 (71.3–82.3)	77	22.7 (17.7–28.7)	0.4266
стимулятори	19	12	67.9 (41.1–86.5)	7	32.1 (13.5–58.9)	
опі+стимул	23	13	61.2 (37.2–80.7)	10	38.8 (19.3–62.8)	
інші	7	4	78.9 (31.2–96.9)	3	21.1 (3.1–68.8)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	426	340	77.1 (71.3–82.0)	86	22.9 (18.0–28.7)	0.7599
стимулятори	18	13	70.8 (42.5–88.8)	5	29.2 (11.2–57.5)	
інші	7	4	67.7 (18.5–95.1)	3	32.3 (4.9–81.5)	

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		N	Результат скринінгу депресії PHQ-9								
			мінімальна		легка		помірна		тяжка		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	500	159	36.0 (30.6–41.9)	186	34.0 (28.9–39.5)	100	21.1 (17.0–25.8)	55	8.9 (6.6–11.9)	1.0000
Стать											
	чоловік	424	140	36.8 (31.0–43.1)	158	34.6 (28.9–40.6)	82	20.6 (16.3–25.7)	44	8.0 (5.7–11.1)	0.4791
	жінка	76	19	31.4 (18.3–48.3)	28	30.8 (19.8–44.7)	18	23.5 (13.2–38.3)	11	14.2 (7.3–25.8)	
Вікова категорія 4											
	<25	8	4	63.2 (20.8–91.8)	2	19.9 (3.1–66.2)	2	16.9 (2.4–62.7)	0	0.0	0.3781
	25-34	69	22	33.7 (21.9–48.0)	22	27.8 (17.1–41.8)	15	22.6 (13.1–36.1)	10	15.9 (8.2–28.4)	
	35-44	310	94	34.1 (27.1–41.8)	119	37.0 (30.0–44.5)	59	19.8 (14.8–25.9)	38	9.2 (6.4–13.1)	

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
45+	113	39	39.4 (29.0–50.8)	43	31.7 (23.0–41.8)	24	24.4 (15.8–35.7)	7	4.6 (1.8–11.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	12	5	35.0 (11.7–68.7)	4	42.1 (14.3–76.0)	1	8.8 (0.9–49.8)	2	14.0 (2.1–55.3)	0.0906
3-5	19	10	67.6 (40.5–86.5)	8	30.0 (12.1–57.1)	1	2.4 (0.3–17.9)	0	0.0	
6-10	41	14	35.4 (20.3–54.1)	11	24.6 (13.1–41.4)	12	33.0 (18.4–51.8)	4	7.0 (2.4–19.1)	
≥11	424	130	34.4 (28.5–40.8)	162	35.2 (29.4–41.4)	85	21.4 (16.9–26.7)	47	9.0 (6.5–12.3)	
Партнерський статус										
живе сам	241	75	37.1 (29.1–45.8)	88	30.5 (23.8–38.2)	49	22.4 (16.6–29.5)	29	9.9 (6.6–14.8)	0.5674
живе з партнером	259	84	35.0 (27.8–42.9)	98	37.4 (30.1–45.4)	51	19.7 (14.3–26.4)	26	7.9 (5.0–12.1)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	90	37	38.2 (26.4–51.6)	28	40.0 (27.1–54.4)	15	14.8 (8.2–25.4)	10	7.0 (3.4–13.8)	0.3708
неповний робочий день або тимчасово	273	75	32.4 (25.9–39.7)	108	35.7 (29.1–43.0)	63	24.2 (18.5–30.9)	27	7.7 (4.9–11.8)	
безробітний	104	40	44.8 (31.2–59.2)	37	26.4 (16.3–39.7)	15	17.8 (9.9–29.9)	12	11.1 (5.7–20.4)	
інвалідність	15	4	43.6 (12.4–80.8)	7	34.3 (11.3–68.1)	4	22.2 (5.6–57.9)	0	0.0	
інші	17	3	26.1 (6.9–62.8)	6	25.1 (9.3–52.2)	3	22.0 (6.3–54.2)	5	26.8 (9.8–55.0)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	67	14	23.2 (11.0–42.5)	30	42.2 (27.1–59.0)	14	22.2 (11.8–37.7)	9	12.4 (5.6–25.2)	0.5305
3-10 тис	179	60	40.6 (31.5–50.5)	71	32.2 (24.7–40.7)	32	19.7 (13.6–27.7)	16	7.4 (4.3–12.6)	
10-20 тис	180	60	38.9 (29.9–48.6)	62	33.2 (24.6–43.2)	36	19.1 (13.0–27.3)	22	8.8 (5.3–14.0)	
≥20 тис	47	19	35.0 (20.9–52.2)	13	31.4 (17.6–49.6)	12	30.6 (16.8–49.0)	3	3.1 (0.8–10.6)	
Був позбавлений волі будь-коли										

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	274	85	34.7 (27.8–42.2)	102	35.7 (28.9–43.1)	52	19.5 (14.3–25.9)	35	10.1 (6.9–14.6)	0.6083
так	225	74	37.8 (29.4–47.1)	83	31.8 (24.3–40.3)	48	23.0 (16.9–30.6)	20	7.4 (4.5–11.9)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	159	36.0 (30.6–41.9)	186	34.0 (28.9–39.5)	100	21.1 (17.0–25.8)	55	8.9 (6.6–11.9)	1.0000
Стать										
чоловік	424	140	36.8 (31.0–43.1)	158	34.6 (28.9–40.6)	82	20.6 (16.3–25.7)	44	8.0 (5.7–11.1)	0.4791
жінка	76	19	31.4 (18.3–48.3)	28	30.8 (19.8–44.7)	18	23.5 (13.2–38.3)	11	14.2 (7.3–25.8)	
Вікова категорія 4										
<25	8	4	63.2 (20.8–91.8)	2	19.9 (3.1–66.2)	2	16.9 (2.4–62.7)	0	0.0	0.3781
25-34	69	22	33.7 (21.9–48.0)	22	27.8 (17.1–41.8)	15	22.6 (13.1–36.1)	10	15.9 (8.2–28.4)	
35-44	310	94	34.1 (27.1–41.8)	119	37.0 (30.0–44.5)	59	19.8 (14.8–25.9)	38	9.2 (6.4–13.1)	
45+	113	39	39.4 (29.0–50.8)	43	31.7 (23.0–41.8)	24	24.4 (15.8–35.7)	7	4.6 (1.8–11.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	12	5	35.0 (11.7–68.7)	4	42.1 (14.3–76.0)	1	8.8 (0.9–49.8)	2	14.0 (2.1–55.3)	0.0906
3-5	19	10	67.6 (40.5–86.5)	8	30.0 (12.1–57.1)	1	2.4 (0.3–17.9)	0	0.0	
6-10	41	14	35.4 (20.3–54.1)	11	24.6 (13.1–41.4)	12	33.0 (18.4–51.8)	4	7.0 (2.4–19.1)	
≥11	424	130	34.4 (28.5–40.8)	162	35.2 (29.4–41.4)	85	21.4 (16.9–26.7)	47	9.0 (6.5–12.3)	
Партнерський статус										

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	241	75	37.1 (29.1–45.8)	88	30.5 (23.8–38.2)	49	22.4 (16.6–29.5)	29	9.9 (6.6–14.8)	0.5674
живе з партнером	259	84	35.0 (27.8–42.9)	98	37.4 (30.1–45.4)	51	19.7 (14.3–26.4)	26	7.9 (5.0–12.1)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	90	37	38.2 (26.4–51.6)	28	40.0 (27.1–54.4)	15	14.8 (8.2–25.4)	10	7.0 (3.4–13.8)	0.3708
неповний робочий день або тимчасово	273	75	32.4 (25.9–39.7)	108	35.7 (29.1–43.0)	63	24.2 (18.5–30.9)	27	7.7 (4.9–11.8)	
безробітний	104	40	44.8 (31.2–59.2)	37	26.4 (16.3–39.7)	15	17.8 (9.9–29.9)	12	11.1 (5.7–20.4)	
інвалідність	15	4	43.6 (12.4–80.8)	7	34.3 (11.3–68.1)	4	22.2 (5.6–57.9)	0	0.0	
інші	17	3	26.1 (6.9–62.8)	6	25.1 (9.3–52.2)	3	22.0 (6.3–54.2)	5	26.8 (9.8–55.0)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	67	14	23.2 (11.0–42.5)	30	42.2 (27.1–59.0)	14	22.2 (11.8–37.7)	9	12.4 (5.6–25.2)	0.5305
3-10 тис	179	60	40.6 (31.5–50.5)	71	32.2 (24.7–40.7)	32	19.7 (13.6–27.7)	16	7.4 (4.3–12.6)	
10-20 тис	180	60	38.9 (29.9–48.6)	62	33.2 (24.6–43.2)	36	19.1 (13.0–27.3)	22	8.8 (5.3–14.0)	
≥20 тис	47	19	35.0 (20.9–52.2)	13	31.4 (17.6–49.6)	12	30.6 (16.8–49.0)	3	3.1 (0.8–10.6)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	274	85	34.7 (27.8–42.2)	102	35.7 (28.9–43.1)	52	19.5 (14.3–25.9)	35	10.1 (6.9–14.6)	0.6083
так	225	74	37.8 (29.4–47.1)	83	31.8 (24.3–40.3)	48	23.0 (16.9–30.6)	20	7.4 (4.5–11.9)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Разом	500	238	49.8 (44.2–55.5)	177	33.9 (28.8–39.5)	65	13.5 (10.1–17.8)	20	2.7 (1.6–4.5)	1.0000
Стать										
чоловік	424	212	51.7 (45.6–57.8)	149	33.9 (28.3–40.0)	47	11.9 (8.4–16.6)	16	2.6 (1.4–4.6)	0.1297
жінка	76	26	39.1 (25.2–54.9)	28	34.4 (22.2–49.0)	18	22.8 (13.2–36.5)	4	3.8 (1.3–10.6)	
Вікова категорія 4										
<25	8	2	22.7 (3.6–69.8)	6	77.3 (30.2–96.4)	0	0.0	0	0.0	0.0145
25-34	69	27	39.2 (26.7–53.3)	27	38.1 (25.7–52.2)	15	22.7 (13.2–36.1)	0	0.0	
35-44	310	143	49.7 (42.3–57.2)	110	32.8 (26.3–40.1)	44	14.6 (10.0–20.8)	13	2.9 (1.5–5.3)	
45+	113	66	61.8 (50.7–71.8)	34	27.8 (19.0–38.6)	6	5.7 (2.3–13.3)	7	4.7 (1.9–11.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	12	6	46.7 (17.7–78.2)	5	51.0 (20.2–81.0)	0	0.0	1	2.3 (0.2–19.3)	0.5835
3-5	19	9	47.7 (21.5–75.3)	9	49.9 (22.8–77.1)	1	2.4 (0.3–17.9)	0	0.0	
6-10	41	20	51.9 (34.6–68.7)	14	33.7 (19.7–51.3)	6	12.1 (4.7–27.7)	1	2.3 (0.3–15.6)	
≥11	424	202	50.2 (43.9–56.4)	148	32.4 (26.9–38.5)	57	14.6 (10.6–19.6)	17	2.8 (1.6–5.0)	
Партнерський статус										
живе сам	241	112	52.0 (43.9–60.0)	87	34.0 (26.8–42.0)	33	11.2 (7.6–16.2)	9	2.9 (1.3–6.2)	0.6146
живе з партнером	259	126	47.7 (40.0–55.5)	90	33.9 (26.7–42.0)	32	15.7 (10.4–23.1)	11	2.6 (1.4–4.9)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	90	47	52.3 (38.8–65.4)	31	37.8 (25.2–52.2)	10	9.0 (4.2–18.1)	2	0.9 (0.2–3.9)	0.7251

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
неповний робочий день або тимчасово	273	124	48.5 (41.3–55.8)	104	36.0 (29.3–43.3)	35	13.5 (9.3–19.3)	10	2.0 (1.0–3.9)	
безробітний	104	52	50.0 (36.2–63.7)	33	29.9 (18.8–44.0)	13	15.0 (7.0–29.5)	6	5.1 (1.9–12.8)	
інвалідність	15	8	63.1 (28.6–88.0)	3	14.7 (3.3–46.8)	4	22.2 (5.6–57.9)	0	0.0	
інші	17	7	47.7 (21.8–74.8)	6	29.8 (11.0–59.3)	3	16.6 (4.6–45.2)	1	5.9 (0.7–36.3)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	67	25	39.3 (24.5–56.4)	33	51.1 (34.9–67.2)	4	3.9 (1.2–12.2)	5	5.6 (1.8–16.0)	0.0654
3-10 тис	179	93	57.1 (48.0–65.7)	58	28.0 (21.0–36.4)	23	13.4 (8.6–20.2)	5	1.5 (0.6–4.1)	
10-20 тис	180	86	48.8 (39.4–58.3)	62	33.3 (24.6–43.2)	25	15.6 (9.4–24.7)	7	2.3 (1.0–5.2)	
≥20 тис	47	25	53.2 (36.1–69.6)	12	31.1 (16.9–50.1)	9	14.9 (6.9–29.4)	1	0.8 (0.1–5.6)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	274	127	49.0 (41.7–56.4)	95	33.8 (26.9–41.4)	38	13.6 (9.4–19.2)	14	3.6 (1.9–6.7)	0.7322
так	225	110	50.7 (42.0–59.4)	82	34.3 (26.7–42.7)	27	13.3 (8.2–20.9)	6	1.7 (0.7–3.9)	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	320	154	50.6 (43.7–57.4)	118	34.7 (28.4–41.5)	38	12.9 (8.9–18.2)	10	1.9 (0.9–3.7)	0.3723
так	174	82	47.5 (38.6–56.6)	58	32.8 (24.7–42.0)	25	14.8 (9.3–22.9)	9	4.8 (2.1–10.5)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	262	125	49.5 (42.6–56.5)	90	33.8 (27.5–40.8)	37	14.1 (9.9–19.6)	10	2.6 (1.3–4.9)	0.7212

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	231	110	50.8 (43.4–58.3)	85	34.9 (28.2–42.3)	26	10.7 (6.8–16.5)	10	3.5 (1.9–6.6)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	102	52	54.9 (43.1–66.1)	34	29.4 (20.2–40.7)	14	14.8 (8.4–24.9)	2	0.9 (0.2–4.2)	0.4531
негативний	398	186	48.7 (42.4–55.1)	143	34.9 (29.0–41.3)	51	13.2 (9.4–18.2)	18	3.1 (1.8–5.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	445	216	50.7 (44.7–56.7)	162	34.6 (29.1–40.5)	51	12.1 (8.6–16.8)	16	2.6 (1.4–4.6)	0.0321
стимулятори	20	9	56.2 (30.7–78.8)	5	22.3 (7.4–50.7)	6	21.6 (7.8–47.1)	0	0.0	
опі+стимул	27	10	43.5 (23.5–65.9)	5	15.6 (5.4–37.5)	8	32.0 (15.5–54.6)	4	8.9 (2.9–24.1)	
інші	8	3	22.5 (3.7–68.6)	5	77.5 (31.4–96.3)	0	0.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	470	225	50.7 (44.9–56.6)	166	32.5 (27.3–38.1)	62	14.1 (10.4–18.7)	17	2.7 (1.6–4.7)	0.3710
стимулятори	20	10	51.0 (26.5–75.0)	6	40.2 (18.0–67.2)	1	4.3 (0.5–28.3)	3	4.5 (1.2–15.4)	
інші	7	2	15.8 (1.9–64.5)	3	66.0 (18.2–94.5)	2	18.2 (2.1–69.2)	0	0.0	

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	60	10.1	(7.5–13.4)
збут наркотиків	7	1.6	(0.7–3.5)
зберігання наркотиків	29	6.0	(3.6–9.7)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	48	8.0	(5.7–11.0)
збут наркотиків	3	0.5	(0.2–1.6)
зберігання наркотиків	22	5.0	(2.9–8.8)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	363	72.6	(67.5–77.1)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	225	44.9	(39.3–50.6)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	27	12.2	(7.8–18.6)
6м-2р	50	22.7	(16.2–30.8)
2-4р	68	31.6	(23.6–40.8)
4 роки +	75	33.5	(25.8–42.2)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	13	6.6	(3.5–12.1)

	n	%	ДІ
1-3р	31	12.2	(8.1–18.1)
3-5р	30	12.0	(7.8–18.2)
5-10р	59	24.1	(18.0–31.5)
10 років +	88	45.0	(36.2–54.1)
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	130	50.2	(41.5–59.0)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	290	61.9	(56.4–67.1)
так, за останні 6м	92	17.0	(13.4–21.3)
так, але 6+ місяців тому	113	21.1	(17.1–25.8)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	200	45.1	(39.5–50.9)
так, за останні 6м	136	24.5	(20.0–29.6)
так, але 6+ місяців тому	158	30.4	(25.6–35.7)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	369	76.4	(71.4–80.7)
так, за останні 6м	51	10.7	(7.5–15.0)
так, але 6+ місяців тому	76	13.0	(10.0–16.6)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	338	70.0	(64.4–75.0)
так	154	30.0	(25.0–35.6)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	336	70.2	(65.1–75.0)
так	160	29.8	(25.0–34.9)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			

		n	%	ДІ
	ні	67	45.0	(35.6–54.7)
	так	93	55.0	(45.3–64.4)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців				
	ні	333	67.3	(61.8–72.4)
	так	161	32.7	(27.6–38.2)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

		Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	492	154	30.0 (25.0–35.6)	1.0000	160	93	55.0 (45.3–64.4)	1.0000
Стать									
	чоловік	418	126	29.8 (24.3–36.0)	0.8636	132	78	56.6 (46.5–66.2)	0.5782
	жінка	74	28	31.1 (19.5–45.6)		28	15	48.6 (24.4–73.5)	
Вікова категорія 4									
	<25	8	5	71.8 (27.2–94.5)	0.0019	2	2	100.0	0.3359
	25-34	68	27	40.1 (27.3–54.5)		22	13	55.1 (31.0–77.0)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
35-44	304	97	29.7 (23.3–37.1)		103	62	58.5 (45.5–70.5)	
45+	112	25	17.2 (10.9–26.3)		33	16	41.7 (24.5–61.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	12	5	39.0 (12.7–73.8)	0.0409	2	2	100.0	0.3102
3-5	18	7	57.1 (28.9–81.4)		5	3	73.3 (28.0–95.1)	
6-10	41	18	39.4 (24.2–57.0)		14	9	65.8 (37.3–86.1)	
≥11	418	122	26.4 (21.2–32.4)		139	79	51.7 (41.1–62.1)	
Партнерський статус								
живе сам	235	78	32.0 (24.6–40.5)	0.4660	75	45	54.8 (40.4–68.4)	0.9588
живе з партнером	257	76	28.1 (21.5–35.7)		85	48	55.3 (42.2–67.7)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	89	24	25.4 (15.5–38.7)	0.2388	23	10	32.2 (15.2–55.7)	0.4083
неповний робочий день або тимчасово	269	85	28.1 (22.2–34.9)		93	58	60.9 (48.6–72.0)	
безробітний	102	34	38.3 (24.9–53.7)		30	16	51.5 (31.6–70.9)	
інвалідність	15	4	14.1 (3.3–44.0)		6	4	44.2 (7.1–89.1)	
інші	16	6	45.4 (19.3–74.3)		7	4	57.0 (18.9–88.3)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	65	22	24.6 (14.1–39.3)	0.8384	20	10	38.1 (15.2–68.0)	0.2655
3-10 тис	177	53	31.8 (23.3–41.8)		56	36	67.0 (51.3–79.7)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
10-20 тис	177	60	30.1 (21.9–39.7)		63	36	50.3 (35.9–64.6)	
≥20 тис	47	10	27.3 (14.2–45.9)		15	8	57.0 (27.6–82.2)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	267	88	32.2 (25.5–39.7)	0.4018	77	44	56.5 (42.9–69.1)	0.7722
так	224	66	27.5 (20.2–36.3)		83	49	53.6 (39.7–67.0)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	316	94	28.1 (22.2–35.0)	0.2525	100	59	53.0 (41.2–64.5)	0.5028
так	171	57	34.5 (26.1–44.0)		57	32	59.7 (43.6–73.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	256	69	28.8 (22.6–35.9)	0.2984	85	51	55.6 (43.4–67.1)	0.8771
так	229	83	33.9 (27.3–41.3)		71	40	54.1 (40.5–67.2)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	101	32	28.5 (19.3–39.9)	0.7638	29	11	37.5 (19.8–59.4)	0.0863
негативний	391	122	30.3 (24.6–36.8)		131	82	58.4 (47.4–68.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	440	134	30.0 (24.5–36.1)	0.6457	140	81	54.1 (43.6–64.2)	0.2817
стимулятори	18	7	28.8 (11.4–55.9)		6	3	35.8 (7.6–79.0)	
опі+стимул	27	11	38.3 (20.0–60.6)		11	7	77.5 (45.7–93.4)	
інші	7	2	14.0 (1.5–64.0)		3	2	79.4 (15.3–98.8)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	464	147	31.1 (25.8–36.9)	0.4060	151	88	55.2 (45.2–64.8)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
стимулятори	20	4	17.0 (4.9–44.8)		7	3	46.8 (13.1–83.7)	
інші	7	2	20.7 (2.6–72.3)		0	0	0.0	

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	56	12.3	(9.1–16.4)
так, з інших причин	24	5.5	(3.3–9.2)
ні	418	82.2	(77.4–86.1)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	2	4.5	(1.1–17.4)
інша країна	2	1.3	(0.3–5.2)
інша область	34	66.0	(49.8–79.1)
інше місто	8	19.2	(9.0–36.4)
інший район	2	3.1	(0.6–13.5)
інший будинок	5	5.9	(2.2–15.2)
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			
та сама область	40	55.5	(41.9–68.4)
інша область	35	44.5	(31.6–58.1)
інша країна	0	0.0	



Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)




Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)

Результати для міста: Львів




Рис. А. Мережа рекрутингу RDS у місті Львів

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	500	39.3	(38.5–40.1)	39	(34–44)
Вік першого неін'єкційного вживання наркотиків	483	16.3	(16.0–16.6)	16	(15–18)
Років з початку неін'єкційного вживання наркотиків	483	22.9	(22.1–23.8)	23	(17–29)
Вік першого ін'єкційного вживання наркотиків	500	21.0	(20.5–21.5)	19	(18–23)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків	500	18.2	(17.3–19.1)	18	(11–24)
Особистий місячний дохід, грн	487	12,495.0	(10898.6–14091.5)	10,000	(7000–15000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

	Сайт	n	%	ДІ
Стать				
чоловік	Львів	473	95.1	(92.8–96.7)
жінка	Львів	27	4.9	(3.3–7.2)
Вікова категорія 4				
<25	Львів	17	3.6	(2.1–5.9)
25-34	Львів	115	24.6	(20.5–29.1)
35-44	Львів	243	47.5	(42.8–52.2)
45+	Львів	125	24.4	(20.6–28.6)
Сімейний стан				
одружений або проживають разом	Львів	69	14.2	(11.2–17.8)
одружений, але має іншого партнера	Львів	11	2.7	(1.4–4.9)
не одружений, але є партнер	Львів	81	15.5	(12.5–19.2)
одружений, але не живуть разом	Львів	52	10.6	(8.0–13.9)
не одружений та не мають партнера	Львів	287	57.0	(52.3–61.6)
Партнерський статус				
живе сам	Львів	339	67.6	(63.1–71.8)
живе з партнером	Львів	161	32.4	(28.2–36.9)
Освіта 3 категорії				
незак. середня школа	Львів	91	18.9	(15.5–22.9)
середня школа	Львів	113	21.8	(18.3–25.8)
> середня школа	Львів	296	59.3	(54.6–63.8)
Поточна професія				
учень школи	Львів	0	0.0	
студент коледжу/університету	Львів	2	0.4	(0.1–1.8)
постійна робота	Львів	105	22.8	(18.8–27.3)
непостійна робота	Львів	309	60.2	(55.5–64.8)
безробітний	Львів	39	7.6	(5.5–10.5)
домогосподарка	Львів	7	1.3	(0.6–2.7)
інвалідність	Львів	32	6.4	(4.5–9.1)
військовий	Львів	2	0.4	(0.1–1.5)
інші	Львів	4	0.9	(0.3–2.6)
Безхатченко				
ніколи	Львів	454	90.9	(87.8–93.3)

	Сайт	n	%	ДІ
так, 12м+ тому	Львів	46	9.1	(6.7–12.2)
так, за останні 12м	Львів	0	0.0	
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Львів	46	100.0	
так	Львів	0	0.0	
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Львів	27	6.1	(4.1–9.0)
3-10 тис	Львів	191	37.8	(33.3–42.4)
10-20 тис	Львів	213	43.2	(38.5–48.0)
≥20 тис	Львів	56	13.0	(10.0–16.8)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Львів	27	6.1	(4.1–9.0)
≥2684	Львів	460	93.9	(91.0–95.9)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Львів	14	3.1	(1.8–5.5)
3-5	Львів	31	7.2	(4.7–10.9)
6-10	Львів	52	10.0	(7.6–13.0)
≥11	Львів	403	79.7	(75.4–83.5)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Сайт	n	%	ДІ
власне житло	Львів	275	56.5	(51.8–61.0)
у друзів або родичів	Львів	215	42.2	(37.7–46.9)
оренда	Львів	32	6.3	(4.4–8.9)
різне	Львів	8	1.5	(0.7–3.0)
на вулиці (безхатько)	Львів	0	0.0	
у притулку для біженців	Львів	1	0.2	(0.0–1.6)




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)



Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Всього								
	Разом	500	383	76.5 (72.3–80.2)	46	9.9 (7.3–13.2)	71	13.7 (10.8–17.1)
Стать								
	чоловік	473	365	77.0 (72.7–80.9)	44	9.8 (7.2–13.2)	64	13.2 (10.3–16.7)
	жінка	27	18	66.1 (44.8–82.5)	2	10.4 (2.5–34.9)	7	23.4 (10.7–43.7)
Вікова категорія 4								

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
<25	17	7	45.9 (21.4–72.5)	6	35.7 (14.6–64.2)	4	18.5 (6.0–44.6)
25-34	115	79	69.1 (59.1–77.6)	18	17.0 (10.5–26.3)	18	13.9 (8.6–21.7)
35-44	243	193	79.2 (73.2–84.1)	15	6.0 (3.5–10.1)	35	14.8 (10.7–20.3)
45+	125	104	83.2 (75.0–89.1)	7	6.4 (2.9–13.4)	14	10.4 (6.1–17.2)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
≤2	14	6	41.1 (16.0–71.8)	6	47.9 (20.4–76.7)	2	11.0 (2.1–41.5)
3-5	31	19	62.2 (39.9–80.3)	9	31.2 (14.9–54.0)	3	6.6 (1.9–20.3)
6-10	52	32	65.3 (51.0–77.3)	8	13.2 (6.5–25.1)	12	21.4 (12.1–35.2)
≥11	403	326	80.6 (76.1–84.4)	23	6.0 (3.9–9.1)	54	13.4 (10.3–17.4)
Партнерський статус							
живе сам	339	258	75.5 (70.2–80.1)	33	10.7 (7.5–15.0)	48	13.8 (10.4–18.2)
живе з партнером	161	125	78.6 (71.2–84.5)	13	8.1 (4.6–13.9)	23	13.3 (8.7–19.7)
Поточний статус зайнятості							
повний робочий день	105	86	80.8 (70.7–88.0)	8	8.9 (4.1–18.2)	11	10.3 (5.5–18.5)
неповний робочий день або тимчасово	309	229	73.9 (68.4–78.8)	29	9.7 (6.7–13.9)	51	16.4 (12.5–21.2)
безробітний	39	31	77.9 (59.9–89.3)	5	15.4 (6.1–34.0)	3	6.6 (2.0–19.6)
інвалідність	32	28	90.7 (76.2–96.7)	1	2.0 (0.3–14.2)	3	7.3 (2.2–21.7)
інші	15	9	61.1 (32.3–83.9)	3	23.3 (6.8–55.9)	3	15.6 (4.1–44.5)
Категорія місячного доходу							
<3 тис	27	22	83.4 (63.3–93.6)	1	4.8 (0.6–29.3)	4	11.8 (4.0–29.7)
3-10 тис	191	135	70.8 (63.5–77.1)	22	12.0 (7.9–18.0)	34	17.2 (12.3–23.5)
10-20 тис	213	172	81.4 (75.2–86.3)	15	6.7 (4.0–11.2)	26	11.9 (8.0–17.3)
≥20 тис	56	44	74.8 (59.5–85.7)	5	12.2 (4.7–28.0)	7	13.0 (6.0–25.9)
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	315	238	75.7 (70.3–80.4)	37	12.2 (8.7–16.8)	40	12.1 (8.8–16.4)
так	185	145	78.0 (70.8–83.7)	9	5.5 (2.7–10.9)	31	16.5 (11.6–23.0)

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії					
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	457	349	76.6 (72.2–80.5)	42	9.7 (7.0–13.1)	66	13.7 (10.8–17.3)
так	43	34	75.0 (57.3–87.0)	4	11.9 (4.2–29.4)	5	13.1 (5.1–29.6)
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	480	366	75.9 (71.6–79.8)	46	10.3 (7.6–13.8)	68	13.8 (10.9–17.4)
так	20	17	89.5 (68.8–97.1)	0	0.0	3	10.5 (2.9–31.2)
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	60	48	78.5 (64.7–88.0)	2	5.3 (1.3–19.5)	10	16.1 (8.4–28.7)
негативний	440	335	76.2 (71.7–80.2)	44	10.5 (7.7–14.1)	61	13.3 (10.3–17.0)
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання							
опіоїди	437	379	87.0 (83.3–90.0)	0	0.0	58	13.0 (10.0–16.7)
стимулятори	61	4	7.8 (2.4–23.0)	46	77.1 (63.3–86.8)	11	15.1 (8.1–26.3)
інші	2	0	0.0	0	0.0	2	100.0

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Частота ін'єкцій: останні 24 години								
0 разів	27	6.6	7	18.4	5	6.7	0	
1 раз	257	67.5	24	49.0	45	66.4	0	
2-3 рази	90	23.3	14	28.8	14	18.1	0	
4+ рази	9	2.5	1	3.8	7	8.8	0	
N	383		46		71		0	
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)								
1 раз	257	72.3	24	60.1	45	71.2	0	
2-3 рази	90	25.0	14	35.3	14	19.4	0	
4+ рази	9	2.7	1	4.7	7	9.4	0	
N	356		39		66		0	
Частота ін'єкцій: останній тиждень								
0 разів	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	
1-6 разів	136	37.4	24	57.7	26	37.2	0	
кожен день	246	62.4	22	42.3	45	62.8	0	
N	383		46		71		0	
Частота ін'єкцій: останні 30 днів								
1-9 разів	32	8.4	4	7.4	2	3.3	0	

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші	
	n	%	n	%	n	%	n	%
10-19 разів	72	19.1	14	34.0	14	18.1	0	
20-29 разів	77	21.2	9	17.9	17	25.5	0	
кожен день	202	51.4	19	40.7	38	53.1	0	
N	383		46		71		0	
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів								
0-9 разів	16	4.0	2	4.6	4	5.3	0	
10-19 разів	75	20.0	14	34.0	11	14.3	0	
20-29 разів	76	20.7	10	20.2	21	31.9	0	
кожен день	216	55.3	20	41.2	35	48.5	0	
N	383		46		71		0	

Таблиця 2.4. Ін'єкційний вид наркотику на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	25	6.0	2	7.0	0	0.0
3-10 тис	162	36.6	28	44.8	1	66.3
10-20 тис	190	44.6	22	33.5	1	33.7
≥20 тис	50	12.8	6	14.8	0	0.0
N	427		58		2	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
Разом		опіоїди		стимулятори		інші		
n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
готую сам								
186	38.1	156	36.9	29	45.7	1	66.3	0.3140
приготовлене друзями								
57	11.8	50	11.6	7	13.6	0	0.0	0.8263
від дилера								
286	56.0	263	59.2	22	34.6	1	33.7	0.0016
куплене в Інтернеті								
102	20.0	84	18.6	18	30.2	0	0.0	0.1202
з програми ЗПТ								
7	1.5	5	1.3	1	2.2	1	33.7	0.0018
інше								
7	1.4	6	1.4	1	1.8	0	0.0	0.9585
N								
645		564		78		3		
з аптеки								
		0	0.0	0	0.0	0	0.0	




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін'єкції використовував чистий шприц			
так	456	91.9	(89.2–94.1)
Джерело шприца для останньої ін'єкції			
купив в аптеці	403	81.5	(77.7–84.7)
отримав в аптеці	0	0.0	
отримав від НУО	32	6.0	(4.2–8.5)
отримав від друга	32	6.2	(4.3–8.7)
отримав вживаний від друга	1	0.2	(0.0–1.4)
використовував вживаний свій	31	5.9	(4.1–8.4)
отримав заповнений	0	0.0	
інші	1	0.2	(0.0–1.4)
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	26	4.9	(3.3–7.2)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	18	3.6	(2.2–5.8)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	63	12.2	(9.5–15.6)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	72	13.8	(10.9–17.2)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	228	44.4	(39.8–49.1)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	17	3.6	(2.2–5.8)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	113	21.8	(18.2–25.8)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	0	0.0	
часто	2	7.4	(1.8–26.5)
половина	4	16.5	(6.1–37.3)
іноді	9	29.3	(15.3–48.8)
рідко	8	32.7	(16.8–54.0)
ніколи	3	14.1	(4.5–36.1)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	35	7.5	(5.3–10.5)
часто	53	10.1	(7.7–13.1)
половина	49	9.9	(7.4–13.0)
іноді	39	7.9	(5.7–10.8)
рідко	113	22.5	(18.9–26.7)
ніколи	204	42.1	(37.5–46.9)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			
1-9	142	70.3	(63.4–76.4)
10-29	56	26.5	(20.7–33.3)
30+	7	3.2	(1.5–6.7)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	2	0.9	(0.2–3.4)
2-3	161	75.2	(68.8–80.6)
4-9	31	13.8	(9.7–19.2)
10+	23	10.2	(6.7–15.2)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	6	40.6	(19.0–66.5)
від друзів	9	54.3	(29.5–77.1)
із закладки	1	5.1	(0.7–29.3)
Хтось використав один шприц для ін’єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	486	97.2	(95.1–98.4)
так	13	2.8	(1.6–4.9)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін’єкцій (%)




Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	498	26	4.9 (3.3–7.2)	1.0000	499	18	3.6 (2.2–5.8)	1.0000
Стать									
	чоловік	471	25	4.9 (3.3–7.3)	0.7030	473	16	3.3 (2.0–5.5)	0.1564
	жінка	27	1	3.4 (0.4–22.2)		26	2	9.1 (2.1–31.5)	
Вікова категорія 4									

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<25	17	4	16.3 (5.3–40.4)	0.0678	16	3	25.3 (7.4–58.7)	0.0001
25-34	114	4	3.6 (1.3–9.7)		115	3	2.4 (0.7–7.6)	
35-44	242	14	5.7 (3.3–9.7)		243	6	2.3 (1.0–5.1)	
45+	125	4	2.7 (1.0–7.3)		125	6	4.5 (2.0–9.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	14	1	4.2 (0.5–29.4)	0.8628	14	0	0.0	0.2739
3-5	31	2	3.9 (0.9–16.1)		30	2	6.5 (1.4–25.3)	
6-10	52	2	3.0 (0.7–11.7)		52	3	8.1 (2.4–23.8)	
≥11	401	21	5.2 (3.3–8.0)		403	13	2.9 (1.7–5.0)	
Партнерський статус								
живе сам	337	13	3.6 (2.0–6.3)	0.0636	339	14	3.8 (2.2–6.5)	0.7262
живе з партнером	161	13	7.5 (4.3–12.7)		160	4	3.1 (1.1–8.4)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	105	9	8.0 (4.1–15.0)	0.3988	105	4	4.3 (1.5–11.7)	0.6896
неповний робочий день або тимчасово	308	13	3.6 (2.1–6.3)		309	9	3.0 (1.5–5.7)	
безробітний	39	2	5.3 (1.1–21.6)		39	3	5.9 (1.7–17.9)	
інвалідність	31	2	7.0 (1.5–26.5)		32	1	2.3 (0.3–15.5)	
інші	15	0	0.0		14	1	8.7 (1.0–47.1)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	27	2	7.0 (1.5–27.5)	0.8899	27	3	7.5 (2.2–23.1)	0.6215
3-10 тис	189	11	5.2 (2.8–9.5)		190	8	3.9 (1.9–7.8)	
10-20 тис	213	10	4.7 (2.5–8.8)		213	5	2.6 (1.0–6.3)	
≥20 тис	56	2	3.3 (0.8–12.9)		56	1	3.0 (0.4–18.9)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	314	20	5.8 (3.7–9.0)	0.1710	314	8	3.0 (1.5–6.1)	0.3632
так	184	6	3.1 (1.3–7.0)		185	10	4.6 (2.5–8.6)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	455	24	5.0 (3.3–7.4)	0.6907	456	14	3.2 (1.8–5.4)	0.0776
так	43	2	3.7 (0.9–14.4)		43	4	8.3 (3.0–21.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	478	25	4.8 (3.2–7.1)	0.7301	479	18	3.7 (2.3–6.0)	0.3899
так	20	1	6.7 (0.8–38.3)		20	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	60	4	6.2 (2.2–16.0)	0.6011	60	4	5.6 (2.0–14.7)	0.3500
негативний	438	22	4.7 (3.0–7.1)		439	14	3.3 (1.9–5.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	382	12	3.4 (1.9–6.1)		383	11	2.7 (1.4–5.0)	
стимулятори	46	5	6.6 (2.6–15.8)		45	0	0.0	
опі+стимул	70	9	11.6 (5.9–21.5)		71	7	11.1 (5.3–22.0)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	435	17	4.2 (2.6–6.7)	0.1667	437	16	3.6 (2.2–6.0)	0.9667
стимулятори	61	9	9.6 (4.8–18.1)		60	2	3.6 (0.8–14.3)	
інші	2	0	0.0		2	0	0.0	

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Всього									
	Разом	500	63	12.2 (9.5–15.6)	1.0000	499	72	13.8 (10.9–17.2)	1.0000
Стать									
	чоловік	473	58	12.1 (9.3–15.5)	0.5938	473	62	12.5 (9.7–15.9)	0.0002
	жінка	27	5	15.4 (6.0–34.1)		26	10	40.0 (21.7–61.6)	

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4								
<25	17	4	22.6 (7.0–53.0)	0.0450	16	5	37.5 (14.7–67.6)	0.0160
25-34	115	24	18.7 (12.4–27.2)		115	24	17.5 (11.6–25.6)	
35-44	243	23	9.9 (6.5–14.7)		243	30	12.5 (8.7–17.5)	
45+	125	12	8.8 (4.9–15.4)		125	13	9.3 (5.2–15.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	14	1	3.7 (0.4–27.2)	0.0134	14	3	20.3 (4.9–55.6)	0.1012
3-5	31	5	12.5 (4.7–29.2)		30	5	11.8 (4.4–27.8)	
6-10	52	12	25.8 (14.8–41.0)		52	13	25.3 (14.7–40.0)	
≥11	403	45	10.9 (8.1–14.5)		403	51	12.2 (9.3–15.9)	
Партнерський статус								
живе сам	339	29	8.2 (5.6–11.7)	0.0001	339	35	9.3 (6.7–13.0)	0.0001
живе з партнером	161	34	20.7 (14.9–28.1)		160	37	23.1 (16.8–30.7)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	105	17	16.2 (9.9–25.2)	0.4028	105	19	17.4 (11.0–26.5)	0.4564
неповний робочий день або тимчасово	309	33	10.9 (7.7–15.1)		309	37	11.5 (8.3–15.8)	
безробітний	39	4	8.8 (3.2–22.2)		39	7	15.4 (7.1–30.2)	
інвалідність	32	7	17.2 (7.8–33.8)		32	7	20.1 (9.2–38.5)	
інші	15	2	7.7 (1.6–30.2)		14	2	12.8 (2.5–45.5)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	27	3	8.1 (2.4–24.3)	0.7786	27	6	15.0 (6.2–32.0)	0.9711
3-10 тис	191	27	13.6 (9.3–19.5)		190	28	14.6 (10.1–20.6)	
10-20 тис	213	25	11.6 (7.8–16.9)		213	30	13.6 (9.4–19.3)	
≥20 тис	56	8	14.7 (7.0–28.3)		56	7	12.3 (5.6–25.0)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	315	39	12.4 (9.0–16.8)	0.8897	314	46	14.2 (10.6–18.8)	0.6794

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
	так	185	24	12.0 (7.9–17.6)		185	26	12.9 (8.7–18.6)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	457	55	11.8 (9.0–15.2)	0.3166	456	67	14.2 (11.2–17.9)	0.3238
так	43	8	17.3 (8.2–32.9)		43	5	9.2 (3.7–21.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	480	59	12.0 (9.3–15.4)	0.4506	479	68	13.6 (10.7–17.1)	0.6484
так	20	4	17.7 (5.9–42.5)		20	4	17.2 (5.7–41.8)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	60	15	24.1 (14.4–37.3)	0.0042	60	14	21.2 (12.5–33.7)	0.0775
негативний	440	48	10.6 (7.9–14.0)		439	58	12.7 (9.8–16.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	383	39	9.7 (7.0–13.2)		383	45	11.6 (8.6–15.4)	
стимулятори	46	6	12.9 (5.6–27.0)		45	8	16.8 (8.1–31.5)	
опі+стимул	71	18	26.1 (16.6–38.7)		71	19	23.7 (15.1–35.2)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	437	52	11.5 (8.7–15.0)	0.0392	437	56	12.6 (9.7–16.3)	0.1436
стимулятори	61	10	15.6 (8.2–27.7)		60	15	20.9 (12.3–33.3)	
інші	2	1	66.3 (0.0–100.0)		2	1	33.7 (0.0–100.0)	

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	494	98.7	(96.9–99.4)	27	100.0		467	98.6	(96.7–99.4)	0.5912
N	500			27			473			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	397	81.4	(77.6–84.7)	24	89.8	(71.0–96.9)	373	81.0	(77.0–84.4)	0.2452
N	493			27			466			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	231	47.9	(43.1–52.6)	21	80.1	(60.2–91.4)	210	46.2	(41.3–51.1)	0.0006
N	491			27			464			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	171	71.6	(64.3–77.8)	20	94.2	(66.2–99.3)	151	69.5	(61.9–76.2)	0.0304
N	233			21			212			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	74	33.5	(26.9–40.7)	2	10.7	(2.5–36.0)	72	35.5	(28.6–43.2)	0.0314
N	233			21			212			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	5	2.5	(1.0–6.0)	0	0.0		5	2.8	(1.1–6.5)	0.4887
N	233			21			212			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	2	0.7	(0.2–3.1)	2	8.8	(1.9–32.5)	0	0.0		0.0000
N	233			21			212			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										
так	169	35.4	(30.9–40.2)	8	30.3	(14.8–52.2)	161	35.7	(31.0–40.6)	0.5979
N	484			26			458			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	147	37.9	(32.8–43.3)	7	29.2	(13.5–52.2)	140	38.4	(33.2–44.0)	0.3932
N	397			24			373			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	85	38.5	(31.7–45.8)	7	32.7	(15.1–57.1)	78	39.0	(31.9–46.7)	0.5934
N	231			21			210			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	11	2.4	(1.3–4.5)	4	13.4	(4.6–32.8)	7	1.9	(0.9–4.0)	0.0004
N	493			27			466			
Надавав секс-послуги за гроші										
так	7	1.4	(0.7–3.1)	5	16.9	(6.6–36.8)	2	0.6	(0.2–2.4)	0.0000
N	494			27			467			
Платив за секс коли-небудь										
так	136	27.4	(23.4–31.7)	1	2.9	(0.4–19.9)	135	28.7	(24.5–33.2)	0.0012
N	493			27			466			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	14	10.6	(6.3–17.3)	0	0.0		14	10.6	(6.3–17.4)	0.7338
N	136			1			135			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	254	51.4	(46.6–56.1)	23	86.1	(66.1–95.1)	231	49.5	(44.7–54.4)	0.0000
випадковий	225	45.8	(41.1–50.5)	2	6.9	(1.6–25.5)	223	47.8	(43.0–52.7)	
ком. секс (я заплатив)	12	2.5	(1.4–4.4)	0	0.0		12	2.6	(1.5–4.7)	
ком. секс (мені заплатили)	2	0.4	(0.1–1.5)	2	7.0	(1.5–27.1)	0	0.0		
N	493			27			466			
З ким останнім був секс										
чоловік	27	5.0	(3.4–7.3)	27	100.0		0	0.0		
жінка	466	95.0	(92.7–96.6)	0	0.0		466	100.0		
men and women	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	493			27			466			

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	454	92.6	(89.9–94.6)	27	100.0		427	92.2	(89.3–94.3)	0.1513
N	494			27			467			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	42	8.4	(6.2–11.5)	5	16.3	(6.3–36.0)	37	8.0	(5.7–11.1)	0.1330
N	494			27			467			
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	198	41.5	(36.9–46.3)	8	30.8	(14.9–53.1)	190	42.1	(37.3–47.0)	0.2891
N	494			27			467			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	171	71.6	(64.3–77.8)	20	94.2	(66.2–99.3)	151	69.5	(61.9–76.2)	0.0304
N	233			21			212			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	74	33.5	(26.9–40.7)	2	10.7	(2.5–36.0)	72	35.5	(28.6–43.2)	0.0314
N	233			21			212			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	5	2.5	(1.0–6.0)	0	0.0		5	2.8	(1.1–6.5)	0.4887
N	233			21			212			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	2	0.7	(0.2–3.1)	2	8.8	(1.9–32.5)	0	0.0		0.0000
N	233			21			212			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні										
1	159	95.3	(90.2–97.9)	18	96.7	(77.7–99.6)	141	95.2	(89.4–97.9)	
2-4	7	4.7	(2.1–9.8)	1	3.3	(0.4–22.3)	6	4.8	(2.1–10.6)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	166			19			147			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові										
1	27	35.7	(24.6–48.6)	0	0.0		27	36.7	(25.3–49.9)	0.4427
2-4	36	51.7	(38.5–64.7)	2	100.0		34	50.4	(37.0–63.7)	
5+	9	12.6	(6.0–24.5)	0	0.0		9	12.9	(6.2–25.1)	
N	72			2			70			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: комерційний (я платив)										
1	3	57.2	(18.1–89.0)	0	0.0		3	57.2	(18.1–89.0)	
2-4	2	42.8	(11.0–81.9)	0	0.0		2	42.8	(11.0–81.9)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	5			0			5			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього										
1	165	70.8	(63.4–77.2)	17	85.7	(61.1–95.8)	148	69.4	(61.6–76.3)	0.1504

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
2-4	48	23.1	(17.2–30.3)	1	5.1	(0.6–31.0)	47	24.7	(18.3–32.3)	
5+	13	6.2	(3.4–11.1)	2	9.2	(2.0–33.6)	11	5.9	(3.0–11.2)	
N	226			20			206			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	484	315	64.6 (59.8–69.1)	169	35.4 (30.9–40.2)	1.0000
Стать							
	чоловік	458	297	64.3 (59.4–69.0)	161	35.7 (31.0–40.6)	0.5979
	жінка	26	18	69.7 (47.8–85.2)	8	30.3 (14.8–52.2)	
Вікова категорія 4							
	<25	13	6	51.5 (22.8–79.2)	7	48.5 (20.8–77.2)	0.0024
	25-34	114	72	60.8 (49.8–70.8)	42	39.2 (29.2–50.2)	
	35-44	234	141	59.2 (52.4–65.6)	93	40.8 (34.4–47.6)	
	45+	123	96	80.1 (71.9–86.4)	27	19.9 (13.6–28.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	12	8	76.6 (44.4–93.0)	4	23.4 (7.0–55.6)	0.1612
	3-5	30	18	48.8 (27.3–70.7)	12	51.2 (29.3–72.7)	
	6-10	50	27	56.8 (42.1–70.4)	23	43.2 (29.6–57.9)	
	≥11	392	262	66.6 (61.5–71.3)	130	33.4 (28.7–38.5)	
Партнерський статус							
	живе сам	324	201	61.5 (55.5–67.2)	123	38.5 (32.8–44.5)	0.0635
	живе з партнером	160	114	70.7 (62.7–77.7)	46	29.3 (22.3–37.3)	
Поточний статус зайнятості							
	повний робочий день	103	71	64.4 (52.4–74.8)	32	35.6 (25.2–47.6)	0.0442
	неповний робочий день або тимчасово	304	199	66.5 (60.8–71.8)	105	33.5 (28.2–39.2)	
	безробітний	34	25	74.2 (55.6–86.9)	9	25.8 (13.1–44.4)	
	інвалідність	29	12	37.2 (21.0–56.9)	17	62.8 (43.1–79.0)	
	інші	14	8	57.0 (28.0–81.9)	6	43.0 (18.1–72.0)	
Категорія місячного доходу							
	<3 тис	27	18	65.9 (44.0–82.6)	9	34.1 (17.4–56.0)	0.4524

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
	3-10 тис	184	110	60.2 (52.6–67.3)	74	39.8 (32.7–47.4)	
	10-20 тис	206	145	68.9 (61.1–75.8)	61	31.1 (24.2–38.9)	
	≥20 тис	56	38	67.0 (52.2–79.1)	18	33.0 (20.9–47.8)	
Був позбавлений волі будь-коли							
	ні	307	198	64.0 (57.9–69.8)	109	36.0 (30.2–42.1)	0.7565
	так	177	117	65.5 (57.8–72.6)	60	34.5 (27.4–42.2)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	441	282	63.7 (58.6–68.4)	159	36.3 (31.6–41.4)	0.2097
так	43	33	74.1 (57.1–86.1)	10	25.9 (13.9–42.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	464	304	65.1 (60.2–69.7)	160	34.9 (30.3–39.8)	0.2515
так	20	11	51.9 (28.7–74.3)	9	48.1 (25.7–71.3)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	57	29	50.0 (36.1–63.8)	28	50.0 (36.2–63.9)	0.0219
негативний	427	286	66.6 (61.5–71.3)	141	33.4 (28.7–38.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	371	242	64.8 (59.3–70.0)	129	35.2 (30.0–40.7)	
стимулятори	43	25	58.6 (41.8–73.6)	18	41.4 (26.4–58.2)	
опі+стимул	70	48	67.2 (54.3–78.0)	22	32.8 (22.0–45.7)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	425	281	65.3 (60.2–70.1)	144	34.7 (29.9–39.8)	0.3811
стимулятори	57	32	58.2 (43.7–71.4)	25	41.8 (28.6–56.3)	

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
інші	2	2	100.0	0	0.0	

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										
так	56	32.5	(25.5–40.3)	6	28.6	(12.1–53.7)	50	32.9	(25.5–41.3)	0.7088
N	171			20			151			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	30	45.0	(32.1–58.6)	1	54.2	(6.1–95.6)	29	44.7	(31.6–58.6)	0.7915
N	74			2			72			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	4	76.2	(26.2–96.7)	0	0.0		4	76.2	(26.2–96.7)	
N	5			0			5			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	45	27.5	(20.9–35.2)	4	22.2	(7.9–48.7)	41	28.1	(21.1–36.4)	0.7493
часто	7	2.8	(1.3–5.9)	2	6.4	(1.4–24.1)	5	2.4	(1.0–5.7)	
половина	2	1.3	(0.3–5.4)	0	0.0		2	1.5	(0.4–6.1)	
іноді	5	2.9	(1.2–7.2)	1	3.9	(0.5–25.3)	4	2.8	(1.0–7.6)	
рідко	6	4.2	(1.8–9.5)	2	8.7	(2.0–31.5)	4	3.7	(1.4–9.6)	
ніколи	106	61.2	(53.3–68.7)	11	58.8	(34.9–79.1)	95	61.5	(53.0–69.4)	
N	171			20			151			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	27	40.7	(28.0–54.8)	1	54.2	(6.1–95.6)	26	40.3	(27.4–54.8)	0.0900
часто	2	2.7	(0.6–11.0)	0	0.0		2	2.8	(0.6–11.3)	
половина	4	5.0	(1.8–12.8)	0	0.0		4	5.1	(1.9–13.1)	
іноді	3	4.1	(1.3–12.1)	1	45.8	(4.4–93.9)	2	3.0	(0.7–11.2)	
рідко	6	7.7	(3.4–16.7)	0	0.0		6	7.9	(3.5–17.1)	
ніколи	32	39.8	(28.3–52.6)	0	0.0		32	40.9	(29.0–53.9)	
N	74			2			72			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

			Результат тесту на ВІЛ				
		N	позитивний		негативний		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	60	12.4 (9.6–15.9)	440	87.6 (84.1–90.4)	1.0000
Стать							
	чоловік	473	53	11.8 (9.0–15.4)	420	88.2 (84.6–91.0)	0.0896
	жінка	27	7	22.9 (10.5–42.8)	20	77.1 (57.2–89.5)	

		Результат тесту на ВІЛ			
	N	позитивний		негативний	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	17	0	0.0	17	100.0	0.0745
25-34	115	10	7.1 (3.7–13.2)	105	92.9 (86.8–96.3)	
35-44	243	32	14.1 (10.0–19.6)	211	85.9 (80.4–90.0)	
45+	125	18	16.1 (10.0–25.0)	107	83.9 (75.0–90.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	14	0	0.0	14	100.0	0.4392
3-5	31	3	8.6 (2.4–26.0)	28	91.4 (74.0–97.6)	
6-10	52	6	11.2 (4.9–23.6)	46	88.8 (76.4–95.1)	
≥11	403	51	13.4 (10.1–17.5)	352	86.6 (82.5–89.9)	
Партнерський статус						
живе сам	339	41	12.4 (9.0–16.7)	298	87.6 (83.3–91.0)	0.9710
живе з партнером	161	19	12.5 (7.9–19.2)	142	87.5 (80.8–92.1)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	105	5	4.2 (1.7–10.0)	100	95.8 (90.0–98.3)	0.0000
неповний робочий день або тимчасово	309	34	12.2 (8.6–16.9)	275	87.8 (83.1–91.4)	
безробітний	39	7	17.6 (8.2–34.0)	32	82.4 (66.0–91.8)	
інвалідність	32	14	42.9 (25.9–61.7)	18	57.1 (38.3–74.1)	
інші	15	0	0.0	15	100.0	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	27	8	34.3 (16.6–57.7)	19	65.7 (42.3–83.4)	0.0082
3-10 тис	191	22	11.0 (7.3–16.4)	169	89.0 (83.6–92.7)	
10-20 тис	213	22	9.6 (6.2–14.4)	191	90.4 (85.6–93.8)	
≥20 тис	56	6	14.0 (6.2–28.5)	50	86.0 (71.5–93.8)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	315	25	8.3 (5.5–12.4)	290	91.7 (87.6–94.5)	0.0006
так	185	35	19.9 (14.3–26.9)	150	80.1 (73.1–85.7)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	457	50	11.4 (8.6–15.0)	407	88.6 (85.0–91.4)	0.0397
так	43	10	23.0 (12.1–39.4)	33	77.0 (60.6–87.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	480	55	11.9 (9.1–15.4)	425	88.1 (84.6–90.9)	0.1186
так	20	5	23.9 (9.3–49.1)	15	76.1 (50.9–90.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	383	48	12.7 (9.5–16.8)	335	87.3 (83.2–90.5)	
стимулятори	46	2	6.7 (1.6–23.9)	44	93.3 (76.1–98.4)	
опі+стимул	71	10	14.6 (7.7–26.1)	61	85.4 (73.9–92.3)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	437	57	12.9 (9.9–16.5)	380	87.1 (83.5–90.1)	0.7398
стимулятори	61	3	9.5 (3.0–26.4)	58	90.5 (73.6–97.0)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)




Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)




Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
		N	ні		так	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	457	91.6 (88.7–93.8)	43	8.4 (6.2–11.3)	1.0000
Стать							
	чоловік	473	433	91.8 (88.8–94.0)	40	8.2 (6.0–11.2)	0.6207
	жінка	27	24	88.9 (67.3–96.9)	3	11.1 (3.1–32.7)	

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	17	14	86.6 (62.0–96.2)	3	13.4 (3.8–38.0)	0.0963
25-34	115	104	91.4 (84.6–95.4)	11	8.6 (4.6–15.4)	
35-44	243	229	94.5 (90.6–96.8)	14	5.5 (3.2–9.4)	
45+	125	110	87.0 (79.1–92.2)	15	13.0 (7.8–20.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	14	14	100.0	0	0.0	0.6186
3-5	31	28	93.4 (79.7–98.1)	3	6.6 (1.9–20.3)	
6-10	52	47	89.4 (76.1–95.7)	5	10.6 (4.3–23.9)	
≥11	403	368	91.4 (88.1–93.9)	35	8.6 (6.1–11.9)	
Партнерський статус						
живе сам	339	303	89.8 (86.0–92.7)	36	10.2 (7.3–14.0)	0.0549
живе з партнером	161	154	95.4 (90.1–97.9)	7	4.6 (2.1–9.9)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	105	102	97.4 (92.1–99.2)	3	2.6 (0.8–7.9)	0.0236
неповний робочий день або тимчасово	309	283	91.3 (87.2–94.1)	26	8.7 (5.9–12.8)	
безробітний	39	32	82.4 (65.7–92.0)	7	17.6 (8.0–34.3)	
інвалідність	32	26	84.6 (68.1–93.4)	6	15.4 (6.6–31.9)	
інші	15	14	93.4 (60.2–99.2)	1	6.6 (0.8–39.8)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	27	21	77.0 (55.3–90.0)	6	23.0 (10.0–44.7)	0.0186
3-10 тис	191	173	90.5 (85.1–94.1)	18	9.5 (5.9–14.9)	
10-20 тис	213	200	94.9 (91.2–97.1)	13	5.1 (2.9–8.8)	
≥20 тис	56	51	90.1 (77.3–96.1)	5	9.9 (3.9–22.7)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	315	291	93.0 (89.6–95.4)	24	7.0 (4.6–10.4)	0.1434
так	185	166	89.1 (83.0–93.1)	19	10.9 (6.9–17.0)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	480	443	92.5 (89.7–94.7)	37	7.5 (5.3–10.3)	0.0012
так	20	14	71.3 (46.1–87.9)	6	28.7 (12.1–53.9)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	60	50	84.5 (72.1–92.0)	10	15.5 (8.0–27.9)	0.0397
негативний	440	407	92.6 (89.7–94.8)	33	7.4 (5.2–10.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	383	349	91.8 (88.6–94.2)	34	8.2 (5.8–11.4)	
стимулятори	46	42	89.9 (74.3–96.5)	4	10.1 (3.5–25.7)	
опі+стимул	71	66	92.0 (81.0–96.9)	5	8.0 (3.1–19.0)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	437	401	92.2 (89.1–94.4)	36	7.8 (5.6–10.9)	0.5187
стимулятори	61	54	87.8 (75.4–94.4)	7	12.2 (5.6–24.6)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	91.2	90.8	94.0	0.3998
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	51.4	49.8	62.7	0.0753

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
невиявлений = непередаваний	53.3	51.8	63.3	0.1075
ПКП знижує ризик	52.5	51.6	58.7	0.3213
АРТ слід починати негайно	85.5	85.0	88.7	0.4369
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	67.7	67.5	69.3	0.7883
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	66.2	66.0	68.1	0.7552
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	91.1	90.9	92.1	0.7572
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	96.1	96.7	92.0	0.1111
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	91.0	91.6	86.9	0.2511
лікування слід починати негайно	86.3	85.3	93.4	0.1021
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	67.6	67.9	65.3	0.7045
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	29.2	30.4	20.3	0.0991
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	88.3	88.3	88.3	0.9994
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	92.1	92.5	89.5	0.4177
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	70.3	69.4	76.2	0.2952
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	2.7	2.7	3.0	0.8963
лікування слід починати негайно	87.2	86.0	95.7	0.0264
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	68.6	68.9	66.3	0.7018
ВГС на 100% передається від матері до дитини	27.7	27.8	27.0	0.8925
ВГС передається через кров і статевим шляхом	85.8	85.7	86.7	0.8494
лікування ВГС не існує	65.6	65.3	68.2	0.6705
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	62.0	62.0	62.1	0.9801
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	91.3	91.8	88.4	0.4103

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	372	75.6	(71.4–79.3)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	351	69.7	(65.2–73.9)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	89	25.4	(20.8–30.6)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	46	12.9	(9.6–17.1)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	347	99.0	(97.4–99.6)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	322	93.8	(90.6–96.0)
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	29	8.4	(5.8–12.1)
негативний	294	91.6	(87.9–94.2)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	96	29.7	(24.6–35.3)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	0	0.0	
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	92	60.0	(51.9–67.6)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	3	3.1	(0.9–9.7)
негативний	82	91.2	(83.9–95.4)
не може розкрити	7	5.7	(2.6–11.8)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	341	252	74.6 (69.4–79.2)	89	25.4 (20.8–30.6)	1.0000
Стать							
	чоловік	317	237	75.4 (70.1–80.1)	80	24.6 (19.9–29.9)	0.1976
	жінка	24	15	62.7 (39.9–81.0)	9	37.3 (19.0–60.1)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	6	3	45.8 (11.6–84.6)	3	54.2 (15.4–88.4)	0.0081
25-34	66	42	66.1 (52.4–77.5)	24	33.9 (22.5–47.6)	
35-44	181	133	72.7 (65.3–79.1)	48	27.3 (20.9–34.7)	
45+	88	74	87.6 (79.5–92.7)	14	12.4 (7.3–20.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	10	5	46.1 (15.8–79.6)	5	53.9 (20.4–84.2)	0.0946
3-5	16	9	67.9 (38.0–87.9)	7	32.1 (12.1–62.0)	
6-10	31	19	63.3 (44.4–78.7)	12	36.7 (21.3–55.6)	
≥11	284	219	77.4 (71.8–82.1)	65	22.6 (17.9–28.2)	
Партнерський статус						
живе сам	226	169	76.3 (70.0–81.6)	57	23.7 (18.4–30.0)	0.3472
живе з партнером	115	83	71.3 (61.5–79.4)	32	28.7 (20.6–38.5)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	66	52	79.8 (67.5–88.3)	14	20.2 (11.7–32.5)	0.0605
неповний робочий день або тимчасово	215	164	77.0 (70.5–82.4)	51	23.0 (17.6–29.5)	
безробітний	29	19	63.7 (42.9–80.4)	10	36.3 (19.6–57.1)	
інвалідність	22	11	50.5 (28.9–71.9)	11	49.5 (28.1–71.1)	
інші	9	6	71.3 (33.5–92.5)	3	28.7 (7.5–66.5)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	22	16	80.0 (58.8–91.8)	6	20.0 (8.2–41.2)	0.8472
3-10 тис	134	101	76.4 (68.1–83.1)	33	23.6 (16.9–31.9)	
10-20 тис	135	100	74.7 (66.0–81.8)	35	25.3 (18.2–34.0)	
≥20 тис	43	32	70.9 (54.1–83.4)	11	29.1 (16.6–45.9)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	189	148	78.7 (71.8–84.3)	41	21.3 (15.7–28.2)	0.0582
так	152	104	69.1 (60.9–76.3)	48	30.9 (23.7–39.1)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	306	232	76.9 (71.5–81.5)	74	23.1 (18.5–28.5)	0.0055
так	35	20	53.9 (36.2–70.7)	15	46.1 (29.3–63.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	322	245	77.0 (71.8–81.5)	77	23.0 (18.5–28.2)	0.0001
так	19	7	36.3 (16.8–61.6)	12	63.7 (38.4–83.2)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	52	33	66.0 (51.2–78.2)	19	34.0 (21.8–48.8)	0.1392
негативний	289	219	76.2 (70.6–81.0)	70	23.8 (19.0–29.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	266	196	74.5 (68.5–79.7)	70	25.5 (20.3–31.5)	
стимулятори	18	13	72.0 (46.4–88.5)	5	28.0 (11.5–53.6)	
опі+стимул	57	43	76.0 (62.3–85.9)	14	24.0 (14.1–37.7)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	315	233	74.6 (69.1–79.3)	82	25.4 (20.7–30.9)	0.8653
стимулятори	25	18	74.3 (53.1–88.0)	7	25.7 (12.0–46.9)	
інші	1	1	100.0	0	0.0	

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	60	40.0 (28.0–53.3)	1.0000	27	89.7 (71.4–96.8)	1.0000	24	16	69.5 (48.8–84.5)	1.0000
Стать											
	чоловік	53	38.4 (26.0–52.6)	0.4032	23	90.9 (69.5–97.8)	0.5296	21	13	65.6 (43.5–82.6)	0.2309
	жінка	7	55.2 (20.1–85.8)		4	81.0 (28.4–97.9)		3	3	100.0	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4										
<25	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
25-34	10	71.1 (37.3–91.0)		7	77.1 (38.2–94.8)		5	5	100.0	
35-44	32	38.2 (23.0–56.1)		14	100.0		14	8	60.7 (34.3–82.0)	
45+	18	29.2 (12.5–54.3)		6	80.1 (31.1–97.3)		5	3	62.4 (19.8–91.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
3-5	3	26.9 (2.8–82.2)		1	0.0		0	0	0.0	
6-10	6	38.5 (10.7–76.5)		3	72.5 (18.3–96.9)		2	2	100.0	
≥11	51	40.9 (27.8–55.4)		23	94.8 (70.7–99.3)		22	14	67.2 (45.6–83.4)	
Партнерський статус										
живе сам	41	31.6 (19.1–47.6)	0.0765	15	85.1 (55.5–96.3)	0.3426	13	8	64.3 (36.1–85.2)	0.5792
живе з партнером	19	57.1 (33.2–78.1)		12	94.9 (70.1–99.3)		11	8	74.8 (43.5–92.0)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	5	15.1 (1.9–62.1)		1	100.0		1	0	0.0	
неповний робочий день або тимчасово	34	36.1 (21.5–53.9)		14	85.1 (55.3–96.4)		12	10	84.1 (53.1–96.1)	
безробітний	7	49.9 (17.1–82.8)		4	82.4 (31.1–98.0)		3	2	70.0 (16.3–96.5)	
інвалідність	14	54.0 (26.7–79.1)		8	100.0		8	4	54.0 (20.8–84.0)	
інші	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Категорія місячного доходу										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	8	36.0 (10.7–72.5)	0.9928	4	100.0	0.7094	4	3	77.4 (23.9–97.4)	0.4364
3-10 тис	22	39.1 (21.1–60.6)		9	85.6 (42.1–98.0)		8	4	49.4 (19.1–80.2)	
10-20 тис	22	41.6 (22.8–63.1)		10	93.0 (62.1–99.1)		9	6	67.6 (33.3–89.7)	
≥20 тис	6	41.5 (11.8–79.0)		3	77.5 (22.8–97.6)		2	2	100.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	25	31.3 (16.2–51.9)	0.2473	9	83.3 (50.0–96.1)	0.4446	7	4	59.9 (24.3–87.4)	0.4942
так	35	46.7 (30.2–63.9)		18	93.0 (63.3–99.0)		17	12	74.0 (49.3–89.3)	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	50	37.5 (24.9–52.0)	0.3798	21	89.9 (67.0–97.5)	0.9145	19	12	67.1 (43.8–84.2)	0.6201
так	10	53.5 (22.3–82.2)		6	88.6 (45.6–98.6)		5	4	78.9 (27.7–97.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	55	38.1 (25.9–51.9)	0.3208	24	88.2 (68.0–96.3)	0.5102	21	14	69.6 (47.3–85.3)	0.9837
так	5	61.2 (18.3–91.8)		3	100.0		3	2	69.0 (14.1–96.8)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	60	40.0 (27.8–53.5)		27	89.7 (70.9–96.9)		24	16	69.5 (48.4–84.7)	
негативний	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	р-значення	N	% (ДІ)	р-значення	N	n	% (ДІ)	р-значення
опіоїди	48	47.7 (33.3–62.5)		25	92.5 (73.0–98.3)		23	15	68.5 (47.3–84.0)	
стимулятори	2	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
опі+стимул	10	15.5 (3.6–47.7)		2	46.7 (4.9–93.6)		1	1	100.0	
інші	0			0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	57	44.3 (31.6–57.8)		27	89.7 (71.4–96.8)		24	16	69.5 (48.8–84.5)	
стимулятори	3	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
інші	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	1	6.2	(0.9–33.2)
1-2 тижні тому	0	0.0	
3-4 тижні тому	0	0.0	
1-3 місяці тому	3	14.7	(4.7–37.2)
ніколи	20	79.1	(55.8–91.9)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	1	23.7	(3.0–75.4)
ліків не було	3	76.3	(24.6–97.0)
був під впливом	0	0.0	
не хотів, щоб інші бачили	0	0.0	
інші	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	0	0.0	
відсутність часу на відвідування клініки	2	19.6	(4.5–55.5)
відсутність мотивації відвідувати клініку	3	27.3	(8.0–61.9)
пропуск візиту, важко повернутися	1	8.6	(1.1–43.9)
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	1	9.9	(1.3–48.2)
вживання наркотиків	1	21.6	(3.1–70.0)
побічні ефекти або ускладнення	0	0.0	
немає розуміння як	1	8.6	(1.1–43.9)
втрачено або продано всі АРВ-препарати	0	0.0	
Причини відмови від ДРТ			
вживання алкоголю	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
довго чекав і пішов	0	0.0	
Час на АРТ			

	n	%	ДІ
≤3м	1	12.7	(1.7–54.8)
4-24м	2	29.7	(7.4–69.2)
25-60м	2	16.4	(3.7–49.8)
5 років +	3	41.1	(13.5–75.8)

9. Доконтактна профілактика




Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

			Використання ДКП протягом останніх 12 місяців					
		N	приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Всього								
	Разом	500	1	0.1 (0.0–0.8)	45	9.1 (6.8–12.1)	454	90.8 (87.8–93.1)
Стать								
	чоловік	473	1	0.1 (0.0–0.9)	43	9.2 (6.8–12.3)	429	90.7 (87.6–93.1)
	жінка	27	0	0.0	2	7.6 (1.7–28.0)	25	92.4 (72.0–98.3)
Вікова категорія 4								
	<25	17	0	0.0	2	8.7 (1.9–32.6)	15	91.3 (67.4–98.1)
	25-34	115	0	0.0	13	11.6 (6.6–19.7)	102	88.4 (80.3–93.4)
	35-44	243	1	0.2 (0.0–1.8)	18	7.0 (4.4–11.1)	224	92.7 (88.6–95.4)
	45+	125	0	0.0	12	10.6 (6.0–18.0)	113	89.4 (82.0–94.0)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
	≤2	14	0	0.0	1	12.0 (1.4–56.6)	13	88.0 (43.4–98.6)
	3-5	31	0	0.0	3	7.5 (2.2–22.9)	28	92.5 (77.1–97.8)
	6-10	52	0	0.0	4	7.0 (2.5–18.1)	48	93.0 (81.9–97.5)
	≥11	403	1	0.1 (0.0–1.1)	37	9.4 (6.8–12.8)	365	90.5 (87.0–93.1)
Партнерський статус								
	живе сам	339	1	0.2 (0.0–1.2)	21	6.0 (3.9–9.1)	317	93.8 (90.7–96.0)
	живе з партнером	161	0	0.0	24	15.6 (10.4–22.6)	137	84.4 (77.4–89.6)
Поточний статус зайнятості								

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців					
	N	приймає зараз		ніколи не приймав		не знає що це	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
повний робочий день	105	0	0.0	15	14.6 (8.6–23.6)	90	85.4 (76.4–91.4)
неповний робочий день або тимчасово	309	1	0.2 (0.0–1.4)	24	7.5 (5.0–11.1)	284	92.3 (88.7–94.8)
безробітний	39	0	0.0	3	8.2 (2.5–24.1)	36	91.8 (75.9–97.5)
інвалідність	32	0	0.0	1	3.0 (0.4–19.8)	31	97.0 (80.2–99.6)
інші	15	0	0.0	2	14.5 (3.1–46.8)	13	85.5 (53.2–96.9)
Категорія місячного доходу							
<3 тис	27	0	0.0	2	5.7 (1.3–22.0)	25	94.3 (78.0–98.7)
3-10 тис	191	0	0.0	9	4.9 (2.5–9.4)	182	95.1 (90.6–97.5)
10-20 тис	213	1	0.3 (0.0–2.0)	27	12.4 (8.5–17.9)	185	87.3 (81.8–91.3)
≥20 тис	56	0	0.0	6	11.7 (5.1–24.6)	50	88.3 (75.4–94.9)
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	315	0	0.0	33	10.2 (7.2–14.3)	282	89.8 (85.7–92.8)
так	185	1	0.3 (0.0–2.4)	12	7.0 (3.9–12.2)	172	92.7 (87.5–95.8)

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців					
	N	приймає зараз		приймав в минулому	ніколи не приймав	не знає що це	
		n	% (ДІ)	% (ДІ)	n % (ДІ)	n	% (ДІ)
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	457	0	0.0	0.0	35 7.8 (5.5–10.8)	422	92.2 (89.2–94.5)
так	43	1	1.4 (0.2–10.0)	0.0	10 23.4 (12.6–39.2)	32	75.2 (59.4–86.3)
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	480	1	0.1 (0.0–0.9)	0.0	42 8.7 (6.4–11.7)	437	91.2 (88.1–93.5)
так	20	0	0.0	0.0	3 17.9 (5.4–45.5)	17	82.1 (54.5–94.6)
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	60	1	1.0 (0.1–6.8)	0.0	4 7.5 (2.8–18.9)	55	91.5 (80.3–96.6)
негативний	440	0	0.0	0.0	41 9.3 (6.8–12.6)	399	90.7 (87.4–93.2)
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
опіоїди	383	1	0.2 (0.0–1.1)	0.0	38 9.7 (7.1–13.3)	344	90.1 (86.5–92.8)
стимулятори	46	0	0.0	0.0	3 8.1 (2.4–23.7)	43	91.9 (76.3–97.6)
опі+стимул	71	0	0.0	0.0	4 6.1 (2.2–15.9)	67	93.9 (84.1–97.8)
інші	0	0			0	0	

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців						
	N	приймає зараз		приймав в минулому	ніколи не приймав		не знає що це	
		n	% (ДІ)	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	437	1	0.1 (0.0–1.0)	0.0	40	9.1 (6.6–12.3)	396	90.8 (87.5–93.2)
стимулятори	61	0	0.0	0.0	5	9.3 (3.7–21.5)	56	90.7 (78.5–96.3)
інші	2	0	0.0	0.0	0	0.0	2	100.0

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	1	0.1	(0.0–0.8)
приймав в минулому	0	0.0	
ніколи не приймав	45	9.1	(6.8–12.1)
не знає що це	454	90.8	(87.8–93.1)
Обізнаність про ДКП			
ні	454	90.8	(87.8–93.1)
так	46	9.2	(6.9–12.2)
Використання ДКП зараз			
ні	499	99.9	(99.2–100.0)
так	1	0.1	(0.0–0.8)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	45	98.7	(91.3–99.8)
так	1	1.3	(0.2–8.7)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)




Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)




Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	1	19.0	(2.3–69.9)
клініка закрита після лютого 2022 року	0	0.0	
слабкий або відсутній ефект	0	0.0	
побічні ефекти	0	0.0	
не хочу відвідувати клініку	1	17.4	(2.1–67.6)
не хочу кидати наркотики	0	0.0	
важко дістатися до клініки	1	26.7	(3.5–78.6)
не потребує	0	0.0	
не подобається ставлення лікаря	1	36.9	(5.6–85.1)
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	0	0.0	
не змінилось	4	100.0	

	n	%	ДІ
зменшилося	0	0.0	
Чи купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	186	37.6	(33.1–42.3)
так, бупренорфін	63	12.2	(9.5–15.5)
не купував	248	50.2	(45.5–54.9)
Де купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	248	50.2	(45.5–54.9)
купляв на чорн. ринку	247	49.5	(44.8–54.3)
купляв в приватній клініці	2	0.3	(0.1–1.0)
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорн.ринку			
ін'єкційно	234	94.6	(90.8–96.8)
ін'єкційно у суміші	6	2.3	(1.0–5.3)
ковтав або розсмоктував	7	2.6	(1.1–5.7)
нюхав	2	0.6	(0.1–2.3)

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	20	4.3 (2.7–6.6)	3	0.4 (0.1–1.2)	164	30.4 (26.4–34.7)	313	65.0 (60.5–69.2)	1.0000
Стать										
чоловік	473	19	4.4 (2.7–6.9)	3	0.4 (0.1–1.3)	157	30.8 (26.6–35.2)	294	64.5 (59.8–68.9)	0.6330
жінка	27	1	2.2 (0.3–15.5)	0	0.0	7	22.9 (10.5–42.9)	19	74.9 (54.9–88.0)	
Вікова категорія 4										
<25	17	0	0.0	0	0.0	2	9.3 (2.0–34.1)	15	90.7 (65.9–98.0)	0.1563
25-34	115	4	3.5 (1.2–9.7)	1	0.7 (0.1–4.7)	33	24.2 (17.1–33.0)	77	71.6 (62.3–79.3)	
35-44	243	13	5.4 (3.1–9.4)	2	0.5 (0.1–1.9)	78	30.7 (25.0–37.0)	150	63.4 (56.9–69.4)	
45+	125	3	3.3 (1.0–9.8)	0	0.0	51	39.0 (30.4–48.3)	71	57.7 (48.4–66.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	14	0	0.0	0	0.0	2	9.0 (1.8–35.1)	12	91.0 (64.9–98.2)	0.0260
3-5	31	3	8.3 (2.3–25.5)	0	0.0	6	14.2 (5.8–30.8)	22	77.5 (58.4–89.4)	
6-10	52	2	2.5 (0.6–10.2)	1	1.2 (0.2–8.4)	9	16.7 (8.5–30.1)	40	79.6 (66.2–88.6)	
≥11	403	15	4.3 (2.5–7.1)	2	0.3 (0.1–1.4)	147	34.4 (29.7–39.3)	239	61.0 (55.9–65.9)	
Партнерський статус										

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	339	13	4.1 (2.3–7.0)	3	0.6 (0.2–1.8)	115	31.3 (26.4–36.7)	208	64.0 (58.5–69.2)	0.6729
живе з партнером	161	7	4.6 (2.1–9.9)	0	0.0	49	28.4 (21.8–36.1)	105	67.0 (59.0–74.1)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	105	3	3.1 (1.0–9.4)	0	0.0	30	24.6 (17.0–34.1)	72	72.3 (62.5–80.4)	0.2208
неповний робочий день або тимчасово	309	9	3.3 (1.7–6.5)	3	0.6 (0.2–2.1)	112	34.8 (29.5–40.5)	185	61.2 (55.4–66.7)	
безробітний	39	4	11.6 (4.1–28.6)	0	0.0	9	19.5 (9.8–35.0)	26	68.9 (51.7–82.1)	
інвалідність	32	3	8.8 (2.7–25.5)	0	0.0	9	24.6 (12.4–43.0)	20	66.6 (47.9–81.2)	
інші	15	1	3.7 (0.4–26.3)	0	0.0	4	24.6 (8.3–54.0)	10	71.7 (42.9–89.5)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	27	1	3.3 (0.4–21.6)	0	0.0	4	10.9 (3.8–27.7)	22	85.8 (68.0–94.5)	0.2756
3-10 тис	191	8	4.3 (2.0–8.9)	0	0.0	75	36.8 (30.0–44.1)	108	58.9 (51.5–66.0)	
10-20 тис	213	8	4.4 (2.2–8.7)	3	0.9 (0.3–2.9)	65	28.9 (23.0–35.7)	137	65.7 (58.7–72.2)	
≥20 тис	56	2	3.8 (0.9–14.6)	0	0.0	18	29.3 (18.5–43.2)	36	66.9 (52.8–78.5)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	315	8	2.3 (1.1–4.7)	2	0.4 (0.1–1.7)	92	26.7 (22.0–32.0)	213	70.6 (65.1–75.5)	0.0006
так	185	12	7.8 (4.4–13.6)	1	0.3 (0.0–2.4)	72	37.1 (30.1–44.6)	100	54.7 (47.1–62.2)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	457	14	3.3 (1.9–5.7)	2	0.3 (0.1–1.3)	148	30.0 (25.9–34.6)	293	66.3 (61.7–70.7)	0.0021
так	43	6	14.6 (6.3–30.1)	1	1.3 (0.2–9.2)	16	33.9 (20.9–49.9)	20	50.2 (34.5–65.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	480	0	0.0	3	0.4 (0.1–1.3)	164	31.7 (27.6–36.2)	313	67.9 (63.4–72.0)	0.0000

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
так	20	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	60	5	8.2 (3.3–19.0)	0	0.0	20	28.8 (18.6–41.8)	35	63.0 (49.5–74.7)	0.3714
негативний	440	15	3.7 (2.2–6.2)	3	0.4 (0.1–1.4)	144	30.6 (26.3–35.2)	278	65.3 (60.5–69.8)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	383	17	5.0 (3.0–8.0)	3	0.5 (0.2–1.6)	134	32.6 (27.9–37.7)	229	61.9 (56.7–66.9)	
стимулятори	46	0	0.0	0	0.0	7	11.7 (5.4–23.7)	39	88.3 (76.3–94.6)	
опі+стимул	71	3	3.3 (1.0–10.2)	0	0.0	23	31.4 (21.1–43.8)	45	65.4 (52.9–76.0)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	437	20	4.9 (3.1–7.6)	3	0.5 (0.1–1.4)	154	33.2 (28.7–37.9)	260	61.5 (56.6–66.2)	
стимулятори	61	0	0.0	0	0.0	10	12.4 (6.5–22.4)	51	87.6 (77.6–93.5)	
інші	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	




Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)




Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

		n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь				
	так	211	42.0	(37.4–46.7)
Кількість передозувань протягом життя				
	1	56	28.2	(22.1–35.3)
	2-4	92	45.8	(38.6–53.2)
	5+	51	26.0	(20.0–33.0)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	так	31	6.4	(4.4–9.3)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)				
	так	31	15.3	(10.7–21.5)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців				
	1	18	61.6	(41.5–78.4)

	n	%	ДІ
2-4	10	35.6	(19.4–56.0)
5+	1	2.8	(0.4–17.7)
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)			
метадон	16	82.4	(60.0–93.6)
інші опіоїди	2	10.3	(2.5–33.7)
стимулятор	1	4.3	(0.6–25.4)
інші	1	3.1	(0.4–19.3)
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)			
метадон+стимулятор	2	63.3	(13.3–95.1)
метадон+барбіт. або димедр.	0	0.0	
метадон+інше	0	0.0	
інші	1	36.7	(4.9–86.7)
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)			
метадон	5	45.5	(15.0–79.7)
інші опіоїди	1	15.1	(2.0–60.5)
стимулятор	2	39.4	(10.0–79.2)
інші	0	0.0	
Знання та досвід налоксону			
ніколи не чув	148	31.5	(27.1–36.2)
знає, але не користувався	301	58.1	(53.3–62.7)
користувався	37	7.7	(5.5–10.7)
користувались друзі	13	2.5	(1.4–4.4)
користувався сам та друзі	1	0.2	(0.0–1.2)

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	494	463	93.6 (90.7–95.6)	31	6.4 (4.4–9.3)	1.0000
Стать						
чоловік	467	436	93.2 (90.3–95.3)	31	6.8 (4.7–9.7)	0.1990
жінка	27	27	100.0	0	0.0	
Вікова категорія 4						
<25	17	17	100.0	0	0.0	0.2421
25-34	114	105	90.8 (82.1–95.5)	9	9.2 (4.5–17.9)	
35-44	238	221	92.9 (88.6–95.7)	17	7.1 (4.3–11.4)	
45+	125	120	96.7 (91.9–98.7)	5	3.3 (1.3–8.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	14	13	88.0 (43.4–98.6)	1	12.0 (1.4–56.6)	0.3611

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	31	28	86.0 (60.3–96.2)	3	14.0 (3.8–39.7)	
6-10	50	48	96.1 (84.8–99.1)	2	3.9 (0.9–15.2)	
≥11	399	374	94.2 (91.4–96.1)	25	5.8 (3.9–8.6)	
Партнерський статус						
живе сам	335	314	93.7 (90.2–96.0)	21	6.3 (4.0–9.8)	0.8626
живе з партнером	159	149	93.3 (87.5–96.5)	10	6.7 (3.5–12.5)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	104	98	93.7 (84.8–97.6)	6	6.3 (2.4–15.2)	0.4524
неповний робочий день або тимчасово	305	284	93.1 (89.5–95.5)	21	6.9 (4.5–10.5)	
безробітний	39	35	89.1 (71.4–96.4)	4	10.9 (3.6–28.6)	
інвалідність	31	31	100.0	0	0.0	
інші	15	15	100.0	0	0.0	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	26	25	96.6 (77.6–99.6)	1	3.4 (0.4–22.4)	0.1157
3-10 тис	188	182	96.8 (92.9–98.6)	6	3.2 (1.4–7.1)	
10-20 тис	211	195	92.0 (87.0–95.2)	16	8.0 (4.8–13.0)	
≥20 тис	56	50	88.6 (74.2–95.5)	6	11.4 (4.5–25.8)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	312	296	94.1 (90.2–96.5)	16	5.9 (3.5–9.8)	0.5298
так	182	167	92.6 (87.8–95.6)	15	7.4 (4.4–12.2)	

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	452	422	93.2 (90.1–95.3)	30	6.8 (4.7–9.9)	0.1440
так	42	41	98.2 (87.7–99.8)	1	1.8 (0.2–12.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	474	444	93.4 (90.5–95.5)	30	6.6 (4.5–9.5)	0.5039
так	20	19	96.6 (76.7–99.6)	1	3.4 (0.4–23.3)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	59	53	91.5 (81.7–96.3)	6	8.5 (3.7–18.3)	0.4861
негативний	435	410	93.9 (90.7–96.0)	25	6.1 (4.0–9.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	379	356	94.0 (90.9–96.1)	23	6.0 (3.9–9.1)	
стимулятори	45	43	92.3 (70.5–98.4)	2	7.7 (1.6–29.5)	
опі+стимул	70	64	92.1 (82.5–96.6)	6	7.9 (3.4–17.5)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	432	403	93.5 (90.6–95.5)	29	6.5 (4.5–9.4)	0.9339
стимулятори	60	58	94.1 (76.4–98.7)	2	5.9 (1.3–23.6)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	500	148	31.5 (27.1–36.2)	314	60.6 (55.8–65.2)	38	7.9 (5.7–10.8)	1.0000
Стать								
чоловік	473	141	31.5 (27.0–36.4)	297	60.7 (55.8–65.5)	35	7.7 (5.5–10.8)	0.8699
жінка	27	7	31.1 (14.7–54.3)	17	58.2 (36.9–76.8)	3	10.7 (3.2–29.9)	
Вікова категорія 4								
<25	17	11	68.1 (39.6–87.4)	5	21.4 (7.8–46.6)	1	10.6 (1.3–51.6)	0.0043

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
25-34	115	37	37.3 (27.3–48.4)	69	54.4 (43.8–64.6)	9	8.3 (4.2–15.9)	
35-44	243	57	23.3 (18.1–29.3)	163	67.5 (61.1–73.4)	23	9.2 (6.1–13.7)	
45+	125	43	36.4 (27.8–46.0)	77	59.1 (49.6–68.0)	5	4.5 (1.7–11.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	14	7	54.5 (25.1–81.1)	7	45.5 (18.9–74.9)	0	0.0	0.0224
3-5	31	14	57.7 (36.3–76.6)	16	40.0 (21.9–61.3)	1	2.3 (0.3–16.1)	
6-10	52	16	29.8 (18.5–44.3)	32	60.4 (45.6–73.5)	4	9.8 (3.5–24.7)	
≥11	403	111	28.4 (24.0–33.4)	259	63.1 (58.0–68.0)	33	8.5 (6.0–11.9)	
Партнерський статус								
живе сам	339	113	35.3 (29.8–41.2)	207	59.2 (53.3–64.8)	19	5.5 (3.4–8.7)	0.0048
живе з партнером	161	35	23.5 (17.1–31.4)	107	63.7 (55.3–71.3)	19	12.8 (8.1–19.7)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	105	23	26.4 (16.8–38.9)	77	68.8 (56.6–78.8)	5	4.8 (1.9–11.8)	0.3888
неповний робочий день або тимчасово	309	95	31.6 (26.4–37.4)	191	60.2 (54.3–65.8)	23	8.2 (5.4–12.2)	
безробітний	39	17	46.0 (29.8–63.1)	16	41.9 (26.2–59.5)	6	12.1 (5.1–25.9)	
інвалідність	32	7	27.7 (13.4–48.7)	22	63.5 (43.6–79.6)	3	8.8 (2.7–25.5)	
інші	15	6	39.3 (16.5–68.0)	8	47.8 (22.2–74.6)	1	12.9 (1.6–57.8)	
Категорія місячного доходу								

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	27	11	49.1 (28.8–69.7)	14	45.8 (26.4–66.6)	2	5.1 (1.1–20.6)	0.0313
3-10 тис	191	47	25.4 (19.4–32.4)	131	67.8 (60.5–74.4)	13	6.8 (3.9–11.6)	
10-20 тис	213	70	34.5 (27.6–42.1)	130	58.9 (51.3–66.1)	13	6.7 (3.8–11.5)	
≥20 тис	56	12	24.3 (13.6–39.7)	35	58.9 (44.1–72.3)	9	16.7 (8.4–30.4)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	315	97	32.9 (27.3–39.1)	204	62.1 (56.0–67.9)	14	4.9 (2.9–8.4)	0.0090
так	185	51	28.9 (22.4–36.4)	110	57.8 (50.1–65.2)	24	13.3 (8.8–19.5)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	457	137	31.9 (27.3–36.9)	283	59.7 (54.7–64.5)	37	8.4 (6.0–11.6)	0.2522
так	43	11	26.9 (15.0–43.5)	31	70.8 (54.2–83.2)	1	2.3 (0.3–15.5)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	480	141	31.2 (26.7–36.0)	302	60.8 (55.9–65.5)	37	8.0 (5.8–11.1)	0.7183
так	20	7	38.6 (18.3–63.9)	12	56.8 (32.6–78.2)	1	4.5 (0.5–29.1)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	60	16	33.0 (20.9–48.0)	37	55.7 (41.6–68.8)	7	11.3 (5.3–22.6)	0.5551
негативний	440	132	31.3 (26.7–36.3)	277	61.3 (56.2–66.2)	31	7.4 (5.1–10.6)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	383	115	32.2 (27.2–37.7)	238	59.4 (53.9–64.7)	30	8.4 (5.8–12.0)	
стимулятори	46	15	37.7 (23.4–54.6)	31	62.3 (45.4–76.6)	0	0.0	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
опі+стимул	71	18	23.2 (14.6–34.8)	45	66.3 (54.0–76.7)	8	10.5 (5.0–20.6)	
інші	0	0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	437	126	29.9 (25.4–34.9)	275	61.3 (56.2–66.2)	36	8.7 (6.3–12.1)	0.0508
стимулятори	61	21	40.9 (27.7–55.5)	39	58.0 (43.5–71.2)	1	1.1 (0.2–8.0)	
інші	2	1	66.3 (0.0–100.0)	0	0.0	1	33.7 (0.0–100.0)	

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	94	18.3	(15.0–22.1)
	гепатит C	117	23.6	(19.8–27.8)
	сифіліс	3	0.6	(0.2–1.9)
	гонорея	10	2.0	(1.0–3.9)
	хламідіоз	12	2.0	(1.1–3.6)
	герпес	47	8.5	(6.3–11.3)
	папіломавірус	15	2.8	(1.6–4.7)
	туберкульоз	35	7.3	(5.2–10.1)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	35	40.3	(30.3–51.1)
	пролікувався неуспішно	30	29.5	(21.0–39.7)
	не завершив	4	3.8	(1.4–9.8)
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	25	26.5	(18.2–37.0)
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	45	39.0	(30.2–48.6)
	пролікувався неуспішно	9	6.6	(3.3–12.8)
	не завершив	10	7.4	(3.9–13.4)
	зараз лікується	4	4.2	(1.5–11.5)
	ніколи не лікувався	49	42.7	(33.6–52.3)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	3	100.0	
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	0	0.0	
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	29	85.5	(70.4–93.6)
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	2	4.3	(1.0–15.9)
	зараз лікується	4	10.2	(3.7–25.1)

	n	%	ДІ
ніколи не лікувався	0	0.0	

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

	n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців			
так	101	19.2	(15.8–23.0)
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	74	14.2	(11.3–17.7)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	55	73.4	(61.4–82.7)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	16	24.0	(15.0–36.1)
приватна клініка	2	2.4	(0.5–9.8)
приватна лабораторія	0	0.0	
протитуберкульозного диспансеру	2	2.4	(0.6–9.9)
наркологічний диспансер	1	0.9	(0.1–6.3)
ІПСШ	0	0.0	
швидкої допомоги	2	2.4	(0.6–9.2)
мобільна амбулаторія	0	0.0	
інше	0	0.0	
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	54	72.0	(60.0–81.6)
лікарня, ВІЛ-клініка	13	19.8	(11.6–31.8)
приватна клініка	2	2.4	(0.5–9.8)
приватна лабораторія	0	0.0	
протитуберкульозний диспансер	2	2.4	(0.6–9.9)
наркологічна клініка	1	0.9	(0.1–6.3)
ІПСШ клініка	0	0.0	
швидка допомога	2	2.4	(0.6–9.2)
мобільна клініка	0	0.0	
інші	0	0.0	
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	71	95.3	(83.0–98.8)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	364	73.3	(68.9–77.2)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	4	1.2	(0.4–3.1)
раз на місяць	22	5.9	(3.8–8.9)
3-4 рази в 12 місяців	88	23.6	(19.4–28.5)
тільки один раз	248	69.3	(64.1–74.1)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	494	442	88.0 (83.9–91.2)	52	12.0 (8.8–16.1)	1.0000
Стать							
	чоловік	467	416	87.5 (83.2–90.8)	51	12.5 (9.2–16.8)	0.0551
	жінка	27	26	97.6 (83.3–99.7)	1	2.4 (0.3–16.7)	
Вікова категорія 4							
	<25	16	13	70.0 (36.5–90.5)	3	30.0 (9.5–63.5)	0.0002
	25-34	115	94	77.6 (65.6–86.3)	21	22.4 (13.7–34.4)	
	35-44	238	215	90.4 (85.6–93.7)	23	9.6 (6.3–14.4)	
	45+	125	120	96.4 (91.5–98.5)	5	3.6 (1.5–8.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	14	9	65.1 (33.4–87.4)	5	34.9 (12.6–66.6)	0.0025
	3-5	29	26	71.2 (38.0–90.9)	3	28.8 (9.1–62.0)	
	6-10	52	41	76.3 (61.2–86.8)	11	23.7 (13.2–38.8)	
	≥11	399	366	91.8 (88.5–94.2)	33	8.2 (5.8–11.5)	
Партнерський статус							

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	334	295	87.0 (81.6–91.0)	39	13.0 (9.0–18.4)	0.3919
живе з партнером	160	147	90.2 (83.3–94.4)	13	9.8 (5.6–16.7)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	105	94	83.3 (69.5–91.6)	11	16.7 (8.4–30.5)	0.1922
неповний робочий день або тимчасово	303	270	89.5 (85.3–92.5)	33	10.5 (7.5–14.7)	
безробітний	39	33	83.9 (65.9–93.3)	6	16.1 (6.7–34.1)	
інвалідність	32	32	100.0	0	0.0	
інші	15	13	79.3 (41.6–95.4)	2	20.7 (4.6–58.4)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	27	22	84.8 (65.7–94.2)	5	15.2 (5.8–34.3)	0.5675
3-10 тис	188	171	90.7 (85.3–94.3)	17	9.3 (5.7–14.7)	
10-20 тис	210	190	88.6 (80.9–93.4)	20	11.4 (6.6–19.1)	
≥20 тис	56	49	83.6 (67.6–92.5)	7	16.4 (7.5–32.4)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	313	285	88.2 (82.5–92.3)	28	11.8 (7.7–17.5)	0.8483
так	181	157	87.6 (81.6–91.8)	24	12.4 (8.2–18.4)	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	451	404	87.9 (83.5–91.2)	47	12.1 (8.8–16.5)	0.7919
так	43	38	89.3 (75.8–95.7)	5	10.7 (4.3–24.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	475	426	88.2 (84.0–91.4)	49	11.8 (8.6–16.0)	0.5577
так	19	16	83.2 (54.1–95.4)	3	16.8 (4.6–45.9)	
Результат тесту на ВІЛ						

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	59	51	87.2 (75.4–93.8)	8	12.8 (6.2–24.6)	0.8506
негативний	435	391	88.1 (83.6–91.5)	44	11.9 (8.5–16.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	378	345	90.3 (85.7–93.6)	33	9.7 (6.4–14.3)	
стимулятори	46	40	81.0 (62.2–91.7)	6	19.0 (8.3–37.8)	
опі+стимул	70	57	80.0 (67.8–88.3)	13	20.0 (11.7–32.2)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	431	389	89.2 (85.0–92.4)	42	10.8 (7.6–15.0)	0.1333
стимулятори	61	51	79.3 (64.2–89.1)	10	20.7 (10.9–35.8)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	187	38.6 (34.1–43.3)	218	43.4 (38.8–48.1)	66	12.6 (9.9–16.0)	29	5.4 (3.7–7.7)	1.0000
Стать										
чоловік	473	177	38.7 (34.0–43.6)	209	43.9 (39.2–48.8)	61	12.2 (9.5–15.6)	26	5.2 (3.5–7.7)	0.4386
жінка	27	10	36.9 (19.8–58.0)	9	33.3 (17.2–54.6)	5	21.3 (8.3–44.6)	3	8.5 (2.5–25.2)	
Вікова категорія 4										
<25	17	8	41.5 (18.8–68.5)	8	48.0 (23.1–73.9)	1	10.6 (1.3–51.6)	0	0.0	0.5447
25-34	115	45	43.1 (33.0–53.8)	41	35.7 (26.6–45.9)	22	16.0 (10.3–23.9)	7	5.2 (2.4–11.2)	
35-44	243	83	34.5 (28.5–41.0)	116	48.1 (41.5–54.7)	28	10.8 (7.4–15.5)	16	6.7 (4.0–10.8)	
45+	125	51	41.6 (32.8–51.1)	53	41.4 (32.6–50.9)	15	13.2 (7.9–21.2)	6	3.7 (1.6–8.3)	

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	14	8	57.8 (27.4–83.3)	3	13.6 (3.6–40.1)	1	12.0 (1.4–56.6)	2	16.6 (3.2–54.8)	0.2389
3-5	31	14	49.8 (28.2–71.5)	14	43.8 (24.0–65.9)	3	6.4 (1.8–20.2)	0	0.0	
6-10	52	23	44.1 (30.5–58.5)	20	39.4 (26.3–54.1)	6	10.9 (4.8–23.0)	3	5.7 (1.7–17.3)	
≥11	403	142	36.1 (31.3–41.2)	181	45.0 (40.0–50.2)	56	13.5 (10.3–17.3)	24	5.4 (3.6–8.0)	
Партнерський статус										
живе сам	339	121	36.6 (31.1–42.4)	161	47.9 (42.2–53.6)	41	11.2 (8.2–15.0)	16	4.4 (2.7–7.1)	0.0337
живе з партнером	161	66	42.8 (34.9–51.0)	57	34.1 (26.9–42.1)	25	15.8 (10.6–22.8)	13	7.4 (4.1–12.8)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	105	44	45.8 (35.1–56.9)	45	42.2 (32.0–53.0)	12	9.1 (5.0–16.0)	4	2.9 (1.1–7.9)	0.0327
неповний робочий день або тимчасово	309	115	37.0 (31.6–42.9)	141	46.2 (40.4–52.0)	37	12.0 (8.6–16.4)	16	4.8 (2.9–7.9)	
безробітний	39	11	29.5 (16.1–47.7)	17	43.3 (27.5–60.6)	6	13.1 (5.6–27.8)	5	14.0 (5.5–31.6)	
інвалідність	32	8	29.4 (14.8–50.0)	11	30.4 (16.6–49.0)	10	30.8 (16.5–50.0)	3	9.4 (2.8–26.8)	
інші	15	9	58.2 (29.3–82.4)	4	25.2 (8.2–55.8)	1	12.9 (1.6–57.8)	1	3.7 (0.4–26.3)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	27	9	34.9 (17.8–57.1)	10	42.3 (23.0–64.4)	3	7.3 (2.2–22.0)	5	15.4 (6.0–34.2)	0.0852
3-10 тис	191	56	30.3 (23.9–37.6)	92	48.1 (40.7–55.5)	31	15.8 (11.1–21.9)	12	5.8 (3.3–10.2)	
10-20 тис	213	92	44.4 (37.1–51.9)	86	39.6 (32.8–46.9)	25	11.2 (7.5–16.5)	10	4.8 (2.5–9.0)	
≥20 тис	56	24	42.2 (29.0–56.6)	26	45.7 (32.0–60.0)	5	10.6 (4.3–23.9)	1	1.5 (0.2–10.5)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	315	129	41.3 (35.5–47.4)	136	44.0 (38.1–50.0)	35	10.0 (7.1–13.9)	15	4.7 (2.8–7.9)	0.0642

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	185	58	33.5 (26.6–41.2)	82	42.4 (35.1–50.0)	31	17.5 (12.3–24.3)	14	6.6 (3.9–11.0)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	187	38.6 (34.1–43.3)	218	43.4 (38.8–48.1)	66	12.6 (9.9–16.0)	29	5.4 (3.7–7.7)	1.0000
Стать										
чоловік	473	177	38.7 (34.0–43.6)	209	43.9 (39.2–48.8)	61	12.2 (9.5–15.6)	26	5.2 (3.5–7.7)	0.4386
жінка	27	10	36.9 (19.8–58.0)	9	33.3 (17.2–54.6)	5	21.3 (8.3–44.6)	3	8.5 (2.5–25.2)	
Вікова категорія 4										
<25	17	8	41.5 (18.8–68.5)	8	48.0 (23.1–73.9)	1	10.6 (1.3–51.6)	0	0.0	0.5447
25-34	115	45	43.1 (33.0–53.8)	41	35.7 (26.6–45.9)	22	16.0 (10.3–23.9)	7	5.2 (2.4–11.2)	
35-44	243	83	34.5 (28.5–41.0)	116	48.1 (41.5–54.7)	28	10.8 (7.4–15.5)	16	6.7 (4.0–10.8)	
45+	125	51	41.6 (32.8–51.1)	53	41.4 (32.6–50.9)	15	13.2 (7.9–21.2)	6	3.7 (1.6–8.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	14	8	57.8 (27.4–83.3)	3	13.6 (3.6–40.1)	1	12.0 (1.4–56.6)	2	16.6 (3.2–54.8)	0.2389
3-5	31	14	49.8 (28.2–71.5)	14	43.8 (24.0–65.9)	3	6.4 (1.8–20.2)	0	0.0	
6-10	52	23	44.1 (30.5–58.5)	20	39.4 (26.3–54.1)	6	10.9 (4.8–23.0)	3	5.7 (1.7–17.3)	
≥11	403	142	36.1 (31.3–41.2)	181	45.0 (40.0–50.2)	56	13.5 (10.3–17.3)	24	5.4 (3.6–8.0)	
Партнерський статус										
живе сам	339	121	36.6 (31.1–42.4)	161	47.9 (42.2–53.6)	41	11.2 (8.2–15.0)	16	4.4 (2.7–7.1)	0.0337

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе з партнером	161	66	42.8 (34.9–51.0)	57	34.1 (26.9–42.1)	25	15.8 (10.6–22.8)	13	7.4 (4.1–12.8)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	105	44	45.8 (35.1–56.9)	45	42.2 (32.0–53.0)	12	9.1 (5.0–16.0)	4	2.9 (1.1–7.9)	0.0327
неповний робочий день або тимчасово	309	115	37.0 (31.6–42.9)	141	46.2 (40.4–52.0)	37	12.0 (8.6–16.4)	16	4.8 (2.9–7.9)	
безробітний	39	11	29.5 (16.1–47.7)	17	43.3 (27.5–60.6)	6	13.1 (5.6–27.8)	5	14.0 (5.5–31.6)	
інвалідність	32	8	29.4 (14.8–50.0)	11	30.4 (16.6–49.0)	10	30.8 (16.5–50.0)	3	9.4 (2.8–26.8)	
інші	15	9	58.2 (29.3–82.4)	4	25.2 (8.2–55.8)	1	12.9 (1.6–57.8)	1	3.7 (0.4–26.3)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	27	9	34.9 (17.8–57.1)	10	42.3 (23.0–64.4)	3	7.3 (2.2–22.0)	5	15.4 (6.0–34.2)	0.0852
3-10 тис	191	56	30.3 (23.9–37.6)	92	48.1 (40.7–55.5)	31	15.8 (11.1–21.9)	12	5.8 (3.3–10.2)	
10-20 тис	213	92	44.4 (37.1–51.9)	86	39.6 (32.8–46.9)	25	11.2 (7.5–16.5)	10	4.8 (2.5–9.0)	
≥20 тис	56	24	42.2 (29.0–56.6)	26	45.7 (32.0–60.0)	5	10.6 (4.3–23.9)	1	1.5 (0.2–10.5)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	315	129	41.3 (35.5–47.4)	136	44.0 (38.1–50.0)	35	10.0 (7.1–13.9)	15	4.7 (2.8–7.9)	0.0642
так	185	58	33.5 (26.6–41.2)	82	42.4 (35.1–50.0)	31	17.5 (12.3–24.3)	14	6.6 (3.9–11.0)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	249	51.3 (46.6–56.0)	177	34.4 (30.1–38.9)	65	12.8 (10.0–16.2)	9	1.6 (0.8–3.1)	1.0000

		Результат скринінгу тривоги GAD-7									
		N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Стать											
	чоловік	473	240	52.2 (47.4–57.0)	164	33.7 (29.4–38.3)	62	12.7 (9.9–16.1)	7	1.4 (0.6–3.0)	0.1802
	жінка	27	9	33.5 (17.3–54.9)	13	47.0 (27.8–67.0)	3	14.4 (4.1–39.6)	2	5.1 (1.2–20.1)	
Вікова категорія 4											
	<25	17	11	62.9 (34.1–84.8)	4	23.2 (7.3–53.6)	2	13.9 (2.6–49.2)	0	0.0	0.1232
	25-34	115	57	54.3 (44.1–64.2)	38	29.7 (21.7–39.1)	15	12.7 (7.5–20.7)	5	3.3 (1.3–8.3)	
	35-44	243	109	44.6 (38.1–51.2)	96	40.4 (34.0–47.0)	37	14.6 (10.6–19.8)	1	0.5 (0.1–3.4)	
	45+	125	72	59.8 (50.4–68.4)	39	29.0 (21.5–37.9)	11	9.1 (4.9–16.2)	3	2.2 (0.7–6.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків											
	≤2	14	10	75.1 (41.8–92.7)	1	4.6 (0.5–31.7)	2	15.7 (2.8–54.4)	1	4.6 (0.5–31.7)	0.0094
	3-5	31	21	76.9 (58.2–88.8)	9	21.7 (10.2–40.3)	1	1.4 (0.2–10.3)	0	0.0	
	6-10	52	29	53.4 (39.0–67.2)	13	27.0 (15.8–42.1)	9	18.6 (9.7–32.6)	1	1.1 (0.1–7.7)	
	≥11	403	189	47.8 (42.7–53.0)	154	37.6 (32.8–42.7)	53	12.9 (9.9–16.8)	7	1.6 (0.8–3.5)	
Партнерський статус											
	живе сам	339	172	52.5 (46.7–58.2)	125	35.8 (30.6–41.4)	36	10.0 (7.1–13.7)	6	1.7 (0.8–3.9)	0.0580
	живе з партнером	161	77	48.9 (40.8–57.0)	52	31.4 (24.4–39.3)	29	18.6 (12.9–26.0)	3	1.2 (0.4–3.7)	
Поточний статус зайнятості											
	повний робочий день	105	56	58.1 (47.4–68.1)	31	27.4 (19.3–37.5)	16	13.3 (8.0–21.2)	2	1.2 (0.3–4.8)	0.0481
	неповний робочий день або тимчасово	309	154	50.4 (44.6–56.2)	112	35.5 (30.1–41.3)	39	13.0 (9.5–17.6)	4	1.1 (0.4–3.0)	

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	39	16	40.8 (25.3–58.4)	15	39.9 (24.6–57.5)	7	15.5 (7.2–30.5)	1	3.7 (0.5–23.3)	
інвалідність	32	11	35.6 (19.9–55.2)	19	57.2 (38.3–74.3)	1	3.6 (0.5–22.7)	1	3.6 (0.5–22.7)	
інші	15	12	79.4 (44.0–95.0)	0	0.0	2	16.9 (3.2–55.7)	1	3.7 (0.4–26.3)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	27	12	50.8 (30.3–71.0)	8	29.0 (13.7–51.1)	7	20.3 (9.0–39.4)	0	0.0	0.0004
3-10 тис	191	74	39.4 (32.4–46.8)	92	48.3 (40.9–55.7)	19	9.6 (6.1–15.0)	6	2.7 (1.2–6.1)	
10-20 тис	213	129	61.8 (54.6–68.6)	51	22.5 (17.2–28.9)	30	14.3 (10.0–20.1)	3	1.3 (0.4–4.4)	
≥20 тис	56	28	51.2 (37.1–65.1)	20	33.9 (22.0–48.3)	8	14.8 (7.2–28.0)	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	315	169	55.1 (49.1–60.9)	98	30.8 (25.7–36.5)	44	13.2 (9.8–17.6)	4	0.9 (0.3–2.4)	0.0384
так	185	80	44.4 (37.0–52.1)	79	40.9 (33.7–48.5)	21	11.9 (7.6–18.1)	5	2.8 (1.1–6.8)	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	457	222	50.1 (45.2–55.1)	163	34.6 (30.2–39.4)	63	13.5 (10.6–17.2)	9	1.7 (0.9–3.4)	0.1759
так	43	27	64.3 (47.9–78.0)	14	31.5 (18.7–48.0)	2	4.1 (0.9–16.7)	0	0.0	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	480	236	50.9 (46.1–55.7)	173	35.0 (30.6–39.6)	64	12.9 (10.1–16.4)	7	1.2 (0.6–2.6)	0.0566
так	20	13	61.4 (36.1–81.7)	4	20.5 (7.2–46.3)	1	8.8 (1.1–45.5)	2	9.2 (1.8–35.9)	
Результат тесту на ВІЛ										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	60	26	46.8 (33.5–60.6)	26	41.7 (29.1–55.5)	7	10.1 (4.7–20.5)	1	1.3 (0.2–9.3)	0.6137
негативний	440	223	52.0 (46.9–56.9)	151	33.3 (28.8–38.1)	58	13.1 (10.1–16.9)	8	1.6 (0.8–3.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	383	196	52.4 (47.0–57.7)	128	32.5 (27.7–37.6)	52	13.4 (10.2–17.4)	7	1.7 (0.8–3.7)	
стимулятори	46	35	76.9 (61.7–87.3)	8	16.2 (7.9–30.4)	3	6.9 (2.1–20.3)	0	0.0	
опі+стимул	71	18	26.8 (17.1–39.4)	41	58.1 (45.6–69.7)	10	13.3 (7.0–23.8)	2	1.7 (0.4–7.0)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	437	204	47.8 (42.8–52.8)	164	36.8 (32.2–41.7)	61	13.7 (10.7–17.5)	8	1.7 (0.8–3.4)	0.0122
стимулятори	61	44	74.8 (61.9–84.4)	12	17.7 (9.9–29.7)	4	6.4 (2.3–16.8)	1	1.0 (0.1–7.2)	
інші	2	1	66.3 (0.0–100.0)	1	33.7 (0.0–100.0)	0	0.0	0	0.0	

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	21	3.8	(2.5–5.9)
збут наркотиків	1	0.1	(0.0–0.8)
зберігання наркотиків	21	4.2	(2.6–6.6)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	17	3.4	(2.1–5.5)
збут наркотиків	2	0.4	(0.1–1.8)
зберігання наркотиків	17	3.4	(2.0–5.8)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	385	77.9	(73.8–81.4)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	185	35.1	(30.9–39.7)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	18	9.2	(5.8–14.4)
6м-2р	38	20.3	(14.9–27.2)
2-4р	90	49.4	(41.8–57.0)
4 роки +	39	21.1	(15.5–28.0)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	11	6.5	(3.5–11.6)
1-3р	21	11.2	(7.2–16.9)
3-5р	28	14.0	(9.7–19.9)
5-10р	75	39.9	(32.7–47.5)
10 років +	50	28.5	(22.0–35.9)

	n	%	ДІ
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	115	61.5	(53.8–68.6)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	215	43.4	(38.8–48.1)
так, за останні 6м	66	13.5	(10.5–17.1)
так, але 6+ місяців тому	214	43.2	(38.5–47.9)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	179	36.9	(32.5–41.6)
так, за останні 6м	91	18.1	(14.8–22.1)
так, але 6+ місяців тому	229	44.9	(40.3–49.7)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	344	69.4	(64.9–73.5)
так, за останні 6м	28	5.7	(3.8–8.4)
так, але 6+ місяців тому	126	24.9	(21.1–29.1)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	390	79.2	(75.1–82.7)
так	104	20.8	(17.3–24.9)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	291	60.3	(55.7–64.7)
так	209	39.7	(35.3–44.3)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
ні	133	62.6	(55.3–69.3)
так	76	37.4	(30.7–44.7)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців			
ні	332	66.5	(62.0–70.8)

		n	%	ДІ
	так	168	33.5	(29.2–38.0)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

		Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	494	104	20.8 (17.3–24.9)	1.0000	209	76	37.4 (30.7–44.7)	1.0000
Стать									
	чоловік	469	97	20.5 (16.9–24.7)	0.4280	198	74	38.7 (31.8–46.2)	0.0656
	жінка	25	7	27.7 (12.4–51.0)		11	2	13.5 (2.9–44.7)	
Вікова категорія 4									
	<25	15	2	25.2 (6.2–63.1)	0.6855	4	1	14.6 (1.4–67.9)	0.0502
	25-34	115	30	24.3 (17.0–33.5)		48	21	48.0 (33.2–63.1)	
	35-44	239	51	20.5 (15.7–26.4)		107	41	39.9 (30.6–50.1)	
	45+	125	21	17.4 (11.2–26.1)		50	13	23.3 (13.5–37.0)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	14	4	32.3 (10.4–66.2)	0.0314	6	3	44.3 (10.0–85.0)	0.2507
3-5	29	2	5.4 (1.2–21.1)		11	6	67.0 (34.8–88.5)	
6-10	50	16	33.1 (20.7–48.4)		20	6	31.7 (14.5–55.9)	
≥11	401	82	20.2 (16.4–24.7)		172	61	35.8 (28.6–43.6)	
Партнерський статус								
живе сам	336	58	16.2 (12.5–20.8)	0.0006	132	53	40.2 (31.6–49.3)	0.3120
живе з партнером	158	46	30.6 (23.4–38.9)		77	23	32.7 (22.5–44.8)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	105	25	21.5 (14.4–31.0)	0.4706	42	19	46.1 (30.6–62.5)	0.0480
неповний робочий день або тимчасово	307	60	20.3 (15.9–25.7)		135	52	39.7 (31.4–48.7)	
безробітний	37	8	22.6 (11.0–40.8)		18	4	24.3 (8.0–54.0)	
інвалідність	31	10	28.3 (14.9–47.1)		12	0	0.0	
інші	14	1	4.1 (0.5–28.6)		2	1	34.0 (2.4–91.5)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	27	9	32.0 (15.4–54.9)	0.4031	10	4	39.4 (14.2–71.9)	0.0766
3-10 тис	187	36	19.1 (13.9–25.7)		90	26	29.6 (20.5–40.6)	
10-20 тис	212	45	20.4 (15.3–26.7)		83	35	42.0 (31.4–53.4)	
≥20 тис	56	14	26.3 (15.6–41.0)		20	11	59.6 (35.5–79.8)	
Був позбавлений волі будь-коли								

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
ні	311	63	20.3 (15.9–25.6)	0.7220	119	48	41.5 (32.5–51.2)	0.1622
так	183	41	21.8 (16.1–28.7)		90	28	31.5 (22.2–42.5)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	451	96	21.2 (17.4–25.5)	0.5867	197	75	38.9 (31.9–46.4)	0.0826
так	43	8	17.4 (8.3–33.2)		12	1	10.7 (1.4–50.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	474	96	20.1 (16.5–24.3)	0.0806	200	74	38.3 (31.3–45.7)	0.2355
так	20	8	37.1 (17.7–61.8)		9	2	19.3 (4.2–56.8)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	59	18	30.9 (19.4–45.3)	0.0624	23	8	33.3 (16.8–55.2)	0.6728
негативний	435	86	19.4 (15.8–23.7)		186	68	37.9 (30.8–45.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	379	83	21.6 (17.5–26.4)		155	48	31.8 (24.6–40.0)	
стимулятори	44	6	14.0 (6.1–28.8)		17	6	48.0 (23.7–73.3)	
опі+стимул	71	15	21.2 (12.6–33.3)		37	22	54.8 (37.3–71.1)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	433	93	21.1 (17.4–25.5)	0.7701	187	68	36.4 (29.5–44.0)	0.4724
стимулятори	59	11	19.5 (10.2–34.0)		21	8	48.2 (26.0–71.1)	
інші	2	0	0.0		1	0	0.0	

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	13	2.4	(1.3–4.2)
так, з інших причин	30	6.3	(4.3–9.1)
ні	457	91.4	(88.3–93.7)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	0	0.0	
інша країна	1	9.6	(1.3–45.3)
інша область	6	51.7	(25.3–77.1)
інше місто	0	0.0	
інший район	4	26.6	(9.7–55.0)
інший будинок	2	12.2	(2.9–38.9)
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			
та сама область	29	70.1	(54.1–82.3)
інша область	12	26.0	(14.6–41.9)
інша країна	2	3.9	(1.0–14.7)



Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)



Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)

Результати для міста: Одеса




Рис. A. Мережа рекрутингу RDS у місті Одеса

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	500	39.9	(39.2–40.6)	40	(35–44)
Вік першого неін'єкційного вживання наркотиків	486	17.0	(16.6–17.5)	16	(14–18)
Років з початку неін'єкційного вживання наркотиків	486	22.8	(22.0–23.6)	23	(17–29)
Вік першого ін'єкційного вживання наркотиків	500	21.3	(20.7–21.9)	19	(17–25)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків	500	18.7	(17.7–19.6)	19	(10–26)
Особистий місячний дохід, грн	479	8,150.8	(7611.5–8690.1)	7,000	(4000–10000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

	Сайт	n	%	ДІ
Стать				
чоловік	Одеса	408	81.2	(77.3–84.5)
жінка	Одеса	92	18.8	(15.5–22.7)
Вікова категорія 4				
<25	Одеса	9	1.7	(0.9–3.2)
25-34	Одеса	117	22.0	(18.6–26.0)
35-44	Одеса	248	52.4	(47.8–56.9)
45+	Одеса	126	23.9	(20.3–28.0)
Сімейний стан				
одружений або проживають разом	Одеса	59	11.9	(9.2–15.3)
одружений, але має іншого партнера	Одеса	19	4.0	(2.5–6.3)
не одружений, але є партнер	Одеса	133	26.5	(22.7–30.7)
одружений, але не живуть разом	Одеса	16	3.4	(2.0–5.6)
не одружений та не мають партнера	Одеса	273	54.2	(49.6–58.7)
Партнерський статус				
живе сам	Одеса	289	57.6	(53.0–62.0)
живе з партнером	Одеса	211	42.4	(38.0–47.0)
Освіта 3 категорії				
незак. середня школа	Одеса	143	28.6	(24.6–32.9)
середня школа	Одеса	193	37.4	(33.0–41.9)
> середня школа	Одеса	164	34.1	(29.8–38.6)
Поточна професія				
учень школи	Одеса	0	0.0	
студент коледжу/університету	Одеса	0	0.0	
постійна робота	Одеса	74	15.2	(12.1–18.8)
непостійна робота	Одеса	328	65.4	(60.9–69.7)
безробітний	Одеса	54	10.4	(7.9–13.6)
домогосподарка	Одеса	4	0.7	(0.3–1.9)
інвалідність	Одеса	37	8.0	(5.8–11.1)
військовий	Одеса	1	0.1	(0.0–0.7)
інші	Одеса	1	0.1	(0.0–1.0)
Безхатченко				
ніколи	Одеса	365	74.3	(70.2–78.1)
так, 12м+ тому	Одеса	116	22.4	(18.8–26.4)

	Сайт	n	%	ДІ
так, за останні 12м	Одеса	17	3.3	(2.0–5.3)
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Одеса	116	87.3	(80.2–92.1)
так	Одеса	17	12.7	(7.9–19.8)
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Одеса	77	16.0	(12.8–19.7)
3-10 тис	Одеса	211	45.4	(40.7–50.1)
10-20 тис	Одеса	165	33.2	(28.9–37.7)
≥20 тис	Одеса	26	5.5	(3.7–8.1)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Одеса	76	15.7	(12.6–19.5)
≥2684	Одеса	403	84.3	(80.5–87.4)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Одеса	18	3.5	(2.2–5.6)
3-5	Одеса	47	9.4	(7.0–12.4)
6-10	Одеса	64	12.9	(10.1–16.3)
≥11	Одеса	371	74.2	(70.0–78.0)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Сайт	n	%	ДІ
власне житло	Одеса	240	47.7	(43.1–52.3)
у друзів або родичів	Одеса	123	24.0	(20.3–28.2)
оренда	Одеса	79	16.6	(13.4–20.4)
різне	Одеса	36	7.3	(5.2–10.2)
на вулиці (безхатько)	Одеса	17	3.3	(2.0–5.3)
у притулку для біженців	Одеса	7	1.6	(0.7–3.4)




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)



Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Всього								
	Разом	500	406	81.8 (78.1–85.0)	40	7.7 (5.6–10.4)	54	10.5 (8.0–13.6)
Стать								
	чоловік	408	331	81.8 (77.7–85.3)	29	6.8 (4.7–9.7)	48	11.4 (8.6–15.0)
	жінка	92	75	81.7 (72.0–88.6)	11	11.7 (6.5–20.3)	6	6.6 (2.8–14.5)
Вікова категорія 4								

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
<25	9	3	33.6 (8.6–73.0)	3	34.9 (9.2–74.0)	3	31.5 (8.0–70.9)
25-34	117	95	82.0 (73.7–88.1)	8	6.8 (3.4–13.3)	14	11.2 (6.5–18.5)
35-44	248	195	79.4 (73.7–84.1)	22	8.4 (5.5–12.7)	31	12.2 (8.6–17.0)
45+	126	113	90.2 (83.5–94.3)	7	5.0 (2.4–10.3)	6	4.8 (2.1–10.6)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
≤2	18	11	58.0 (32.8–79.5)	5	31.6 (13.1–58.8)	2	10.4 (2.3–36.3)
3-5	47	32	71.6 (56.8–82.9)	8	15.8 (7.8–29.6)	7	12.5 (5.8–25.0)
6-10	64	50	76.3 (63.1–85.9)	7	11.9 (5.6–23.8)	7	11.7 (5.4–23.7)
≥11	371	313	85.2 (81.1–88.5)	20	4.8 (3.1–7.4)	38	10.0 (7.3–13.7)
Партнерський статус							
живе сам	289	243	85.2 (80.6–88.9)	23	7.8 (5.1–11.5)	23	7.0 (4.6–10.6)
живе з партнером	211	163	77.2 (70.7–82.5)	17	7.6 (4.7–12.1)	31	15.2 (10.8–21.1)
Поточний статус зайнятості							
повний робочий день	74	56	77.0 (65.6–85.4)	12	14.6 (8.1–24.8)	6	8.4 (3.7–18.0)
неповний робочий день або тимчасово	328	270	83.0 (78.5–86.8)	22	6.6 (4.3–9.9)	36	10.4 (7.5–14.2)
безробітний	54	44	80.0 (65.9–89.3)	5	9.2 (3.7–21.0)	5	10.8 (4.3–24.3)
інвалідність	37	31	85.5 (69.8–93.8)	1	3.1 (0.4–20.1)	5	11.4 (4.5–26.1)
інші	6	5	89.6 (33.6–99.3)	0	0.0	1	10.4 (0.7–66.4)
Категорія місячного доходу							
<3 тис	77	58	76.9 (65.8–85.2)	6	7.1 (3.1–15.4)	13	16.0 (9.2–26.4)
3-10 тис	211	178	84.6 (78.9–89.0)	17	7.7 (4.8–12.2)	16	7.7 (4.6–12.5)
10-20 тис	165	134	81.7 (74.8–87.0)	13	7.6 (4.4–12.9)	18	10.7 (6.7–16.6)
≥20 тис	26	20	78.0 (56.2–90.8)	4	16.5 (5.7–39.3)	2	5.5 (1.2–20.9)
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	306	237	78.2 (73.1–82.6)	32	10.3 (7.3–14.4)	37	11.5 (8.3–15.6)
так	190	166	87.7 (82.0–91.8)	7	3.2 (1.5–6.7)	17	9.2 (5.7–14.5)

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії					
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	220	180	81.4 (75.4–86.2)	20	9.3 (6.0–14.2)	20	9.3 (6.0–14.1)
так	272	220	82.1 (77.0–86.3)	19	6.3 (4.0–9.8)	33	11.6 (8.3–16.1)
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	411	323	79.3 (75.0–83.0)	39	9.1 (6.7–12.4)	49	11.6 (8.8–15.2)
так	66	63	95.7 (87.1–98.6)	1	1.3 (0.2–8.8)	2	3.0 (0.7–11.7)
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	117	98	84.0 (75.9–89.8)	8	6.3 (3.1–12.4)	11	9.7 (5.3–17.1)
негативний	383	308	81.2 (76.8–84.9)	32	8.1 (5.7–11.4)	43	10.7 (8.0–14.3)
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання							
опіоїди	442	405	91.7 (88.6–94.0)	2	0.4 (0.1–1.6)	35	7.9 (5.7–11.0)
стимулятори	55	0	0.0	38	70.9 (57.0–81.7)	17	29.1 (18.3–43.0)
інші	3	1	35.7 (0.3–99.1)	0	0.0	2	64.3 (0.9–99.7)

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Частота ін'єкцій: останні 24 години								
0 разів	39	9.8	8	21.8	0	0.0	0	
1 раз	213	52.6	14	37.0	18	34.4	0	
2-3 рази	140	34.8	16	37.7	24	46.0	0	
4+ рази	14	2.8	2	3.5	12	19.6	0	
N	406		40		54		0	
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)								
1 раз	213	58.3	14	47.3	18	34.4	0	
2-3 рази	140	38.6	16	48.3	24	46.0	0	
4+ рази	14	3.1	2	4.5	12	19.6	0	
N	367		32		54		0	
Частота ін'єкцій: останній тиждень								
0 разів	1	0.4	1	3.2	0	0.0	0	
1-6 разів	167	42.7	17	44.4	6	11.0	0	
кожен день	238	56.9	22	52.4	48	89.0	0	
N	406		40		54		0	
Частота ін'єкцій: останні 30 днів								
1-9 разів	44	11.6	4	10.9	5	10.8	0	

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші	
	n	%	n	%	n	%	n	%
10-19 разів	86	20.8	12	31.7	4	7.3	0	
20-29 разів	71	19.4	5	12.7	4	7.0	0	
кожен день	205	48.1	19	44.7	41	74.9	0	
N	406		40		54		0	
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів								
0-9 разів	16	4.1	1	3.2	0	0.0	0	
10-19 разів	87	21.1	12	31.7	5	9.4	0	
20-29 разів	67	18.6	5	11.3	3	4.7	0	
кожен день	236	56.2	22	53.8	45	85.9	0	
N	406		40		53		0	

Таблиця 2.4. Ін'єкційний вид наркотику на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	66	15.7	11	18.5	0	0.0
3-10 тис	191	46.1	20	40.8	0	0.0
10-20 тис	146	33.3	18	30.7	1	100.0
≥20 тис	21	5.0	5	10.0	0	0.0
N	424		54		1	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
Разом		опіоїди		стимулятори		інші		
n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
готую сам								
137	27.2	126	28.2	10	18.6	1	28.6	0.3550
приготовлене друзями								
10	2.0	9	2.0	1	1.9	0	0.0	0.9649
від дилера								
180	36.7	152	35.3	26	46.0	2	71.4	0.1427
куплене в Інтернеті								
288	57.6	252	57.3	36	64.0	0	0.0	0.0787
з аптеки								
33	7.1	30	7.1	3	7.5	0	0.0	0.8924
з програми ЗПТ								
21	4.1	21	4.6	0	0.0	0	0.0	0.2929
N								
669		590		76		3		
інше								
		0	0.0	0	0.0	0	0.0	




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін'єкції використовував чистий шприц			
так	485	97.1	(95.1–98.3)
Джерело шприца для останньої ін'єкції			
купив в аптеці	251	49.9	(45.3–54.5)
отримав в аптеці	4	0.7	(0.3–2.0)
отримав від НУО	238	48.0	(43.4–52.6)
отримав від друга	2	0.5	(0.1–2.0)
отримав вживаний від друга	1	0.2	(0.0–1.4)
використовував вживаний свій	1	0.1	(0.0–1.0)
отримав заповнений	0	0.0	
інші	3	0.6	(0.2–1.9)
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	33	6.8	(4.8–9.6)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	15	3.0	(1.7–5.2)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	52	10.3	(7.7–13.5)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	63	12.1	(9.4–15.4)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	192	39.4	(34.9–44.0)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	17	3.3	(2.0–5.3)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	102	20.9	(17.3–25.0)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	3	9.5	(3.1–26.0)
часто	1	3.7	(0.5–21.9)
половина	2	6.6	(1.6–23.1)
іноді	3	6.7	(2.1–19.2)
рідко	10	27.4	(14.6–45.3)
ніколи	14	46.2	(29.1–64.2)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	72	15.2	(12.2–18.9)
часто	62	12.0	(9.3–15.2)
половина	74	14.0	(11.2–17.5)
іноді	51	10.5	(7.9–13.8)
рідко	68	15.5	(12.3–19.4)
ніколи	155	32.7	(28.5–37.3)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			
1-9	144	77.5	(70.3–83.3)
10-29	36	20.0	(14.5–27.0)
30+	4	2.5	(0.9–7.0)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	12	6.0	(3.3–10.4)
2-3	126	68.8	(61.4–75.4)
4-9	36	19.3	(14.0–26.1)
10+	10	5.9	(3.1–10.8)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	4	20.4	(7.0–46.8)
від друзів	7	49.0	(22.3–76.2)
із закладки	2	30.6	(8.6–67.3)
Хтось використав один шприц для ін'єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	471	94.8	(92.6–96.5)
так	29	5.2	(3.5–7.4)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін'єкцій (%)




Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	499	33	6.8 (4.8–9.6)	1.0000	499	15	3.0 (1.7–5.2)	1.0000
Стать									
	чоловік	408	28	6.9 (4.7–10.1)	0.8661	407	15	3.8 (2.2–6.4)	0.0791
	жінка	91	5	6.4 (2.6–14.8)		92	0	0.0	
Вікова категорія 4									

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<25	9	0	0.0	0.1708	9	0	0.0	0.3005
25-34	117	13	11.5 (6.6–19.2)		116	7	5.1 (2.4–10.6)	
35-44	248	12	5.2 (2.8–9.3)		248	7	3.3 (1.5–7.3)	
45+	125	8	6.5 (3.1–13.1)		126	1	0.8 (0.1–5.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	18	1	5.7 (0.7–34.6)	0.1603	17	0	0.0	0.7764
3-5	47	5	9.3 (3.8–21.2)		47	2	3.7 (0.9–14.2)	
6-10	64	8	12.9 (6.3–24.7)		64	2	1.9 (0.4–7.6)	
≥11	370	19	5.5 (3.4–8.7)		371	11	3.3 (1.7–6.2)	
Партнерський статус								
живе сам	289	23	8.5 (5.5–12.8)	0.0931	288	10	3.1 (1.6–5.9)	0.9290
живе з партнером	210	10	4.5 (2.4–8.3)		211	5	3.0 (1.1–7.6)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	74	4	5.3 (1.8–14.3)	0.3604	74	2	5.4 (1.3–19.9)	0.4989
неповний робочий день або тимчасово	327	17	5.4 (3.3–8.5)		327	8	2.2 (1.1–4.4)	
безробітний	54	6	10.3 (4.5–21.8)		54	2	3.3 (0.8–12.9)	
інвалідність	37	4	12.5 (3.9–33.0)		37	2	4.3 (1.0–16.6)	
інші	6	1	10.4 (0.7–66.4)		6	1	10.4 (0.7–66.4)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	77	5	5.5 (2.2–13.1)	0.9419	77	3	4.2 (1.3–12.6)	0.7854
3-10 тис	211	15	7.1 (4.1–12.0)		211	6	2.9 (1.2–7.3)	
10-20 тис	164	9	6.1 (3.1–11.5)		164	6	3.5 (1.5–8.0)	
≥20 тис	26	1	4.7 (0.6–29.0)		26	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	305	21	7.5 (4.8–11.5)	0.4848	305	5	1.5 (0.6–3.8)	0.0152
так	190	12	5.8 (3.2–10.2)		190	10	5.6 (2.9–10.8)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	219	12	5.6 (3.1–9.8)	0.3700	219	5	2.2 (0.9–5.5)	0.4007
так	272	20	7.8 (4.9–12.1)		272	9	3.6 (1.8–7.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	410	28	6.9 (4.7–10.1)	0.7472	410	14	3.5 (2.0–6.1)	0.3052
так	66	5	8.1 (3.3–18.5)		66	1	1.3 (0.2–8.8)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	116	7	6.1 (2.9–12.6)	0.7609	117	4	2.6 (1.0–6.8)	0.7334
негативний	383	26	7.0 (4.7–10.3)		382	11	3.2 (1.7–6.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	405	22	5.7 (3.7–8.8)		406	9	2.4 (1.2–5.0)	
стимулятори	40	3	8.3 (2.5–24.0)		40	0	0.0	
опі+стимул	54	8	13.9 (6.7–26.7)		53	6	10.2 (4.4–21.9)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	441	27	6.3 (4.3–9.3)	0.4204	441	12	2.8 (1.5–5.3)	0.6895
стимулятори	55	6	11.1 (4.9–23.3)		55	3	4.9 (1.5–14.7)	
інші	3	0	0.0		3	0	0.0	

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Всього									
	Разом	499	52	10.3 (7.7–13.5)	1.0000	496	63	12.1 (9.4–15.4)	1.0000
Стать									
	чоловік	407	47	11.2 (8.3–15.0)	0.1909	404	55	12.7 (9.7–16.5)	0.3714
	жінка	92	5	6.2 (2.5–14.5)		92	8	9.2 (4.5–17.8)	

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4								
<25	9	0	0.0	0.0408	9	0	0.0	0.0526
25-34	117	18	14.5 (8.9–22.8)		117	21	15.4 (10.0–22.8)	
35-44	247	27	11.6 (7.9–16.8)		246	33	13.8 (9.8–19.2)	
45+	126	7	4.3 (2.0–9.0)		124	9	5.9 (3.0–11.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	18	2	10.4 (2.3–36.3)	0.8438	18	3	15.1 (4.4–40.6)	0.9254
3-5	47	7	13.4 (6.0–27.1)		46	6	10.8 (4.7–22.9)	
6-10	64	6	8.1 (3.5–17.8)		64	8	10.4 (5.0–20.3)	
≥11	370	37	10.3 (7.3–14.2)		368	46	12.4 (9.2–16.4)	
Партнерський статус								
живе сам	288	28	9.0 (6.1–13.0)	0.3062	287	28	8.9 (6.1–12.8)	0.0155
живе з партнером	211	24	12.0 (7.9–18.0)		209	35	16.3 (11.7–22.4)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	74	7	11.1 (4.9–23.3)	0.9551	74	7	9.4 (4.0–20.7)	0.8529
неповний робочий день або тимчасово	327	32	9.6 (6.7–13.6)		324	40	11.9 (8.8–16.1)	
безробітний	54	7	12.2 (5.8–24.1)		54	8	14.6 (7.3–27.3)	
інвалідність	37	5	12.2 (4.7–28.1)		37	7	15.4 (6.8–31.0)	
інші	6	1	10.4 (0.7–66.4)		6	1	10.4 (0.7–66.4)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	77	13	16.2 (9.4–26.7)	0.3263	77	15	18.7 (11.2–29.4)	0.3651
3-10 тис	210	19	9.7 (6.0–15.4)		208	24	11.4 (7.5–17.0)	
10-20 тис	165	16	8.2 (4.9–13.3)		164	20	10.5 (6.8–16.1)	
≥20 тис	26	3	12.8 (3.7–35.8)		26	3	12.4 (3.5–35.4)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	306	24	7.0 (4.6–10.5)	0.0032	302	30	8.6 (6.0–12.3)	0.0033

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
	так	189	28	15.9 (10.8–22.7)		190	33	17.8 (12.6–24.5)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	219	26	11.9 (8.0–17.3)	0.2156	219	32	13.4 (9.5–18.6)	0.4369
так	272	23	8.2 (5.3–12.6)		269	30	11.0 (7.6–15.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	410	44	10.6 (7.7–14.3)	0.0602	408	54	12.3 (9.4–15.9)	0.0329
так	66	2	3.0 (0.7–12.0)		65	2	3.0 (0.7–12.2)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	116	8	6.1 (3.0–12.1)	0.0938	117	11	9.7 (5.2–17.3)	0.4053
негативний	383	44	11.5 (8.4–15.4)		379	52	12.7 (9.7–16.6)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	405	37	9.4 (6.7–13.1)		404	45	10.9 (8.0–14.5)	
стимулятори	40	2	4.7 (1.1–17.9)		39	6	14.5 (6.3–29.9)	
опі+стимул	54	13	21.4 (12.4–34.4)		53	12	19.7 (11.1–32.4)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	441	46	10.4 (7.6–13.9)	0.8245	439	53	11.5 (8.7–15.0)	0.3683
стимулятори	55	6	10.4 (4.6–21.7)		54	10	17.7 (9.5–30.6)	
інші	3	0	0.0		3	0	0.0	

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	483	96.5	(94.3–97.9)	89	97.2	(91.4–99.1)	394	96.4	(93.7–98.0)	0.6951
N	500			92			408			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	413	85.9	(82.4–88.9)	80	91.4	(83.9–95.6)	333	84.6	(80.5–88.1)	0.0869
N	481			89			392			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	271	56.7	(52.0–61.3)	60	67.2	(56.2–76.6)	211	54.2	(49.0–59.4)	0.0332
N	479			89			390			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	213	78.9	(73.7–83.4)	57	94.3	(83.6–98.2)	156	74.5	(68.2–79.9)	0.0019
N	275			60			215			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	75	26.0	(21.1–31.7)	4	7.1	(2.6–17.8)	71	31.5	(25.5–38.2)	0.0003
N	271			59			212			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	5	1.6	(0.7–3.9)	0	0.0		5	2.1	(0.9–5.0)	0.2330
N	275			60			215			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	1	0.4	(0.1–2.5)	0	0.0		1	0.5	(0.1–3.2)	0.5939
N	274			59			215			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										
так	221	48.0	(43.2–52.8)	27	31.3	(22.1–42.4)	194	52.1	(46.7–57.4)	0.0009
N	456			88			368			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	197	48.4	(43.3–53.5)	25	31.9	(22.1–43.6)	172	52.7	(46.9–58.3)	0.0016
N	399			79			320			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	126	45.6	(39.4–51.9)	17	28.2	(17.9–41.5)	109	50.8	(43.6–57.9)	0.0031
N	267			60			207			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	20	3.8	(2.4–6.0)	13	13.9	(8.0–23.1)	7	1.5	(0.7–3.2)	0.0000
N	481			88			393			
Надавав секс-послуги за гроші										
так	9	1.9	(1.0–3.6)	8	8.8	(4.4–17.1)	1	0.2	(0.0–1.5)	0.0000
N	482			89			393			
Платив за секс коли-небудь										
так	117	23.5	(19.8–27.7)	3	3.9	(1.2–11.5)	114	28.0	(23.7–32.9)	0.0000
N	481			88			393			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	23	18.3	(12.2–26.4)	0	0.0		23	18.9	(12.7–27.2)	0.3953
N	116			3			113			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	311	65.2	(60.7–69.6)	80	90.6	(81.4–95.5)	231	59.4	(54.2–64.4)	
випадковий	162	33.7	(29.4–38.2)	7	9.4	(4.5–18.6)	155	39.3	(34.3–44.4)	
ком. секс (я заплатив)	5	1.1	(0.4–2.7)	0	0.0		5	1.4	(0.5–3.4)	
ком. секс (мені заплатили)	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	478			87			391			
З ким останнім був секс										
чоловік	81	17.1	(13.8–20.9)	81	91.8	(82.5–96.4)	0	0.0		
жінка	399	82.9	(79.1–86.2)	6	8.2	(3.6–17.5)	393	100.0		
men and women	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	480			87			393			
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	454	93.8	(91.0–95.7)	85	94.6	(86.3–98.0)	369	93.6	(90.5–95.7)	0.7438
N	482			89			393			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	13	2.8	(1.6–4.8)	3	4.1	(1.3–12.0)	10	2.5	(1.3–4.6)	0.4359
N	482			89			393			

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	66	14.4	(11.3–18.0)	6	8.1	(3.6–17.2)	60	15.8	(12.3–20.1)	0.0921
N	482			89			393			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	213	78.9	(73.7–83.4)	57	94.3	(83.6–98.2)	156	74.5	(68.2–79.9)	0.0019
N	275			60			215			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	75	26.0	(21.1–31.7)	4	7.1	(2.6–17.8)	71	31.5	(25.5–38.2)	0.0003
N	271			59			212			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	5	1.6	(0.7–3.9)	0	0.0		5	2.1	(0.9–5.0)	0.2330
N	275			60			215			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	1	0.4	(0.1–2.5)	0	0.0		1	0.5	(0.1–3.2)	0.5939
N	274			59			215			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні										
1	193	95.5	(91.9–97.6)	50	98.6	(90.7–99.8)	143	94.5	(89.7–97.1)	
2-4	11	4.5	(2.4–8.1)	1	1.4	(0.2–9.3)	10	5.5	(2.9–10.3)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	204			51			153			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові										
1	51	73.3	(61.4–82.6)	3	100.0		48	71.9	(59.6–81.6)	0.5103
2-4	18	25.4	(16.4–37.3)	0	0.0		18	26.8	(17.3–39.0)	
5+	1	1.3	(0.2–8.5)	0	0.0		1	1.3	(0.2–8.9)	
N	70			3			67			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: комерційний (я платив)										
1	3	73.9	(22.6–96.5)	0	0.0		3	73.9	(22.6–96.5)	
2-4	1	26.1	(3.5–77.4)	0	0.0		1	26.1	(3.5–77.4)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	4			0			4			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього										
1	217	85.5	(80.7–89.3)	51	98.5	(89.7–99.8)	166	82.1	(76.3–86.8)	0.0081
2-4	40	13.7	(10.0–18.4)	1	1.5	(0.2–10.3)	39	16.9	(12.4–22.6)	
5+	2	0.8	(0.2–3.2)	0	0.0		2	1.0	(0.2–4.0)	
N	259			52			207			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

			Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс			
		N	ні	так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	456	235	52.0 (47.2–56.8)	221	48.0 (43.2–52.8)	1.0000
Стать							
	чоловік	368	174	47.9 (42.6–53.3)	194	52.1 (46.7–57.4)	0.0009
	жінка	88	61	68.7 (57.6–77.9)	27	31.3 (22.1–42.4)	

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N		ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	8	3	37.3 (9.5–77.0)	5	62.7 (23.0–90.5)	0.3281
25-34	110	63	59.2 (49.4–68.3)	47	40.8 (31.7–50.6)	
35-44	231	114	49.3 (42.5–56.0)	117	50.7 (44.0–57.5)	
45+	107	55	52.3 (42.4–62.1)	52	47.7 (37.9–57.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	15	11	74.1 (45.0–90.9)	4	25.9 (9.1–55.0)	0.0289
3-5	47	20	38.7 (25.4–54.0)	27	61.3 (46.0–74.6)	
6-10	60	35	63.0 (49.9–74.5)	25	37.0 (25.5–50.1)	
≥11	334	169	50.9 (45.2–56.5)	165	49.1 (43.5–54.8)	
Партнерський статус						
живе сам	255	102	39.9 (33.8–46.4)	153	60.1 (53.6–66.2)	0.0000
живе з партнером	201	133	67.1 (60.0–73.5)	68	32.9 (26.5–40.0)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	68	32	46.5 (34.3–59.0)	36	53.5 (41.0–65.7)	0.8008
неповний робочий день або тимчасово	303	158	53.0 (47.1–58.8)	145	47.0 (41.2–52.9)	
безробітний	46	22	48.6 (33.8–63.6)	24	51.4 (36.4–66.2)	
інвалідність	32	19	57.6 (38.5–74.7)	13	42.4 (25.3–61.5)	
інші	6	3	45.4 (8.6–88.0)	3	54.6 (12.0–91.4)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	65	32	48.7 (36.2–61.4)	33	51.3 (38.6–63.8)	0.2569
3-10 тис	196	109	57.3 (49.9–64.4)	87	42.7 (35.6–50.1)	
10-20 тис	151	72	46.6 (38.4–54.9)	79	53.4 (45.1–61.6)	
≥20 тис	26	13	54.9 (34.5–73.8)	13	45.1 (26.2–65.5)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	279	140	50.8 (44.7–56.9)	139	49.2 (43.1–55.3)	0.4652

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
	так	174	94	54.5 (46.6–62.2)	80	45.5 (37.8–53.4)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	200	118	60.3 (53.0–67.1)	82	39.7 (32.9–47.0)	0.0030
так	250	115	45.5 (39.1–52.1)	135	54.5 (47.9–60.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	380	200	52.9 (47.6–58.1)	180	47.1 (41.9–52.4)	0.3629
так	57	26	46.2 (33.1–59.8)	31	53.8 (40.2–66.9)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	104	47	45.6 (35.9–55.7)	57	54.4 (44.3–64.1)	0.1598
негативний	352	188	53.8 (48.3–59.2)	164	46.2 (40.8–51.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	372	186	51.0 (45.6–56.3)	186	49.0 (43.7–54.4)	
стимулятори	33	19	58.3 (40.2–74.4)	14	41.7 (25.6–59.8)	
опі+стимул	51	30	55.7 (41.1–69.5)	21	44.3 (30.5–58.9)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	406	204	50.7 (45.6–55.8)	202	49.3 (44.2–54.4)	0.3151
стимулятори	47	29	62.8 (47.6–75.8)	18	37.2 (24.2–52.4)	
інші	3	2	64.3 (0.9–99.7)	1	35.7 (0.3–99.1)	

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
так	78	35.1	(28.7–42.2)	14	24.5	(14.6–38.0)	64	39.0	(31.3–47.3)	0.0597
N	210			56			154			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	52	66.9	(55.1–76.9)	5	100.0		47	64.4	(52.1–75.0)	0.0985
N	76			5			71			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	2	64.7	(14.1–95.3)	0	0.0		2	64.7	(14.1–95.3)	
N	3			0			3			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	53	23.4	(18.1–29.8)	9	15.0	(7.7–27.3)	44	26.5	(19.9–34.2)	0.1533
часто	17	7.6	(4.7–12.1)	5	9.3	(3.8–20.8)	12	7.0	(3.9–12.2)	
половина	11	4.8	(2.6–8.5)	2	3.6	(0.9–13.9)	9	5.2	(2.6–9.8)	
іноді	9	4.0	(1.9–8.3)	1	1.7	(0.2–11.6)	8	4.8	(2.1–10.5)	
рідко	20	10.4	(6.7–15.7)	4	6.2	(2.3–15.8)	16	11.9	(7.3–18.7)	
ніколи	101	49.8	(42.7–56.9)	35	64.2	(50.3–76.0)	66	44.6	(36.5–53.0)	
N	211			56			155			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	40	51.5	(39.8–63.1)	2	57.9	(10.7–94.1)	38	51.2	(39.3–63.0)	0.3767
часто	11	16.9	(9.6–28.1)	0	0.0		11	17.7	(10.0–29.3)	
половина	6	8.4	(3.8–17.6)	1	42.1	(5.9–89.3)	5	6.9	(2.9–15.6)	
іноді	2	2.4	(0.6–9.2)	0	0.0		2	2.5	(0.6–9.6)	
рідко	3	5.1	(1.6–14.6)	0	0.0		3	5.3	(1.7–15.2)	
ніколи	11	15.7	(8.8–26.7)	0	0.0		11	16.4	(9.2–27.7)	
N	73			3			70			
Частота використання презервативів: комерційний (я заплатив) партнер										
завжди	3	73.9	(22.6–96.5)	0	0.0		3	73.9	(22.6–96.5)	
часто	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
половина	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
іноді	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	1	26.1	(3.5–77.4)	0	0.0		1	26.1	(3.5–77.4)	
N	4			0			4			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (мені заплатили) партнер										
так				1	100.0		1	100.0		
N				1			1			
Частота використання презервативів: комерційний (мені заплатили) партнер										
завжди				1	100.0		1	100.0		
часто				0	0.0		0	0.0		
половина				0	0.0		0	0.0		
іноді				0	0.0		0	0.0		
рідко				0	0.0		0	0.0		
ніколи				0	0.0		0	0.0		
N				1			1			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

			Результат тесту на ВІЛ				
		N	позитивний		негативний		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	117	22.1 (18.6–26.0)	383	77.9 (74.0–81.4)	1.0000
Стать							
	чоловік	408	85	20.1 (16.4–24.4)	323	79.9 (75.6–83.6)	0.0279
	жінка	92	32	30.8 (22.0–41.1)	60	69.2 (58.9–78.0)	

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	9	0	0.0	9	100.0	0.0000
25-34	117	12	10.2 (5.7–17.6)	105	89.8 (82.4–94.3)	
35-44	248	54	20.5 (15.9–26.1)	194	79.5 (73.9–84.1)	
45+	126	51	38.0 (29.7–47.1)	75	62.0 (52.9–70.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	18	2	9.8 (2.1–35.0)	16	90.2 (65.0–97.9)	0.0004
3-5	47	7	15.1 (7.0–29.3)	40	84.9 (70.7–93.0)	
6-10	64	4	5.3 (1.9–13.8)	60	94.7 (86.2–98.1)	
≥11	371	104	26.5 (22.1–31.4)	267	73.5 (68.6–77.9)	
Партнерський статус						
живе сам	289	61	20.1 (15.8–25.3)	228	79.9 (74.7–84.2)	0.2316
живе з партнером	211	56	24.7 (19.3–31.1)	155	75.3 (68.9–80.7)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	74	16	19.0 (11.6–29.6)	58	81.0 (70.4–88.4)	0.0442
неповний робочий день або тимчасово	328	66	19.4 (15.4–24.2)	262	80.6 (75.8–84.6)	
безробітний	54	20	36.0 (23.7–50.5)	34	64.0 (49.5–76.3)	
інвалідність	37	13	31.4 (18.0–48.7)	24	68.6 (51.3–82.0)	
інші	6	2	30.7 (4.3–81.3)	4	69.3 (18.7–95.7)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	77	23	28.8 (19.4–40.5)	54	71.2 (59.5–80.6)	0.1669
3-10 тис	211	50	21.8 (16.7–28.0)	161	78.2 (72.0–83.3)	
10-20 тис	165	29	16.4 (11.4–23.0)	136	83.6 (77.0–88.6)	
≥20 тис	26	7	26.6 (12.4–48.2)	19	73.4 (51.8–87.6)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	306	53	16.0 (12.3–20.6)	253	84.0 (79.4–87.7)	0.0001
так	190	62	31.8 (25.3–39.1)	128	68.2 (60.9–74.7)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	220	43	18.4 (13.8–24.2)	177	81.6 (75.8–86.2)	0.0688
так	272	73	25.4 (20.5–31.1)	199	74.6 (68.9–79.5)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	411	89	20.2 (16.6–24.4)	322	79.8 (75.6–83.4)	0.0584
так	66	21	30.9 (20.5–43.7)	45	69.1 (56.3–79.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	406	98	22.7 (18.8–27.1)	308	77.3 (72.9–81.2)	
стимулятори	40	8	18.0 (8.8–33.3)	32	82.0 (66.7–91.2)	
опі+стимул	54	11	20.4 (11.3–34.2)	43	79.6 (65.8–88.7)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	442	105	22.5 (18.8–26.8)	337	77.5 (73.2–81.2)	0.5900
стимулятори	55	11	17.3 (9.5–29.6)	44	82.7 (70.4–90.5)	
інші	3	1	35.7 (0.3–99.1)	2	64.3 (0.9–99.7)	




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)




Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)




Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
		N	ні		так	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	492	220	45.1 (40.5–49.7)	272	54.9 (50.3–59.5)	1.0000
Стать							
	чоловік	400	182	46.3 (41.2–51.5)	218	53.7 (48.5–58.8)	0.2765
	жінка	92	38	39.8 (29.9–50.6)	54	60.2 (49.4–70.1)	

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	9	3	33.6 (8.6–73.0)	6	66.4 (27.0–91.4)	0.0153
25-34	115	65	58.5 (48.9–67.5)	50	41.5 (32.5–51.1)	
35-44	244	104	42.5 (36.1–49.1)	140	57.5 (50.9–63.9)	
45+	124	48	39.2 (30.6–48.5)	76	60.8 (51.5–69.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	18	14	80.1 (54.7–93.1)	4	19.9 (6.9–45.3)	0.0004
3-5	47	24	53.5 (38.4–68.0)	23	46.5 (32.0–61.6)	
6-10	62	36	58.8 (45.6–70.9)	26	41.2 (29.1–54.4)	
≥11	365	146	40.0 (34.8–45.3)	219	60.0 (54.7–65.2)	
Партнерський статус						
живе сам	282	123	43.5 (37.6–49.7)	159	56.5 (50.3–62.4)	0.4442
живе з партнером	210	97	47.2 (40.2–54.3)	113	52.8 (45.7–59.8)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	72	27	38.8 (27.7–51.3)	45	61.2 (48.7–72.3)	0.4024
неповний робочий день або тимчасово	324	154	47.5 (41.9–53.3)	170	52.5 (46.7–58.1)	
безробітний	53	24	46.4 (32.5–60.8)	29	53.6 (39.2–67.5)	
інвалідність	37	12	33.0 (18.9–51.0)	25	67.0 (49.0–81.1)	
інші	5	2	44.0 (6.5–89.9)	3	56.0 (10.1–93.5)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	75	35	45.3 (33.7–57.3)	40	54.7 (42.7–66.3)	0.4696
3-10 тис	210	103	48.7 (41.6–55.8)	107	51.3 (44.2–58.4)	
10-20 тис	160	66	42.5 (34.7–50.7)	94	57.5 (49.3–65.3)	
≥20 тис	26	7	33.7 (16.5–56.7)	19	66.3 (43.3–83.5)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	301	141	47.1 (41.3–53.1)	160	52.9 (46.9–58.7)	0.3483
так	187	79	42.6 (35.3–50.2)	108	57.4 (49.8–64.7)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	404	196	49.0 (43.9–54.1)	208	51.0 (45.9–56.1)	0.0000
так	66	12	18.4 (10.4–30.5)	54	81.6 (69.5–89.6)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	116	43	37.3 (28.6–46.9)	73	62.7 (53.1–71.4)	0.0688
негативний	376	177	47.3 (42.1–52.6)	199	52.7 (47.4–57.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	400	180	44.9 (39.8–50.1)	220	55.1 (49.9–60.2)	
стимулятори	39	20	54.9 (38.5–70.3)	19	45.1 (29.7–61.5)	
опі+стимул	53	20	39.5 (26.7–54.1)	33	60.5 (45.9–73.3)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	435	193	44.5 (39.6–49.4)	242	55.5 (50.6–60.4)	0.5387
стимулятори	54	26	51.5 (37.6–65.1)	28	48.5 (34.9–62.4)	
інші	3	1	28.6 (0.2–98.7)	2	71.4 (1.3–99.8)	




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	88.4	87.6	91.2	0.3076
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	49.5	47.3	57.0	0.0810

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
невиявлений = непередаваний	53.1	51.4	59.1	0.1604
ПКП знижує ризик	54.3	53.1	58.7	0.3093
АРТ слід починати негайно	87.5	87.8	86.3	0.6685
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	74.5	74.9	73.1	0.7141
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	79.1	77.3	85.2	0.0668
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	92.9	92.5	94.4	0.4987
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	93.8	93.0	96.6	0.1683
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	78.2	78.3	77.8	0.9096
лікування слід починати негайно	83.0	83.9	79.8	0.3232
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	68.3	68.5	67.6	0.8603
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	11.8	12.1	10.4	0.6104
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	83.4	83.0	84.7	0.6910
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	65.1	64.2	68.1	0.4658
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	73.3	72.6	75.8	0.5160
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	5.6	5.6	5.7	0.9806
лікування слід починати негайно	83.7	83.1	85.9	0.4919
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	74.4	75.3	71.1	0.3836
ВГС на 100% передається від матері до дитини	11.2	11.5	10.2	0.6952
ВГС передається через кров і статевим шляхом	90.1	91.0	87.0	0.2103
лікування ВГС не існує	74.0	74.2	73.0	0.7910
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	75.0	75.1	74.4	0.8718
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	80.5	79.7	83.3	0.4125

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	429	88.2	(84.8–90.9)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	462	93.7	(90.9–95.6)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	240	55.0	(50.1–59.9)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	157	36.3	(31.7–41.2)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	451	98.8	(97.1–99.5)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	450	100.0	
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	92	19.2	(15.8–23.2)
негативний	364	80.8	(76.8–84.2)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	289	66.1	(61.3–70.7)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	2	0.4	(0.1–1.7)
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	145	72.3	(65.4–78.4)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	32	22.9	(16.4–31.2)
негативний	106	75.7	(67.4–82.4)
не може розкрити	2	1.4	(0.3–5.6)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

			Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	435	195	45.0 (40.1–49.9)	240	55.0 (50.1–59.9)	1.0000
Стать							
	чоловік	357	156	44.2 (38.9–49.7)	201	55.8 (50.3–61.1)	0.5358
	жінка	78	39	48.3 (36.8–59.9)	39	51.7 (40.1–63.2)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	8	4	44.6 (13.2–80.9)	4	55.4 (19.1–86.8)	0.9963
25-34	103	45	45.9 (36.0–56.1)	58	54.1 (43.9–64.0)	
35-44	214	95	44.5 (37.6–51.6)	119	55.5 (48.4–62.4)	
45+	110	51	45.2 (35.8–55.0)	59	54.8 (45.0–64.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	11	7	64.9 (32.7–87.5)	4	35.1 (12.5–67.3)	0.3651
3-5	39	19	48.7 (32.9–64.8)	20	51.3 (35.2–67.1)	
6-10	53	18	36.8 (24.2–51.6)	35	63.2 (48.4–75.8)	
≥11	332	151	45.3 (39.7–51.0)	181	54.7 (49.0–60.3)	
Партнерський статус						
живе сам	255	102	39.8 (33.7–46.3)	153	60.2 (53.7–66.3)	0.0166
живе з партнером	180	93	52.1 (44.4–59.6)	87	47.9 (40.4–55.6)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	67	26	38.7 (27.3–51.6)	41	61.3 (48.4–72.7)	0.1835
неповний робочий день або тимчасово	281	125	44.8 (38.8–50.9)	156	55.2 (49.1–61.2)	
безробітний	47	24	55.4 (40.2–69.7)	23	44.6 (30.3–59.8)	
інвалідність	34	15	38.7 (23.2–56.9)	19	61.3 (43.1–76.8)	
інші	5	4	85.9 (25.4–99.1)	1	14.1 (0.9–74.6)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	66	34	54.3 (41.5–66.6)	32	45.7 (33.4–58.5)	0.4546
3-10 тис	180	81	43.2 (35.8–50.9)	99	56.8 (49.1–64.2)	
10-20 тис	148	61	42.8 (34.7–51.3)	87	57.2 (48.7–65.3)	
≥20 тис	26	12	43.8 (25.0–64.5)	14	56.2 (35.5–75.0)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	266	113	42.7 (36.6–49.0)	153	57.3 (51.0–63.4)	0.1741
так	165	82	49.7 (41.7–57.8)	83	50.3 (42.2–58.3)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

	N	Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців: ні		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців: так		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	172	105	60.8 (53.0–68.1)	67	39.2 (31.9–47.0)	0.0000
так	255	88	34.7 (28.9–41.1)	167	65.3 (58.9–71.1)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	353	168	47.4 (42.0–52.9)	185	52.6 (47.1–58.0)	0.0430
так	63	19	32.6 (21.3–46.3)	44	67.4 (53.7–78.7)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	102	67	66.9 (56.8–75.6)	35	33.1 (24.4–43.2)	0.0000
негативний	333	128	38.9 (33.5–44.5)	205	61.1 (55.5–66.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	356	160	44.8 (39.4–50.3)	196	55.2 (49.7–60.6)	
стимулятори	30	11	37.1 (21.0–56.6)	19	62.9 (43.4–79.0)	
опі+стимул	49	24	50.9 (36.4–65.3)	25	49.1 (34.7–63.6)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	390	177	45.6 (40.5–50.8)	213	54.4 (49.2–59.5)	0.3657
стимулятори	43	18	41.1 (26.8–57.1)	25	58.9 (42.9–73.2)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	117	73.0 (63.9–80.5)	1.0000	86	96.2 (88.7–98.8)	1.0000	83	72	87.0 (77.7–92.8)	1.0000
Стать											
	чоловік	85	69.3 (58.3–78.4)	0.1409	59	96.8 (87.8–99.2)	0.6977	57	51	90.7 (80.4–95.9)	0.1255
	жінка	32	83.5 (65.1–93.2)		27	94.9 (70.9–99.3)		26	21	78.1 (56.4–90.8)	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4										
<25	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
25-34	12	83.4 (50.1–96.2)		10	86.8 (44.7–98.2)		9	8	87.8 (46.6–98.3)	
35-44	54	60.7 (46.8–73.0)		32	97.5 (83.7–99.6)		31	27	89.5 (74.4–96.2)	
45+	51	85.0 (71.2–92.9)		44	97.4 (83.6–99.6)		43	37	84.7 (69.3–93.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	2	100.0	0.1272	2	100.0	0.0048	2	0	0.0	0.0034
3-5	7	41.8 (12.9–77.7)		3	57.9 (10.4–94.3)		2	2	100.0	
6-10	4	50.0 (11.6–88.4)		2	100.0		2	2	100.0	
≥11	104	75.6 (66.1–83.1)		79	97.5 (90.6–99.4)		77	68	88.4 (78.9–94.0)	
Партнерський статус										
живе сам	61	66.6 (53.3–77.6)	0.1092	41	97.9 (86.1–99.7)	0.4381	40	38	95.7 (83.7–99.0)	0.0187
живе з партнером	56	80.2 (67.2–88.9)		45	94.7 (80.9–98.7)		43	34	78.7 (63.4–88.8)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	16	77.8 (48.5–92.8)	0.0880	13	100.0	0.8467	13	12	91.1 (56.1–98.8)	0.2992
неповний робочий день або тимчасово	66	63.3 (50.7–74.2)		41	94.8 (81.0–98.7)		39	33	84.0 (68.2–92.8)	
безробітний	20	93.4 (64.0–99.1)		19	94.3 (67.6–99.2)		18	17	95.6 (73.5–99.4)	
інвалідність	13	83.5 (50.6–96.2)		11	100.0		11	9	86.1 (55.3–96.9)	
інші	2	100.0		2	100.0		2	1	43.1 (1.9–96.6)	
Категорія місячного доходу										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	23	81.6 (59.2–93.1)	0.8006	19	100.0	0.8108	19	18	96.5 (78.0–99.5)	0.1270
3-10 тис	50	70.6 (56.2–81.8)		35	96.3 (77.8–99.5)		34	26	76.5 (59.0–88.0)	
10-20 тис	29	70.8 (50.8–85.0)		21	95.5 (73.6–99.4)		20	18	89.4 (64.1–97.5)	
≥20 тис	7	72.0 (30.2–93.8)		5	100.0		5	5	100.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	53	71.4 (57.2–82.4)	0.6861	39	96.5 (78.8–99.5)	0.9051	38	30	78.6 (62.1–89.2)	0.0508
так	62	74.9 (62.3–84.4)		46	95.9 (84.9–99.0)		44	41	93.4 (81.3–97.9)	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	43	47.8 (32.9–63.0)	0.0000	21	100.0	0.3159	21	18	86.2 (64.1–95.6)	0.8965
так	73	88.8 (78.8–94.4)		65	95.0 (85.3–98.4)		62	54	87.3 (76.1–93.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	89	68.8 (58.0–77.9)	0.0162	62	96.1 (85.6–99.0)	0.9332	60	51	84.5 (72.4–91.9)	0.0638
так	21	95.1 (71.3–99.3)		20	95.7 (74.0–99.4)		19	19	100.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	117	73.0 (63.8–80.6)		86	96.2 (88.6–98.8)		83	72	87.0 (77.6–92.8)	
негативний	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
опіоїди	98	77.9 (68.1–85.3)		77	95.8 (87.4–98.7)		74	64	86.3 (76.1–92.6)	
стимулятори	8	37.9 (11.8–73.5)		3	100.0		3	3	100.0	
опі+стимул	11	54.0 (25.0–80.5)		6	100.0		6	5	89.2 (47.3–98.7)	
інші	0			0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	105	75.3 (65.7–82.9)	0.1173	80	95.9 (87.9–98.7)	0.8996	77	67	86.9 (77.1–92.9)	0.8791
стимулятори	11	44.1 (18.5–73.4)		5	100.0		5	4	84.2 (35.8–98.1)	
інші	1	100.0		1	100.0		1	1	100.0	

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	6	7.8	(3.4–16.6)
1-2 тижні тому	12	14.7	(8.3–24.9)
3-4 тижні тому	4	4.7	(1.7–12.6)
1-3 місяці тому	6	7.0	(3.1–14.9)
ніколи	56	65.8	(54.5–75.6)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	19	66.8	(45.8–82.8)
ліків не було	3	12.0	(3.6–33.4)
був під впливом	1	6.4	(0.9–33.6)
не хотів, щоб інші бачили	1	3.2	(0.4–19.9)
інші	3	11.6	(3.8–30.6)
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	6	23.9	(11.0–44.5)
відсутність часу на відвідування клініки	4	17.1	(6.4–38.1)
відсутність мотивації відвідувати клініку	6	26.2	(12.2–47.8)
пропуск візиту, важко повернутися	3	14.3	(4.7–36.1)
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	1	3.8	(0.5–22.9)
вживання наркотиків	8	33.9	(17.7–55.0)
побічні ефекти або ускладнення	6	25.3	(11.7–46.3)
немає розуміння як	4	17.0	(6.3–38.3)
втрачено або продано всі АРВ-препарати	2	7.1	(1.7–25.3)
Причини відмови від ДРТ			
вживання алкоголю	6	26.5	(12.4–47.8)
Причини відмови від АРТ			

	n	%	ДІ
довго чекав і пішов	1	2.4	(0.3–15.6)
Час на АРТ			
≤3м	2	8.4	(2.1–28.3)
4-24м	6	22.2	(9.9–42.4)
25-60м	8	29.2	(14.7–49.5)
5 років +	12	40.3	(23.6–59.6)

9. Доконтактна профілактика




Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

			Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
		N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього											
	Разом	496	8	1.6 (0.7–3.5)	8	1.7 (0.8–3.7)	121	24.9 (21.1–29.1)	359	71.9 (67.5–75.9)	1.0000
Стать											
	чоловік	405	7	1.8 (0.8–4.2)	7	1.8 (0.8–4.2)	90	22.2 (18.3–26.7)	301	74.2 (69.4–78.5)	0.0391
	жінка	91	1	0.8 (0.1–5.4)	1	1.1 (0.1–7.4)	31	36.3 (26.4–47.5)	58	61.9 (50.7–71.9)	
Вікова категорія 4											
	<25	9	0	0.0	0	0.0	3	36.9 (10.0–75.5)	6	63.1 (24.5–90.0)	0.2485
	25-34	116	0	0.0	1	0.7 (0.1–4.6)	20	17.8 (11.5–26.5)	95	81.6 (72.8–88.0)	
	35-44	245	6	2.5 (1.0–6.1)	4	2.0 (0.6–5.9)	58	23.9 (18.7–30.0)	177	71.6 (65.2–77.3)	
	45+	126	2	1.3 (0.3–5.4)	3	2.1 (0.6–6.6)	40	32.4 (24.4–41.6)	81	64.2 (55.0–72.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків											
	≤2	18	0	0.0	0	0.0	2	10.4 (2.3–36.3)	16	89.6 (63.7–97.7)	0.0593
	3-5	46	0	0.0	2	3.7 (0.9–14.5)	3	6.7 (2.1–19.6)	41	89.6 (76.4–95.8)	

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
6-10	64	0	0.0	1	1.5 (0.2–10.5)	13	20.7 (12.1–33.3)	50	77.7 (65.1–86.7)	
≥11	368	8	2.2 (1.0–4.7)	5	1.5 (0.5–4.2)	103	28.5 (23.9–33.7)	252	67.8 (62.5–72.7)	
Партнерський статус										
живе сам	286	5	1.4 (0.6–3.4)	4	1.7 (0.5–5.2)	66	23.6 (18.8–29.3)	211	73.3 (67.5–78.5)	0.8870
живе з партнером	210	3	1.9 (0.5–6.9)	4	1.7 (0.6–4.6)	55	26.5 (20.7–33.3)	148	69.9 (62.9–76.0)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	73	3	5.4 (1.4–18.3)	1	1.3 (0.2–9.2)	23	34.1 (23.4–46.6)	46	59.2 (46.6–70.7)	
неповний робочий день або тимчасово	325	5	1.2 (0.5–2.9)	5	1.2 (0.5–2.9)	72	22.7 (18.2–27.9)	243	74.9 (69.7–79.6)	
безробітний	54	0	0.0	2	6.7 (1.5–25.7)	13	22.9 (13.1–36.9)	39	70.4 (55.1–82.2)	
інвалідність	37	0	0.0	0	0.0	12	30.0 (16.9–47.4)	25	70.0 (52.6–83.1)	
інші	6	0	0.0	0	0.0	1	15.1 (1.0–75.3)	5	84.9 (24.7–99.0)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	77	1	0.7 (0.1–5.1)	3	5.5 (1.5–18.1)	16	20.9 (12.8–32.3)	57	72.9 (60.6–82.4)	0.1377
3-10 тис	208	3	1.9 (0.5–6.9)	2	0.7 (0.2–3.0)	58	27.6 (21.7–34.5)	145	69.7 (62.7–75.9)	
10-20 тис	164	3	1.6 (0.5–5.0)	1	0.4 (0.1–2.8)	35	22.4 (16.3–30.0)	125	75.5 (67.9–81.8)	
≥20 тис	26	1	2.7 (0.3–18.7)	1	3.8 (0.5–24.5)	6	24.7 (10.8–47.2)	18	68.7 (46.8–84.6)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	302	3	0.8 (0.3–2.6)	5	1.9 (0.7–5.1)	68	23.8 (19.0–29.3)	226	73.5 (67.8–78.5)	0.3696
так	190	5	2.9 (1.0–7.9)	3	1.4 (0.4–4.4)	50	25.7 (19.8–32.7)	132	70.1 (62.8–76.5)	

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	219	2	0.7 (0.2–2.9)	3	1.2 (0.4–3.8)	21	10.0 (6.5–15.1)	193	88.1 (82.8–91.9)	0.0000
так	269	6	2.4 (0.9–5.9)	5	2.1 (0.7–5.8)	97	36.6 (30.7–42.8)	161	59.0 (52.6–65.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	408	7	1.7 (0.7–4.1)	4	0.8 (0.3–2.2)	89	22.2 (18.3–26.8)	308	75.2 (70.5–79.4)	0.0000
так	65	1	1.3 (0.2–8.9)	4	7.7 (2.5–21.7)	28	43.2 (31.0–56.3)	32	47.7 (35.2–60.6)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	116	2	1.6 (0.4–6.3)	2	1.8 (0.4–7.1)	42	35.2 (26.8–44.7)	70	61.4 (51.8–70.1)	0.0499
негативний	380	6	1.6 (0.6–4.1)	6	1.6 (0.6–4.1)	79	21.9 (17.8–26.7)	289	74.8 (69.8–79.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	402	4	1.1 (0.3–3.6)	7	1.9 (0.8–4.3)	102	26.1 (21.8–30.9)	289	70.9 (65.9–75.5)	
стимулятори	40	2	4.7 (1.1–17.9)	0	0.0	9	19.8 (10.1–35.1)	29	75.5 (59.7–86.5)	
опі+стимул	54	2	3.3 (0.8–12.7)	1	1.4 (0.2–9.5)	10	18.8 (10.1–32.5)	41	76.5 (62.8–86.3)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	438	6	1.4 (0.5–3.6)	8	1.9 (0.9–4.1)	111	26.1 (22.0–30.7)	313	70.6 (65.8–75.0)	0.4563
стимулятори	55	2	3.5 (0.8–13.5)	0	0.0	10	15.7 (8.3–27.7)	43	80.8 (68.2–89.2)	
інші	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	8	1.6	(0.7–3.5)
приймав в минулому	8	1.7	(0.8–3.7)
ніколи не приймав	121	24.9	(21.1–29.1)
не знає що це	359	71.9	(67.5–75.9)
Обізнаність про ДКП			
ні	359	71.4	(67.0–75.4)
так	140	28.6	(24.6–33.0)
Використання ДКП зараз			
ні	488	98.4	(96.5–99.3)
так	8	1.6	(0.7–3.5)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	129	94.3	(87.9–97.4)
так	8	5.7	(2.6–12.1)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)




Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)



Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	2	14.0	(3.4–43.2)
клініка закрита після лютого 2022 року	0	0.0	
слабкий або відсутній ефект	2	17.8	(4.4–50.6)
побічні ефекти	1	6.7	(0.9–35.9)
не хочу відвідувати клініку	1	8.4	(1.2–41.6)
не хочу кидати наркотики	2	16.7	(4.0–49.3)
важко дістатися до клініки	1	5.6	(0.8–31.6)
не потребує	5	31.8	(12.7–59.9)
не подобається ставлення лікаря	1	5.6	(0.8–31.6)
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	4	23.6	(8.8–49.8)
не змінилось	7	46.4	(23.4–71.0)
зменшилося	5	30.0	(12.2–57.0)
Чи купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	212	43.7	(39.2–48.4)
так, бупренорфін	10	1.9	(1.0–3.6)
не купував	275	54.3	(49.7–58.9)
Де купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	275	55.1	(50.4–59.7)
купляв на чорн. ринку	192	40.1	(35.6–44.8)
купляв в приватній клініці	23	4.8	(3.2–7.2)
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорн.ринку			
ін'єкційно	192	88.1	(83.0–91.8)
ін'єкційно у суміші	9	4.2	(2.1–7.9)
ковтав або розсмоктував	12	5.0	(2.8–8.8)
нюхав	6	2.7	(1.2–6.1)

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

		Отримував ЗПТ (з усіх)							
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	477	66	13.7 (10.8–17.3)	13	2.8 (1.6–4.9)	143	29.7 (25.6–34.2)	255	53.8 (49.1–58.5)	1.0000
Стать										
чоловік	388	55	14.0 (10.8–18.1)	13	3.4 (1.9–6.0)	114	29.3 (24.8–34.3)	206	53.2 (47.9–58.4)	0.3572
жінка	89	11	12.2 (6.7–21.1)	0	0.0	29	31.2 (22.1–42.1)	49	56.6 (45.6–67.0)	
Вікова категорія 4										
<25	9	0	0.0	0	0.0	2	22.0 (4.2–64.6)	7	78.0 (35.4–95.8)	0.1709
25-34	112	8	7.0 (3.3–14.0)	2	1.4 (0.3–5.3)	33	28.5 (20.7–37.9)	69	63.1 (53.4–71.9)	
35-44	235	35	14.1 (10.1–19.3)	8	3.4 (1.6–7.0)	71	30.5 (24.6–37.1)	121	52.0 (45.2–58.7)	
45+	121	23	20.0 (13.4–28.7)	3	2.9 (0.9–9.1)	37	29.6 (21.8–38.7)	58	47.6 (38.4–56.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	17	0	0.0	0	0.0	4	21.7 (7.6–48.3)	13	78.3 (51.7–92.4)	0.0611
3-5	44	2	4.1 (1.0–15.8)	0	0.0	12	31.3 (18.1–48.5)	30	64.5 (47.7–78.3)	
6-10	62	7	9.6 (4.4–19.5)	1	1.1 (0.2–8.0)	16	25.9 (16.0–39.0)	38	63.4 (50.2–74.9)	
≥11	354	57	16.3 (12.6–20.8)	12	3.5 (1.9–6.3)	111	30.6 (25.8–35.8)	174	49.7 (44.2–55.1)	
Партнерський статус										
живе сам	276	45	16.4 (12.3–21.6)	10	3.5 (1.8–6.6)	84	30.3 (24.9–36.4)	137	49.8 (43.6–56.0)	0.1128
живе з партнером	201	21	9.9 (6.4–15.0)	3	1.8 (0.6–5.8)	59	28.8 (22.7–35.8)	118	59.4 (52.1–66.3)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	71	8	10.4 (5.1–20.1)	0	0.0	21	32.7 (21.9–45.7)	42	56.9 (44.3–68.6)	0.0590
неповний робочий день або тимчасово	313	39	12.2 (8.9–16.5)	10	3.2 (1.7–6.1)	100	31.7 (26.5–37.3)	164	52.9 (47.1–58.6)	

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	51	12	23.1 (12.6–38.6)	1	1.7 (0.2–11.5)	12	21.9 (12.3–35.9)	26	53.3 (38.6–67.4)	
інвалідність	35	7	21.7 (10.3–40.0)	2	6.1 (1.3–24.1)	4	9.8 (3.5–24.8)	22	62.4 (44.1–77.7)	
інші	6	0	0.0	0	0.0	5	73.8 (14.3–97.9)	1	26.2 (2.1–85.7)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	73	12	17.5 (9.6–29.7)	4	7.4 (2.7–18.8)	23	30.0 (20.2–42.1)	34	45.0 (33.4–57.2)	0.1552
3-10 тис	204	23	10.7 (7.0–15.9)	6	2.2 (1.0–5.0)	58	27.8 (21.8–34.7)	117	59.3 (52.1–66.1)	
10-20 тис	154	23	15.2 (10.2–22.2)	2	1.0 (0.3–4.1)	50	33.4 (26.0–41.8)	79	50.3 (42.1–58.5)	
≥20 тис	25	4	16.0 (5.7–37.6)	1	6.7 (0.9–37.0)	7	25.5 (11.5–47.3)	13	51.8 (31.3–71.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	291	37	12.6 (9.1–17.3)	5	1.7 (0.6–4.2)	81	27.7 (22.7–33.5)	168	58.0 (51.9–63.8)	0.0892
так	182	28	15.1 (10.4–21.2)	8	4.6 (2.2–9.4)	60	32.8 (26.0–40.4)	86	47.5 (40.0–55.2)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	208	12	5.7 (3.2–10.0)	5	2.3 (0.9–5.8)	43	20.8 (15.5–27.3)	148	71.2 (64.3–77.2)	0.0000
так	262	54	20.5 (15.8–26.1)	8	3.2 (1.5–6.6)	96	36.1 (30.2–42.4)	104	40.2 (34.1–46.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	411	0	0.0	13	3.2 (1.8–5.6)	143	34.4 (29.8–39.4)	255	62.4 (57.3–67.2)	0.0000
так	66	66	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	110	21	19.5 (12.8–28.6)	1	1.6 (0.2–10.5)	34	30.1 (22.0–39.7)	54	48.8 (39.2–58.5)	0.2856

	N	Отримував ЗПТ (з усіх)								
		приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
негативний	367	45	12.1 (9.0–16.0)	12	3.1 (1.7–5.6)	109	29.6 (24.9–34.7)	201	55.2 (49.8–60.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	386	63	16.1 (12.6–20.3)	12	3.2 (1.7–5.7)	117	29.9 (25.3–34.9)	194	50.8 (45.6–56.1)	
стимулятори	40	1	2.2 (0.3–14.6)	1	2.2 (0.3–14.6)	8	21.6 (10.8–38.7)	30	74.1 (57.1–86.0)	
опі+стимул	51	2	4.0 (1.0–15.1)	0	0.0	18	34.4 (22.2–49.1)	31	61.6 (46.9–74.4)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	420	65	15.2 (12.0–19.2)	12	2.9 (1.6–5.3)	130	30.3 (25.9–35.1)	213	51.5 (46.5–56.5)	0.0236
стимулятори	54	1	1.6 (0.2–11.2)	1	1.6 (0.2–11.2)	11	22.0 (12.3–36.1)	41	74.8 (60.6–85.1)	
інші	3	0	0.0	0	0.0	2	71.4 (1.3–99.8)	1	28.6 (0.2–98.7)	



Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)




Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

	n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь			
так	210	42.6	(38.1–47.3)
Кількість передозувань протягом життя			
1	52	25.4	(19.7–32.0)
2-4	108	53.0	(45.7–60.1)
5+	43	21.7	(16.1–28.5)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців			
так	36	7.4	(5.2–10.4)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)			
так	36	17.4	(12.4–23.8)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців			
1	17	46.4	(29.4–64.3)

	n	%	ДІ
2-4	14	44.1	(26.9–62.7)
5+	4	9.6	(3.5–23.7)
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)			
метадон	13	47.1	(26.8–68.4)
інші опіоїди	1	9.9	(1.4–45.2)
стимулятор	8	29.2	(14.0–51.0)
інші	2	13.9	(3.2–43.9)
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)			
метадон+стимулятор	4	100.0	
метадон+барбіт. або димедр.	0	0.0	
метадон+інше	0	0.0	
інші	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)			
метадон	8	100.0	
інші опіоїди	0	0.0	
стимулятор	0	0.0	
інші	0	0.0	
Знання та досвід налоксону			
ніколи не чув	82	16.8	(13.6–20.5)
знає, але не користувався	209	42.4	(37.9–47.0)
користувався	71	13.5	(10.7–16.9)
користувались друзі	124	24.5	(20.8–28.6)
користувався сам та друзі	14	2.9	(1.7–4.9)

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	497	461	92.6 (89.6–94.8)	36	7.4 (5.2–10.4)	1.0000
Стать						
чоловік	407	376	92.0 (88.4–94.5)	31	8.0 (5.5–11.6)	0.2579
жінка	90	85	95.3 (88.8–98.1)	5	4.7 (1.9–11.2)	
Вікова категорія 4						
<25	9	9	100.0	0	0.0	0.0017
25-34	117	111	96.0 (91.2–98.3)	6	4.0 (1.7–8.8)	
35-44	247	221	88.5 (83.2–92.3)	26	11.5 (7.7–16.8)	
45+	124	120	97.8 (94.0–99.2)	4	2.2 (0.8–6.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	18	16	88.2 (59.8–97.4)	2	11.8 (2.6–40.2)	0.3214

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	47	43	87.7 (69.1–95.8)	4	12.3 (4.2–30.9)	
6-10	64	61	97.0 (90.7–99.1)	3	3.0 (0.9–9.3)	
≥11	368	341	92.6 (89.1–95.1)	27	7.4 (4.9–10.9)	
Партнерський статус						
живе сам	289	269	93.6 (89.8–96.0)	20	6.4 (4.0–10.2)	0.3764
живе з партнером	208	192	91.2 (85.6–94.8)	16	8.8 (5.2–14.4)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	74	71	93.5 (80.1–98.1)	3	6.5 (1.9–19.9)	0.4144
неповний робочий день або тимчасово	326	304	93.6 (90.0–95.9)	22	6.4 (4.1–10.0)	
безробітний	54	46	85.2 (71.9–92.8)	8	14.8 (7.2–28.1)	
інвалідність	36	34	92.7 (73.9–98.3)	2	7.3 (1.7–26.1)	
інші	6	5	89.6 (33.6–99.3)	1	10.4 (0.7–66.4)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	77	70	92.2 (83.4–96.5)	7	7.8 (3.5–16.6)	0.5463
3-10 тис	210	193	91.4 (86.1–94.8)	17	8.6 (5.2–13.9)	
10-20 тис	163	152	92.6 (86.2–96.2)	11	7.4 (3.8–13.8)	
≥20 тис	26	26	100.0	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	304	286	94.0 (90.2–96.3)	18	6.0 (3.7–9.8)	0.1652
так	189	171	90.2 (84.2–94.1)	18	9.8 (5.9–15.8)	

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	220	197	89.0 (83.5–92.8)	23	11.0 (7.2–16.5)	0.0059
так	269	258	96.1 (92.6–98.0)	11	3.9 (2.0–7.4)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	409	381	92.5 (88.9–94.9)	28	7.5 (5.1–11.1)	0.6390
так	66	58	90.9 (82.3–95.6)	8	9.1 (4.4–17.7)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	116	109	93.7 (86.8–97.1)	7	6.3 (2.9–13.2)	0.6271
негативний	381	352	92.3 (88.6–94.8)	29	7.7 (5.2–11.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	403	379	93.5 (90.1–95.8)	24	6.5 (4.2–9.9)	
стимулятори	40	37	93.3 (79.6–98.0)	3	6.7 (2.0–20.4)	
опі+стимул	54	45	84.8 (72.0–92.4)	9	15.2 (7.6–28.0)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	439	410	93.0 (89.7–95.2)	29	7.0 (4.8–10.3)	0.5216
стимулятори	55	48	88.9 (77.6–94.9)	7	11.1 (5.1–22.4)	
інші	3	3	100.0	0	0.0	

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	500	82	16.8 (13.6–20.5)	333	66.9 (62.4–71.1)	85	16.3 (13.2–20.0)	1.0000
Стать								
чоловік	408	62	15.5 (12.1–19.5)	279	68.8 (63.9–73.3)	67	15.7 (12.4–19.8)	0.1812
жінка	92	20	22.4 (14.5–33.0)	54	58.7 (47.8–68.9)	18	18.8 (11.9–28.5)	
Вікова категорія 4								
<25	9	1	7.6 (0.7–48.7)	7	83.8 (44.7–97.1)	1	8.6 (0.8–52.3)	0.6471

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
25-34	117	18	14.6 (9.2–22.3)	73	64.3 (54.8–72.7)	26	21.2 (14.5–29.8)	
35-44	248	43	18.2 (13.6–24.0)	167	67.1 (60.6–73.0)	38	14.7 (10.6–19.9)	
45+	126	20	16.2 (10.5–24.2)	86	67.7 (58.6–75.7)	20	16.0 (10.3–24.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	18	7	40.2 (19.2–65.5)	10	55.1 (30.7–77.3)	1	4.7 (0.6–30.4)	0.0640
3-5	47	10	22.1 (11.8–37.5)	32	68.8 (53.4–81.0)	5	9.1 (3.6–21.0)	
6-10	64	13	19.7 (11.4–31.8)	40	65.0 (52.0–76.1)	11	15.3 (8.3–26.7)	
≥11	371	52	14.5 (11.1–18.8)	251	67.6 (62.3–72.4)	68	17.9 (14.2–22.4)	
Партнерський статус								
живе сам	289	45	15.7 (11.8–20.7)	200	70.5 (64.7–75.7)	44	13.8 (10.2–18.3)	0.1348
живе з партнером	211	37	18.2 (13.3–24.4)	133	62.1 (54.9–68.7)	41	19.7 (14.6–26.1)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	74	15	20.4 (12.4–31.9)	47	62.0 (49.6–73.0)	12	17.6 (9.8–29.5)	0.5706
неповний робочий день або тимчасово	328	48	14.9 (11.2–19.5)	225	69.4 (64.0–74.4)	55	15.7 (12.1–20.1)	
безробітний	54	8	17.1 (8.5–31.4)	33	59.8 (45.2–72.8)	13	23.1 (13.4–36.8)	
інвалідність	37	10	25.9 (13.8–43.3)	23	62.4 (44.7–77.2)	4	11.8 (4.3–28.3)	
інші	6	1	13.2 (0.9–72.3)	4	76.3 (25.2–96.9)	1	10.4 (0.7–66.4)	
Категорія місячного доходу								

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	77	18	24.3 (15.5–35.8)	44	57.3 (45.3–68.4)	15	18.5 (11.1–29.1)	0.4370
3-10 тис	211	32	16.0 (11.4–22.2)	147	69.4 (62.4–75.6)	32	14.6 (10.2–20.3)	
10-20 тис	165	24	13.6 (9.1–19.9)	111	69.5 (61.8–76.2)	30	16.9 (11.9–23.5)	
≥20 тис	26	3	14.8 (4.5–38.7)	18	62.0 (39.8–80.0)	5	23.3 (9.6–46.5)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	306	56	18.2 (14.1–23.2)	204	67.5 (61.8–72.8)	46	14.3 (10.7–18.7)	0.2272
так	190	26	14.7 (10.1–21.1)	125	65.2 (57.7–72.1)	39	20.0 (14.6–26.7)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	220	55	24.9 (19.4–31.3)	133	61.1 (54.2–67.6)	32	14.0 (9.9–19.5)	0.0003
так	272	26	10.3 (7.0–15.0)	194	71.2 (65.2–76.6)	52	18.4 (14.1–23.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	411	75	18.9 (15.2–23.2)	272	66.2 (61.2–70.8)	64	14.9 (11.7–18.9)	0.0026
так	66	4	5.2 (1.9–13.6)	43	67.0 (54.2–77.6)	19	27.8 (18.0–40.4)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	117	21	18.9 (12.4–27.7)	73	61.4 (51.8–70.2)	23	19.7 (13.2–28.3)	0.3867
негативний	383	61	16.2 (12.6–20.5)	260	68.5 (63.4–73.1)	62	15.4 (12.0–19.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	406	56	14.0 (10.8–18.0)	281	69.6 (64.6–74.1)	69	16.4 (13.0–20.6)	
стимулятори	40	12	34.2 (20.3–51.6)	22	51.8 (35.7–67.6)	6	13.9 (6.1–28.6)	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N		не знає	знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
опі+стимул	54	14	25.6 (15.3–39.7)	30	57.3 (43.2–70.4)	10	17.0 (9.0–29.8)	
інші	0	0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	442	64	14.8 (11.6–18.7)	302	68.6 (63.9–73.0)	76	16.6 (13.3–20.5)	0.0093
стимулятори	55	18	34.8 (22.7–49.2)	29	52.3 (38.5–65.7)	8	12.9 (6.3–24.5)	
інші	3	0	0.0	2	64.3 (0.9–99.7)	1	35.7 (0.3–99.1)	

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	87	18.9	(15.4–23.0)
	гепатит C	244	54.2	(49.3–59.0)
	сифіліс	8	1.4	(0.7–2.8)
	гонорея	13	2.5	(1.4–4.3)
	хламідіоз	17	3.6	(2.2–5.9)
	герпес	109	23.3	(19.6–27.6)
	папіломавірус	17	3.9	(2.4–6.2)
	туберкульоз	77	15.3	(12.3–18.8)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	55	65.5	(54.1–75.3)
	пролікувався неуспішно	5	5.7	(2.3–13.3)
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	25	28.9	(19.7–40.1)
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	58	25.4	(19.9–31.9)
	пролікувався неуспішно	13	4.7	(2.7–8.1)
	не завершив	9	4.0	(2.0–7.8)
	зараз лікується	15	6.8	(4.0–11.5)
	ніколи не лікувався	144	59.0	(52.2–65.4)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	8	100.0	
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	0	0.0	
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	67	87.9	(78.6–93.5)
	пролікувався неуспішно	4	4.1	(1.5–10.7)
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	6	8.0	(3.6–16.9)

	n	%	ДІ
ніколи не лікувався	0	0.0	

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

	n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців			
так	139	28.2	(24.2–32.6)
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	101	20.5	(17.0–24.5)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	74	76.2	(66.6–83.7)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	25	22.7	(15.5–32.0)
приватна клініка	2	1.7	(0.4–6.7)
приватна лабораторія	0	0.0	
протитуберкульозного диспансеру	5	5.2	(2.1–12.3)
наркологічний диспансер	0	0.0	
ІПСШ	0	0.0	
швидкої допомоги	2	2.0	(0.5–7.6)
мобільна амбулаторія	1	0.5	(0.1–3.5)
інше	4	4.1	(1.4–11.3)
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	66	68.8	(58.7–77.3)
лікарня, ВІЛ-клініка	23	21.0	(14.1–30.1)
приватна клініка	1	1.0	(0.1–6.7)
приватна лабораторія	0	0.0	
протитуберкульозний диспансер	5	5.2	(2.1–12.3)
наркологічна клініка	0	0.0	
ІПСШ клініка	0	0.0	
швидка допомога	0	0.0	
мобільна клініка	1	0.5	(0.1–3.5)
інші	3	3.6	(1.1–11.1)
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	92	91.3	(83.2–95.7)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	387	78.5	(74.5–82.0)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	13	3.2	(1.8–5.6)
раз на місяць	40	10.5	(7.7–14.2)
3-4 рази в 12 місяців	118	31.1	(26.4–36.2)
тільки один раз	213	55.1	(49.9–60.3)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	496	446	89.8 (86.6–92.3)	50	10.2 (7.7–13.4)	1.0000
Стать							
	чоловік	404	362	89.3 (85.6–92.1)	42	10.7 (7.9–14.4)	0.4345
	жінка	92	84	92.0 (84.5–96.1)	8	8.0 (3.9–15.5)	
Вікова категорія 4							
	<25	8	6	75.6 (31.5–95.4)	2	24.4 (4.6–68.5)	0.0083
	25-34	115	98	84.8 (76.5–90.6)	17	15.2 (9.4–23.5)	
	35-44	247	221	89.1 (84.1–92.6)	26	10.9 (7.4–15.9)	
	45+	126	121	96.9 (92.6–98.7)	5	3.1 (1.3–7.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	17	14	80.7 (51.8–94.2)	3	19.3 (5.8–48.2)	0.0026
	3-5	46	38	79.2 (62.2–89.9)	8	20.8 (10.1–37.8)	
	6-10	63	51	81.2 (68.9–89.4)	12	18.8 (10.6–31.1)	
	≥11	370	343	93.0 (89.8–95.3)	27	7.0 (4.7–10.2)	
Партнерський статус							

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	287	260	89.9 (85.3–93.1)	27	10.1 (6.9–14.7)	0.9694
живе з партнером	209	186	89.8 (84.8–93.2)	23	10.2 (6.8–15.2)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	73	69	95.1 (87.0–98.2)	4	4.9 (1.8–13.0)	0.3936
неповний робочий день або тимчасово	325	287	88.4 (84.2–91.6)	38	11.6 (8.4–15.8)	
безробітний	54	50	90.9 (77.3–96.7)	4	9.1 (3.3–22.7)	
інвалідність	37	35	94.4 (79.2–98.7)	2	5.6 (1.3–20.8)	
інші	6	5	82.5 (21.5–98.8)	1	17.5 (1.2–78.5)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	77	66	84.6 (73.4–91.6)	11	15.4 (8.4–26.6)	0.4244
3-10 тис	211	192	91.1 (86.3–94.4)	19	8.9 (5.6–13.7)	
10-20 тис	161	147	91.2 (85.0–95.0)	14	8.8 (5.0–15.0)	
≥20 тис	26	23	89.7 (70.1–97.0)	3	10.3 (3.0–29.9)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	302	268	88.1 (83.6–91.6)	34	11.9 (8.4–16.4)	0.1458
так	190	174	92.3 (87.5–95.4)	16	7.7 (4.6–12.5)	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	217	191	86.8 (81.0–91.1)	26	13.2 (8.9–19.0)	0.0732
так	271	247	92.0 (88.2–94.7)	24	8.0 (5.3–11.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	407	362	88.8 (85.0–91.7)	45	11.2 (8.3–15.0)	0.1523
так	66	62	94.5 (85.7–98.0)	4	5.5 (2.0–14.3)	
Результат тесту на ВІЛ						

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	117	108	91.0 (83.4–95.3)	9	9.0 (4.7–16.6)	0.6571
негативний	379	338	89.5 (85.7–92.3)	41	10.5 (7.7–14.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	403	379	94.0 (90.9–96.1)	24	6.0 (3.9–9.1)	
стимулятори	39	33	83.6 (66.9–92.8)	6	16.4 (7.2–33.1)	
опі+стимул	54	34	61.6 (47.3–74.3)	20	38.4 (25.7–52.7)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	439	402	91.5 (88.2–93.9)	37	8.5 (6.1–11.8)	0.0003
стимулятори	54	43	79.3 (65.6–88.5)	11	20.7 (11.5–34.4)	
інші	3	1	35.7 (0.3–99.1)	2	64.3 (0.9–99.7)	

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	142	28.7 (24.7–33.0)	196	39.6 (35.2–44.2)	93	18.1 (14.9–21.9)	69	13.6 (10.7–17.0)	1.0000
Стать										
чоловік	408	115	28.3 (24.0–33.1)	164	40.5 (35.6–45.6)	73	17.6 (14.1–21.9)	56	13.6 (10.5–17.5)	0.8618
жінка	92	27	30.2 (21.1–41.2)	32	35.9 (26.3–46.8)	20	20.4 (13.2–30.2)	13	13.5 (7.7–22.5)	
Вікова категорія 4										
<25	9	5	61.9 (25.2–88.7)	2	20.6 (3.8–63.0)	1	7.6 (0.7–48.7)	1	10.0 (0.9–56.4)	0.1132
25-34	117	36	30.3 (22.4–39.6)	54	47.8 (38.5–57.3)	13	10.7 (6.1–18.1)	14	11.2 (6.5–18.7)	
35-44	248	71	28.5 (23.0–34.9)	91	36.7 (30.7–43.3)	48	19.4 (14.7–25.2)	38	15.3 (11.1–20.6)	
45+	126	30	25.2 (18.0–34.1)	49	39.6 (31.0–48.9)	31	22.9 (16.3–31.2)	16	12.3 (7.5–19.5)	

	N	Результат скринінгу депресії PHQ-9								
		мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	18	7	40.2 (19.2–65.5)	3	16.1 (4.8–42.3)	4	24.6 (8.8–52.3)	4	19.2 (6.6–44.3)	0.3101
3-5	47	16	34.5 (21.7–50.0)	18	36.4 (23.4–51.6)	5	12.1 (4.3–29.3)	8	17.0 (8.3–31.7)	
6-10	64	24	38.2 (26.6–51.3)	26	39.3 (27.6–52.3)	8	12.8 (6.2–24.5)	6	9.8 (4.1–21.5)	
≥11	371	95	25.7 (21.3–30.7)	149	41.2 (36.0–46.6)	76	19.5 (15.7–24.0)	51	13.5 (10.3–17.6)	
Партнерський статус										
живе сам	289	80	28.7 (23.5–34.6)	117	40.4 (34.6–46.5)	49	16.5 (12.5–21.5)	43	14.4 (10.7–19.1)	0.7207
живе з партнером	211	62	28.6 (22.7–35.3)	79	38.5 (31.8–45.7)	44	20.4 (15.3–26.6)	26	12.5 (8.5–18.0)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	74	28	36.6 (25.9–48.7)	31	42.7 (31.2–55.0)	8	11.4 (5.6–21.7)	7	9.4 (4.3–19.1)	0.0148
неповний робочий день або тимчасово	328	92	28.8 (23.9–34.3)	133	40.5 (35.1–46.2)	67	19.8 (15.6–24.7)	36	10.9 (7.8–14.9)	
безробітний	54	14	23.6 (13.9–37.3)	14	26.1 (15.2–40.9)	10	19.9 (10.8–33.8)	16	30.4 (18.9–45.1)	
інвалідність	37	8	23.7 (11.5–42.7)	16	44.8 (28.6–62.2)	7	16.8 (7.7–32.8)	6	14.7 (6.2–31.0)	
інші	6	0	0.0	2	43.7 (7.4–88.3)	1	13.2 (0.9–72.3)	3	43.0 (8.0–86.8)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	77	17	23.2 (14.6–34.8)	28	37.5 (26.7–49.7)	18	21.0 (13.2–31.8)	14	18.3 (10.7–29.6)	0.7013
3-10 тис	211	59	28.9 (22.8–35.8)	82	39.4 (32.6–46.5)	43	19.7 (14.7–25.8)	27	12.1 (8.3–17.4)	
10-20 тис	165	50	29.8 (23.1–37.5)	69	41.8 (34.2–49.8)	27	16.8 (11.5–24.1)	19	11.6 (7.3–17.8)	
≥20 тис	26	10	39.7 (21.6–61.1)	10	36.5 (19.4–57.8)	2	7.5 (1.6–28.0)	4	16.3 (5.7–38.7)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	306	96	31.9 (26.6–37.7)	118	37.9 (32.4–43.7)	51	16.6 (12.6–21.5)	41	13.6 (10.0–18.2)	0.2120

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	190	44	23.1 (17.4–29.9)	77	42.5 (35.2–50.1)	41	20.7 (15.3–27.3)	28	13.8 (9.5–19.6)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	142	28.7 (24.7–33.0)	196	39.6 (35.2–44.2)	93	18.1 (14.9–21.9)	69	13.6 (10.7–17.0)	1.0000
Стать										
чоловік	408	115	28.3 (24.0–33.1)	164	40.5 (35.6–45.6)	73	17.6 (14.1–21.9)	56	13.6 (10.5–17.5)	0.8618
жінка	92	27	30.2 (21.1–41.2)	32	35.9 (26.3–46.8)	20	20.4 (13.2–30.2)	13	13.5 (7.7–22.5)	
Вікова категорія 4										
<25	9	5	61.9 (25.2–88.7)	2	20.6 (3.8–63.0)	1	7.6 (0.7–48.7)	1	10.0 (0.9–56.4)	0.1132
25-34	117	36	30.3 (22.4–39.6)	54	47.8 (38.5–57.3)	13	10.7 (6.1–18.1)	14	11.2 (6.5–18.7)	
35-44	248	71	28.5 (23.0–34.9)	91	36.7 (30.7–43.3)	48	19.4 (14.7–25.2)	38	15.3 (11.1–20.6)	
45+	126	30	25.2 (18.0–34.1)	49	39.6 (31.0–48.9)	31	22.9 (16.3–31.2)	16	12.3 (7.5–19.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	18	7	40.2 (19.2–65.5)	3	16.1 (4.8–42.3)	4	24.6 (8.8–52.3)	4	19.2 (6.6–44.3)	0.3101
3-5	47	16	34.5 (21.7–50.0)	18	36.4 (23.4–51.6)	5	12.1 (4.3–29.3)	8	17.0 (8.3–31.7)	
6-10	64	24	38.2 (26.6–51.3)	26	39.3 (27.6–52.3)	8	12.8 (6.2–24.5)	6	9.8 (4.1–21.5)	
≥11	371	95	25.7 (21.3–30.7)	149	41.2 (36.0–46.6)	76	19.5 (15.7–24.0)	51	13.5 (10.3–17.6)	
Партнерський статус										
живе сам	289	80	28.7 (23.5–34.6)	117	40.4 (34.6–46.5)	49	16.5 (12.5–21.5)	43	14.4 (10.7–19.1)	0.7207

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе з партнером	211	62	28.6 (22.7–35.3)	79	38.5 (31.8–45.7)	44	20.4 (15.3–26.6)	26	12.5 (8.5–18.0)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	74	28	36.6 (25.9–48.7)	31	42.7 (31.2–55.0)	8	11.4 (5.6–21.7)	7	9.4 (4.3–19.1)	0.0148
неповний робочий день або тимчасово	328	92	28.8 (23.9–34.3)	133	40.5 (35.1–46.2)	67	19.8 (15.6–24.7)	36	10.9 (7.8–14.9)	
безробітний	54	14	23.6 (13.9–37.3)	14	26.1 (15.2–40.9)	10	19.9 (10.8–33.8)	16	30.4 (18.9–45.1)	
інвалідність	37	8	23.7 (11.5–42.7)	16	44.8 (28.6–62.2)	7	16.8 (7.7–32.8)	6	14.7 (6.2–31.0)	
інші	6	0	0.0	2	43.7 (7.4–88.3)	1	13.2 (0.9–72.3)	3	43.0 (8.0–86.8)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	77	17	23.2 (14.6–34.8)	28	37.5 (26.7–49.7)	18	21.0 (13.2–31.8)	14	18.3 (10.7–29.6)	0.7013
3-10 тис	211	59	28.9 (22.8–35.8)	82	39.4 (32.6–46.5)	43	19.7 (14.7–25.8)	27	12.1 (8.3–17.4)	
10-20 тис	165	50	29.8 (23.1–37.5)	69	41.8 (34.2–49.8)	27	16.8 (11.5–24.1)	19	11.6 (7.3–17.8)	
≥20 тис	26	10	39.7 (21.6–61.1)	10	36.5 (19.4–57.8)	2	7.5 (1.6–28.0)	4	16.3 (5.7–38.7)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	306	96	31.9 (26.6–37.7)	118	37.9 (32.4–43.7)	51	16.6 (12.6–21.5)	41	13.6 (10.0–18.2)	0.2120
так	190	44	23.1 (17.4–29.9)	77	42.5 (35.2–50.1)	41	20.7 (15.3–27.3)	28	13.8 (9.5–19.6)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	173	35.0 (30.7–39.5)	217	43.3 (38.8–47.9)	87	17.4 (14.2–21.2)	23	4.3 (2.8–6.5)	1.0000
Стать										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
чоловік	408	142	35.1 (30.4–40.2)	177	43.3 (38.4–48.4)	70	17.0 (13.6–21.2)	19	4.5 (2.8–7.1)	0.9213
жінка	92	31	34.2 (24.7–45.2)	40	43.4 (33.1–54.2)	17	19.2 (11.9–29.3)	4	3.3 (1.2–8.6)	
Вікова категорія 4										
<25	9	6	70.5 (31.2–92.6)	1	12.0 (1.2–61.3)	2	17.5 (3.2–58.0)	0	0.0	0.0785
25-34	117	50	44.6 (35.4–54.3)	49	41.1 (32.2–50.7)	14	11.7 (6.9–19.3)	4	2.5 (0.9–6.7)	
35-44	248	79	32.2 (26.3–38.7)	113	44.6 (38.2–51.2)	42	17.8 (13.3–23.4)	14	5.4 (3.2–9.2)	
45+	126	38	29.7 (22.1–38.7)	54	44.7 (35.8–53.9)	29	21.9 (15.4–30.2)	5	3.7 (1.4–9.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	18	7	40.2 (19.2–65.5)	7	38.3 (18.0–63.6)	3	17.5 (5.2–45.1)	1	4.1 (0.5–27.3)	0.4982
3-5	47	19	38.3 (25.0–53.6)	19	42.5 (28.3–58.1)	6	11.8 (5.1–24.8)	3	7.4 (2.2–21.9)	
6-10	64	24	37.0 (25.6–50.1)	33	52.3 (39.4–64.8)	5	8.4 (3.3–19.5)	2	2.3 (0.5–9.7)	
≥11	371	123	33.9 (29.0–39.3)	158	42.1 (36.9–47.5)	73	19.7 (15.8–24.3)	17	4.2 (2.6–6.9)	
Партнерський статус										
живе сам	289	97	33.8 (28.3–39.8)	133	46.7 (40.7–52.8)	46	15.6 (11.7–20.4)	13	3.9 (2.2–6.9)	0.3473
живе з партнером	211	76	36.5 (30.0–43.6)	84	38.8 (32.2–45.8)	41	19.9 (14.9–26.2)	10	4.8 (2.5–8.8)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	74	32	41.1 (29.9–53.2)	33	47.0 (35.2–59.1)	7	9.5 (4.5–19.1)	2	2.4 (0.6–9.4)	0.0787
неповний робочий день або тимчасово	328	111	34.2 (29.0–39.9)	143	43.3 (37.8–49.0)	63	19.1 (15.0–23.9)	11	3.4 (1.8–6.2)	

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	54	20	38.6 (25.6–53.5)	18	30.7 (19.6–44.7)	9	19.8 (10.3–34.7)	7	10.8 (5.0–21.8)	
інвалідність	37	10	30.2 (16.3–49.0)	19	48.5 (31.8–65.6)	7	17.2 (7.9–33.4)	1	4.1 (0.5–25.1)	
інші	6	0	0.0	3	61.2 (15.7–93.0)	1	13.2 (0.9–72.3)	2	25.5 (3.4–77.0)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	77	22	30.5 (20.4–42.8)	32	40.3 (29.4–52.2)	20	26.7 (17.4–38.6)	3	2.6 (0.8–8.0)	0.3516
3-10 тис	211	70	34.5 (27.9–41.6)	97	45.5 (38.5–52.6)	31	14.3 (10.1–19.8)	13	5.8 (3.3–10.0)	
10-20 тис	165	64	38.1 (30.7–46.0)	67	40.9 (33.3–48.9)	30	18.5 (13.1–25.6)	4	2.5 (0.9–7.0)	
≥20 тис	26	10	38.1 (20.5–59.6)	13	48.7 (28.9–68.8)	2	9.4 (2.1–33.8)	1	3.8 (0.5–24.5)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	306	104	34.7 (29.3–40.6)	137	44.3 (38.6–50.2)	57	18.5 (14.4–23.4)	8	2.5 (1.2–5.1)	0.1030
так	190	67	35.1 (28.3–42.6)	78	41.5 (34.4–49.1)	30	16.1 (11.3–22.4)	15	7.3 (4.3–12.0)	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	220	78	35.5 (29.2–42.5)	91	40.7 (34.1–47.6)	40	18.3 (13.5–24.2)	11	5.5 (3.0–9.9)	0.5154
так	272	91	34.0 (28.3–40.3)	124	45.9 (39.7–52.1)	46	16.9 (12.7–22.1)	11	3.2 (1.8–5.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	411	142	35.1 (30.4–40.1)	176	42.7 (37.7–47.7)	76	18.2 (14.7–22.4)	17	4.0 (2.5–6.6)	0.6055
так	66	24	37.3 (25.7–50.6)	29	44.4 (32.2–57.3)	8	12.1 (5.9–23.4)	5	6.2 (2.5–14.5)	
Результат тесту на ВІЛ										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	117	36	29.3 (21.6–38.4)	46	40.7 (31.8–50.3)	27	24.2 (16.9–33.5)	8	5.8 (2.9–11.4)	0.1108
негативний	383	137	36.6 (31.6–41.8)	171	44.1 (38.9–49.3)	60	15.5 (12.1–19.6)	15	3.9 (2.3–6.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	406	150	37.4 (32.6–42.6)	176	43.0 (38.0–48.1)	62	15.4 (12.0–19.4)	18	4.3 (2.6–6.8)	
стимулятори	40	13	30.8 (18.0–47.4)	18	46.7 (31.1–62.9)	8	20.7 (10.4–37.0)	1	1.9 (0.2–12.9)	
опі+стимул	54	10	18.8 (10.2–32.2)	23	43.8 (30.5–58.0)	17	31.1 (19.6–45.4)	4	6.3 (2.2–16.5)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання										
опіоїди	442	159	36.4 (31.8–41.2)	190	42.7 (37.9–47.6)	72	16.5 (13.2–20.5)	21	4.4 (2.8–6.9)	0.2082
стимулятори	55	14	25.3 (15.1–39.2)	26	49.3 (35.7–63.0)	13	22.1 (12.8–35.3)	2	3.3 (0.8–12.9)	
інші	3	0	0.0	1	35.7 (0.3–99.1)	2	64.3 (0.9–99.7)	0	0.0	

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	40	8.0	(5.8–10.8)
збут наркотиків	14	2.8	(1.6–4.8)
зберігання наркотиків	35	7.2	(5.1–10.0)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	37	7.3	(5.2–10.1)
збут наркотиків	14	2.7	(1.6–4.7)
зберігання наркотиків	28	6.0	(4.0–8.7)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	286	59.0	(54.4–63.5)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	190	37.9	(33.5–42.5)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	19	9.4	(6.0–14.4)
6м-2р	43	22.8	(17.1–29.7)
2-4р	72	38.7	(31.7–46.3)
4 роки +	56	29.1	(22.9–36.2)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	24	13.1	(8.8–19.1)
1-3р	19	9.9	(6.3–15.3)
3-5р	30	17.1	(12.0–23.9)
5-10р	34	17.8	(12.7–24.3)
10 років +	82	42.1	(34.9–49.5)

	n	%	ДІ
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	111	58.8	(51.2–65.9)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	311	62.0	(57.4–66.4)
так, за останні 6м	42	9.0	(6.6–12.1)
так, але 6+ місяців тому	143	29.1	(25.0–33.5)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	246	48.6	(44.0–53.2)
так, за останні 6м	84	17.5	(14.2–21.3)
так, але 6+ місяців тому	169	33.9	(29.7–38.4)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	382	77.6	(73.6–81.1)
так, за останні 6м	44	8.6	(6.4–11.5)
так, але 6+ місяців тому	74	13.8	(11.0–17.2)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	400	80.2	(76.2–83.6)
так	96	19.8	(16.4–23.8)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	300	61.1	(56.5–65.4)
так	197	38.9	(34.6–43.5)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
ні	115	58.3	(50.9–65.3)
так	81	41.7	(34.7–49.1)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців			
ні	369	75.0	(70.8–78.7)

		n	%	ДІ
	так	129	25.0	(21.3–29.2)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

		Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	496	96	19.8 (16.4–23.8)	1.0000	196	81	41.7 (34.7–49.1)	1.0000
Стать									
	чоловік	405	76	19.7 (15.9–24.2)	0.9145	168	69	41.6 (34.0–49.6)	0.9230
	жінка	91	20	20.2 (13.1–30.0)		28	12	42.6 (25.2–62.0)	
Вікова категорія 4									
	<25	9	2	23.6 (4.4–67.6)	0.0001	1	0	0.0	0.7025
	25-34	115	37	34.1 (25.5–43.9)		53	23	41.6 (29.0–55.5)	
	35-44	246	43	18.5 (13.8–24.3)		92	39	44.4 (34.0–55.3)	
	45+	126	14	9.5 (5.6–15.8)		50	19	36.6 (24.2–51.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків									

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
≤2	17	7	41.0 (19.4–66.7)	0.0208	8	5	64.6 (27.4–89.8)	0.2723
3-5	46	15	31.8 (19.6–47.3)		20	9	47.8 (25.8–70.7)	
6-10	63	11	16.4 (9.1–27.8)		28	8	28.0 (14.1–47.8)	
≥11	370	63	18.0 (14.1–22.6)		140	59	42.1 (33.8–50.9)	
Партнерський статус								
живе сам	287	58	19.9 (15.5–25.1)	0.9726	123	52	43.4 (34.4–52.8)	0.5547
живе з партнером	209	38	19.8 (14.4–26.4)		73	29	38.9 (28.1–50.9)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	73	11	17.1 (9.2–29.5)	0.8193	31	9	25.3 (13.1–43.1)	
неповний робочий день або тимчасово	326	68	21.4 (17.1–26.5)		139	61	44.0 (35.6–52.8)	
безробітний	54	9	15.6 (8.0–28.3)		17	9	65.8 (40.9–84.3)	
інвалідність	37	7	18.2 (8.5–35.0)		9	2	19.5 (4.4–56.0)	
інші	6	1	15.1 (1.0–75.3)		0	0	0.0	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	76	16	19.4 (11.9–30.2)	0.8624	25	11	43.2 (24.0–64.7)	0.9467
3-10 тис	209	35	17.8 (12.8–24.2)		75	29	38.9 (28.2–50.8)	
10-20 тис	164	33	20.5 (14.8–27.8)		80	33	41.5 (30.7–53.2)	
≥20 тис	26	6	23.8 (10.3–46.0)		9	3	32.8 (9.9–68.6)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	302	60	19.0 (14.9–23.9)	0.5646	123	50	41.5 (32.7–50.9)	0.8362

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
так	190	35	21.3 (15.4–28.6)		71	31	43.1 (31.6–55.3)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	217	52	24.2 (18.7–30.7)	0.0361	86	34	40.7 (30.4–52.0)	0.9788
так	271	43	16.2 (12.0–21.4)		107	44	40.9 (31.6–51.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	407	74	18.6 (14.9–23.0)	0.8447	152	64	42.4 (34.4–50.7)	0.6148
так	66	12	19.7 (11.2–32.1)		25	8	36.2 (17.9–59.8)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	117	22	18.2 (12.0–26.6)	0.6260	50	19	37.3 (24.7–52.0)	0.4853
негативний	379	74	20.3 (16.3–25.0)		146	62	43.2 (35.0–51.8)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	406	76	19.2 (15.5–23.7)		165	62	38.6 (31.0–46.7)	
стимулятори	39	6	15.9 (7.0–32.2)		17	11	66.2 (40.6–84.9)	
опі+стимул	51	14	27.7 (16.8–42.2)		14	8	49.9 (24.9–75.0)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання								
опіоїди	439	82	19.2 (15.5–23.4)	0.5279	174	67	39.2 (31.9–47.1)	0.1448
стимулятори	54	13	24.6 (14.5–38.6)		20	13	63.5 (39.5–82.2)	
інші	3	1	35.7 (0.3–99.1)		2	1	44.5 (0.2–99.7)	

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	42	8.5	(6.3–11.5)
так, з інших причин	23	4.6	(3.0–6.9)
ні	433	86.9	(83.4–89.7)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	2	3.8	(0.9–14.0)
інша країна	1	1.6	(0.2–10.8)
інша область	30	66.5	(50.5–79.4)
інше місто	6	14.1	(6.3–28.9)
інший район	5	14.0	(5.9–29.8)
інший будинок	0	0.0	
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			
та сама область	27	43.2	(31.2–56.0)
інша область	38	56.8	(44.0–68.8)
інша країна	0	0.0	



Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)




Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)

Результати для міста: Рівне




Рис. А. Мережа рекрутингу RDS у місті Рівне

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	502	39.1	(38.2–40.0)	39	(34–43)
Вік першого неін'єкційного вживання наркотиків	464	18.5	(17.8–19.3)	16	(15–19)
Років з початку неін'єкційного вживання наркотиків	464	20.1	(19.1–21.1)	21	(14–26)
Вік першого ін'єкційного вживання наркотиків	502	24.3	(23.4–25.3)	21	(17–29)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків	502	14.8	(13.8–15.8)	15	(5–23)
Особистий місячний дохід, грн	426	11,029.9	(8442.4–13617.4)	8,000	(4000–12000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

	Сайт	n	%	ДІ
Стать				
чоловік	Рівне	409	80.9	(76.6–84.6)
жінка	Рівне	93	19.1	(15.4–23.4)
Вікова категорія 4				
<25	Рівне	20	5.1	(3.2–7.9)
25-34	Рівне	114	24.3	(20.2–28.9)
35-44	Рівне	248	48.5	(43.3–53.7)
45+	Рівне	120	22.1	(18.3–26.5)
Сімейний стан				
одружений або проживають разом	Рівне	81	15.8	(12.2–20.1)
одружений, але має іншого партнера	Рівне	30	5.6	(3.8–8.2)
не одружений, але є партнер	Рівне	52	10.7	(8.0–14.1)
одружений, але не живуть разом	Рівне	23	5.8	(3.5–9.3)
не одружений та не мають партнера	Рівне	316	62.2	(57.0–67.1)
Партнерський статус				
живе сам	Рівне	339	67.9	(62.9–72.5)
живе з партнером	Рівне	163	32.1	(27.5–37.1)
Освіта 3 категорії				
незак. середня школа	Рівне	73	14.5	(11.2–18.4)
середня школа	Рівне	184	36.9	(32.0–42.0)
> середня школа	Рівне	244	48.7	(43.5–53.9)
Поточна професія				
учень школи	Рівне	0	0.0	
студент коледжу/університету	Рівне	0	0.0	
постійна робота	Рівне	115	23.8	(19.7–28.6)
непостійна робота	Рівне	213	42.9	(37.8–48.1)
безробітний	Рівне	124	25.1	(20.9–29.7)
домогосподарка	Рівне	10	1.4	(0.7–2.9)
інвалідність	Рівне	26	3.4	(2.1–5.5)
військовий	Рівне	9	2.5	(1.0–5.9)
інші	Рівне	5	0.9	(0.3–2.3)
Безхатченко				
ніколи	Рівне	409	81.0	(76.5–84.8)

	Сайт	n	%	ДІ
так, 12м+ тому	Рівне	84	16.8	(13.2–21.1)
так, за останні 12м	Рівне	8	2.2	(1.0–4.7)
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Рівне	84	88.3	(76.9–94.5)
так	Рівне	8	11.7	(5.5–23.1)
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Рівне	78	16.5	(12.7–21.0)
3-10 тис	Рівне	165	38.3	(32.9–44.0)
10-20 тис	Рівне	144	35.6	(30.4–41.2)
≥20 тис	Рівне	39	9.6	(6.6–13.8)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Рівне	75	15.9	(12.2–20.4)
≥2684	Рівне	351	84.1	(79.6–87.8)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Рівне	57	14.3	(11.1–18.4)
3-5	Рівне	46	11.1	(8.2–14.8)
6-10	Рівне	58	13.5	(10.1–17.7)
≥11	Рівне	341	61.1	(55.9–66.1)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Сайт	n	%	ДІ
власне житло	Рівне	283	55.4	(50.2–60.5)
у друзів або родичів	Рівне	100	19.1	(15.5–23.3)
оренда	Рівне	86	18.4	(14.7–22.9)
різне	Рівне	15	4.3	(2.5–7.2)
на вулиці (безхатько)	Рівне	8	2.2	(1.0–4.7)
у притулку для біженців	Рівне	39	7.3	(5.1–10.2)




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)



Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії									
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	502	354	63.8 (58.6–68.7)	82	19.8 (16.0–24.2)	54	13.5 (10.1–17.8)	12	2.9 (1.6–5.3)	1.0000
Стать											
	чоловік	409	291	64.8 (59.0–70.2)	65	18.9 (14.9–23.7)	44	13.7 (9.9–18.6)	9	2.6 (1.3–5.3)	0.7062

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
жінка	93	63	59.3 (47.3–70.3)	17	23.7 (14.8–35.5)	10	12.8 (6.7–23.1)	3	4.2 (1.3–12.7)	
Вікова категорія 4										
<25	20	11	54.0 (30.2–76.1)	6	30.2 (12.6–56.6)	2	11.6 (2.6–39.0)	1	4.1 (0.5–27.0)	0.0021
25-34	114	62	49.3 (39.2–59.5)	27	27.2 (19.0–37.4)	20	17.8 (11.4–26.8)	5	5.6 (2.1–14.1)	
35-44	248	184	66.4 (58.5–73.4)	35	17.4 (12.4–23.8)	28	15.8 (10.5–23.2)	1	0.4 (0.1–3.0)	
45+	120	97	76.2 (66.3–83.9)	14	14.5 (8.6–23.5)	4	4.1 (1.4–11.0)	5	5.2 (2.1–12.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	57	32	52.8 (38.9–66.3)	17	32.3 (20.6–46.8)	3	6.4 (2.0–18.6)	5	8.5 (3.4–19.5)	0.0149
3-5	46	28	59.6 (43.7–73.8)	8	16.8 (8.3–31.2)	8	17.6 (8.7–32.3)	2	6.0 (1.3–24.1)	
6-10	58	35	61.9 (46.9–75.0)	12	21.0 (11.6–35.2)	8	12.1 (5.7–23.7)	3	5.0 (1.4–16.5)	
≥11	341	259	67.5 (60.9–73.5)	45	17.1 (12.8–22.5)	35	14.7 (10.2–20.8)	2	0.6 (0.2–2.5)	
Партнерський статус										
живе сам	339	249	66.6 (60.2–72.5)	50	17.3 (13.1–22.5)	34	14.0 (9.7–19.7)	6	2.2 (0.9–5.0)	0.1628
живе з партнером	163	105	57.8 (48.7–66.4)	32	25.1 (18.1–33.9)	20	12.5 (7.9–19.3)	6	4.6 (1.9–10.6)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	115	81	64.1 (53.2–73.7)	18	17.9 (11.2–27.3)	10	10.9 (5.7–19.9)	6	7.1 (3.1–15.7)	0.0333
неповний робочий день або тимчасово	213	159	67.7 (59.4–74.9)	35	20.4 (14.7–27.5)	17	10.7 (6.0–18.3)	2	1.3 (0.3–5.1)	
безробітний	124	79	56.0 (45.7–65.7)	22	21.4 (14.2–31.0)	22	22.3 (14.9–32.2)	1	0.3 (0.0–2.0)	

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
інвалідність	26	20	68.7 (41.2–87.3)	3	16.5 (4.2–47.1)	2	9.6 (1.8–38.3)	1	5.2 (0.7–31.6)	
інші	24	15	64.9 (38.8–84.3)	4	17.9 (6.0–43.0)	3	8.0 (1.9–27.7)	2	9.2 (2.0–33.6)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	78	56	66.3 (52.0–78.1)	11	15.8 (8.0–28.6)	8	14.1 (6.5–27.9)	3	3.9 (1.1–12.8)	0.7469
3-10 тис	165	123	64.0 (54.2–72.8)	26	20.5 (14.0–29.0)	14	13.4 (7.4–22.9)	2	2.1 (0.5–9.1)	
10-20 тис	144	97	63.2 (53.9–71.6)	32	24.8 (17.8–33.4)	13	10.6 (6.0–18.3)	2	1.4 (0.3–5.4)	
≥20 тис	39	26	61.9 (42.4–78.3)	5	15.6 (6.2–33.9)	8	22.5 (10.7–41.2)	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	323	221	62.4 (56.0–68.4)	63	22.3 (17.6–28.0)	30	11.9 (8.0–17.3)	9	3.4 (1.7–6.8)	0.1981
так	179	133	66.7 (57.6–74.7)	19	14.5 (9.2–22.1)	24	16.8 (11.0–24.9)	3	2.0 (0.6–6.2)	

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	303	180	57.4 (51.0–63.5)	71	23.7 (18.9–29.3)	41	15.0 (10.9–20.4)	11	3.9 (2.1–7.2)	0.0001
так	192	169	81.9 (73.3–88.2)	11	9.6 (5.2–16.9)	11	8.2 (4.1–15.8)	1	0.3 (0.0–1.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	341	207	60.7 (55.0–66.2)	76	21.3 (17.1–26.2)	48	15.0 (11.2–19.8)	10	2.9 (1.5–5.6)	0.0000
так	155	144	91.8 (83.8–96.0)	3	2.0 (0.6–6.2)	6	3.0 (1.3–6.8)	2	3.2 (0.6–14.3)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	83	70	73.5 (57.5–85.1)	5	9.0 (3.5–21.2)	7	15.1 (6.5–31.4)	1	2.4 (0.3–15.4)	0.3207

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
негативний	419	284	62.6 (57.0–67.8)	77	21.1 (17.0–25.9)	47	13.3 (9.8–17.9)	11	3.0 (1.6–5.6)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	393	344	83.9 (78.4–88.1)	5	1.1 (0.4–2.9)	41	13.6 (9.7–18.8)	3	1.4 (0.4–4.5)	0.0000
стимулятори	92	5	4.9 (1.9–11.7)	75	80.9 (70.8–88.1)	12	14.2 (8.0–24.0)	0	0.0	
інші	6	3	65.2 (17.1–94.4)	2	30.3 (4.2–81.3)	0	0.0	1	4.5 (0.3–44.6)	

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
	n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
Частота ін'єкцій: останні 24 години									
0 разів	100	37.3	53	64.5	12	20.0	7	63.0	0.0001
1 раз	176	45.2	23	28.3	25	49.0	4	25.6	
2-3 рази	71	14.7	2	1.8	13	24.0	1	11.4	
4+ рази	7	2.9	4	5.3	4	7.0	0	0.0	
N	354		82		54		12		
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)									
1 раз	176	72.0	23	79.9	25	61.3	4	69.3	0.1832
2-3 рази	71	23.4	2	5.2	13	30.0	1	30.7	
4+ рази	7	4.6	4	15.0	4	8.7	0	0.0	
N	254		29		42		5		
Частота ін'єкцій: останній тиждень									
0 разів	18	7.9	10	14.2	1	1.9	2	19.0	0.0001
1-6 разів	113	40.5	56	66.3	23	39.1	5	48.2	
кожен день	222	51.6	16	19.5	30	59.0	4	32.7	
N	353		82		54		11		
Частота ін'єкцій: останні 30 днів									
1-9 разів	84	29.3	29	33.8	11	18.5	5	39.2	0.0001
10-19 разів	53	19.1	32	40.5	10	15.0	3	30.9	
20-29 разів	44	11.2	8	10.5	13	26.5	0	0.0	
кожен день	173	40.4	13	15.2	20	40.1	4	29.9	
N	354		82		54		12		
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів									
0-9 разів	50	21.9	28	35.0	6	9.9	5	39.2	0.0000
10-19 разів	54	20.3	28	37.1	9	14.7	3	30.9	
20-29 разів	33	9.2	6	8.1	10	23.0	0	0.0	
кожен день	208	48.6	16	19.8	27	52.3	4	29.9	
N	345		78		52		12		

Таблиця 2.4. Ін'єкційний вид наркотику на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	64	17.4	10	11.5	2	26.3
3-10 тис	131	38.9	31	37.7	1	21.7
10-20 тис	104	33.1	36	42.8	3	52.0
≥20 тис	32	10.6	7	8.0	0	0.0
N	331		84		6	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
Разом		опіоїди		стимулятори		інші		
n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
готую сам								
112	23.3	91	24.5	19	20.3	1	21.7	0.7487
приготовлене друзями								
70	17.6	46	15.3	20	23.0	3	57.1	0.0166
від дилера								
241	55.9	179	55.7	52	55.6	2	38.4	0.7297
куплене в Інтернеті								
31	8.6	15	5.3	16	20.8	0	0.0	0.0005
з аптеки								
31	3.0	31	4.1	0	0.0	0	0.0	0.1117
з програми ЗПТ								
77	6.1	76	8.3	0	0.0	1	4.5	0.0005
інше								
3	0.8	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0.6100
N								
565		441		107		7		




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін'єкції використовував чистий шприц			
так	461	93.1	(90.1–95.2)
Джерело шприца для останньої ін'єкції			
купив в аптеці	255	62.2	(57.2–67.0)
отримав в аптеці	4	0.8	(0.3–2.2)
отримав від НУО	224	32.5	(28.0–37.3)
отримав від друга	6	1.5	(0.7–3.4)
отримав вживаний від друга	8	2.5	(1.2–5.3)
використовував вживаний свій	1	0.0	(0.0–0.3)
отримав заповнений	2	0.4	(0.1–1.8)
інші	0	0.0	
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	22	4.1	(2.5–6.6)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	17	4.8	(2.9–8.0)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	30	6.4	(4.3–9.4)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	21	4.1	(2.5–6.5)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	78	16.0	(12.6–20.1)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	10	2.5	(1.3–5.0)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	60	12.7	(9.6–16.5)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	0	0.0	
часто	5	21.4	(8.3–44.9)
половина	3	23.2	(7.2–54.1)
іноді	5	22.5	(8.2–48.7)
рідко	1	1.5	(0.2–10.2)
ніколи	7	31.5	(13.7–57.0)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	53	11.5	(8.7–15.1)
часто	55	11.5	(8.6–15.2)
половина	59	11.8	(8.9–15.5)
іноді	58	11.5	(8.7–15.0)
рідко	57	10.8	(8.1–14.3)
ніколи	211	42.9	(37.7–48.3)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			

	n	%	ДІ
1-9	51	68.3	(55.0–79.1)
10-29	18	27.7	(17.6–40.6)
30+	2	4.1	(1.0–15.0)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	8	13.3	(6.0–26.9)
2-3	35	58.5	(44.4–71.4)
4-9	6	7.9	(3.1–18.8)
10+	12	20.3	(11.5–33.3)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	13	65.8	(37.4–86.1)
від друзів	4	34.2	(13.9–62.6)
із закладки	0	0.0	
Хтось використав один шприц для ін'єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	486	96.7	(94.0–98.2)
так	14	3.3	(1.8–6.0)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін'єкцій (%)




Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	501	22	4.1 (2.5–6.6)	1.0000	499	17	4.8 (2.9–8.0)	1.0000
Стать									
	чоловік	408	15	3.1 (1.7–5.5)	0.0330	406	11	3.5 (1.8–6.7)	0.0379
	жінка	93	7	8.6 (3.8–18.4)		93	6	10.2 (4.4–21.9)	
Вікова категорія 4									

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<25	20	2	13.1 (2.6–45.6)	0.2003	20	1	9.6 (1.2–47.9)	0.2983
25-34	114	5	3.8 (1.5–9.7)		114	6	7.7 (3.3–17.0)	
35-44	247	12	4.2 (2.2–8.0)		247	8	4.3 (2.0–8.9)	
45+	120	3	2.3 (0.7–7.5)		118	2	1.6 (0.4–6.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	57	2	3.0 (0.7–11.9)	0.6056	56	3	5.1 (1.5–15.6)	0.3545
3-5	46	2	4.2 (1.0–15.9)		46	4	10.9 (3.8–27.3)	
6-10	58	4	7.5 (2.4–21.3)		57	2	5.0 (1.1–20.7)	
≥11	340	14	3.6 (2.0–6.7)		340	8	3.6 (1.7–7.7)	
Партнерський статус								
живе сам	338	16	4.0 (2.2–6.9)	0.8181	337	9	3.3 (1.6–6.7)	0.0827
живе з партнером	163	6	4.5 (1.8–10.5)		162	8	8.0 (3.8–15.9)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	115	3	2.8 (0.9–8.6)	0.6118	114	4	6.0 (2.1–15.8)	0.2232
неповний робочий день або тимчасово	212	13	5.5 (2.9–10.4)		212	4	2.7 (0.9–7.5)	
безробітний	124	6	4.3 (1.7–10.5)		123	9	9.0 (4.4–17.4)	
інвалідність	26	0	0.0		26	0	0.0	
інші	24	0	0.0		24	0	0.0	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	78	3	6.6 (1.9–20.2)	0.4407	78	2	5.9 (1.4–21.1)	0.3608
3-10 тис	165	8	3.1 (1.3–7.0)		163	5	5.4 (2.2–12.9)	
10-20 тис	143	5	3.3 (1.3–8.6)		144	3	1.5 (0.4–5.3)	
≥20 тис	39	0	0.0		38	1	2.2 (0.3–15.3)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	323	12	3.3 (1.7–6.4)	0.2296	321	10	4.9 (2.5–9.3)	0.8909
так	178	10	5.9 (3.0–11.3)		178	7	4.6 (2.1–9.9)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	302	12	3.9 (2.1–7.2)	0.6436	301	12	5.3 (2.9–9.5)	0.4644
так	192	10	4.9 (2.4–9.8)		191	4	3.5 (1.3–9.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	340	15	4.2 (2.5–7.1)	0.9816	339	16	5.4 (3.2–9.0)	0.0020
так	155	7	4.1 (1.9–8.7)		154	1	0.5 (0.1–3.2)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	83	5	7.1 (2.4–19.3)	0.2893	82	2	5.3 (1.3–19.3)	0.8898
негативний	418	17	3.8 (2.2–6.4)		417	15	4.8 (2.7–8.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	354	14	3.3 (1.7–6.0)	0.4898	351	5	2.0 (0.8–5.1)	0.0245
стимулятори	81	5	6.8 (2.6–16.6)		82	5	8.6 (3.4–19.9)	
опі+стимул	54	3	5.3 (1.6–16.3)		54	6	10.0 (4.1–22.4)	
інші	12	0	0.0		12	1	16.7 (1.9–66.8)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	393	17	3.7 (2.2–6.3)	0.8216	390	9	3.1 (1.5–6.4)	0.0641
стимулятори	91	4	4.7 (1.6–13.3)		92	7	9.6 (4.4–19.7)	
інші	6	0	0.0		6	0	0.0	

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Всього									
	Разом	499	30	6.4 (4.3–9.4)	1.0000	500	21	4.1 (2.5–6.5)	1.0000
Стать									
	чоловік	407	26	6.6 (4.3–9.9)	0.7622	407	16	3.7 (2.1–6.5)	0.4525

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
жінка	92	4	5.5 (1.8–15.7)		93	5	5.5 (2.3–12.9)	
Вікова категорія 4								
<25	20	2	10.6 (1.6–46.2)	0.7674	20	2	5.1 (0.9–24.8)	0.4200
25-34	114	5	5.0 (2.0–11.9)		113	2	1.6 (0.4–6.3)	
35-44	246	17	7.1 (4.2–11.9)		248	11	4.4 (2.2–8.6)	
45+	119	6	5.3 (2.3–11.7)		119	6	5.9 (2.6–13.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	57	2	3.2 (0.8–12.5)	0.5479	57	3	5.2 (1.6–15.8)	0.9222
3-5	46	5	8.5 (3.2–20.6)		46	3	4.6 (1.2–15.7)	
6-10	58	4	9.5 (3.4–24.1)		58	3	4.8 (1.5–14.4)	
≥11	338	19	6.0 (3.6–9.9)		339	12	3.6 (1.8–6.9)	
Партнерський статус								
живе сам	338	22	6.4 (4.0–10.1)	0.9910	337	14	3.8 (2.0–7.0)	0.6854
живе з партнером	161	8	6.3 (3.0–12.8)		163	7	4.6 (2.2–9.6)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	115	1	0.7 (0.1–5.2)	0.0084	115	3	2.6 (0.7–8.9)	0.3711
неповний робочий день або тимчасово	212	13	6.8 (3.8–12.2)		211	8	3.3 (1.6–7.0)	
безробітний	123	15	12.3 (7.0–20.7)		124	9	7.3 (3.4–14.9)	
інвалідність	25	0	0.0		26	0	0.0	
інші	24	1	3.7 (0.4–24.7)		24	1	4.3 (0.5–28.0)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	77	2	5.9 (1.4–21.3)	0.7213	76	0	0.0	0.1988
3-10 тис	163	10	6.7 (3.6–12.4)		165	4	3.0 (1.1–7.8)	
10-20 тис	144	7	3.7 (1.5–8.7)		144	10	5.7 (2.8–11.2)	
≥20 тис	39	2	4.0 (0.9–15.8)		39	2	3.0 (0.6–13.5)	
Був позбавлений волі будь-коли								

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
ні	322	18	5.8 (3.4–9.7)	0.5294	322	14	4.3 (2.4–7.6)	0.7749
так	177	12	7.5 (4.1–13.4)		178	7	3.7 (1.6–8.1)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	302	18	6.1 (3.7–9.9)	0.6242	302	13	3.9 (2.2–7.1)	0.7501
так	190	12	7.4 (3.9–13.5)		191	8	4.6 (2.1–9.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	341	24	6.8 (4.5–10.2)	0.1292	340	16	4.3 (2.6–7.1)	0.3845
так	152	6	3.4 (1.5–7.7)		154	5	2.8 (1.1–6.6)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	81	6	5.7 (1.8–16.5)	0.8308	82	4	3.0 (0.9–9.6)	0.6174
негативний	418	24	6.5 (4.2–9.7)		418	17	4.2 (2.5–6.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	351	15	4.0 (2.2–6.9)	0.0378	352	13	3.5 (1.9–6.4)	0.7348
стимулятори	82	5	8.7 (3.5–20.2)		82	2	3.8 (0.9–14.8)	
опі+стимул	54	9	14.3 (7.0–26.7)		54	5	6.5 (2.4–16.0)	
інші	12	1	6.0 (0.6–39.4)		12	1	7.1 (0.7–43.7)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	390	20	4.8 (3.0–7.8)	0.1788	391	18	4.3 (2.6–7.1)	0.8849
стимулятори	92	8	10.2 (4.9–20.1)		92	3	4.0 (1.2–13.0)	
інші	6	0	0.0		6	0	0.0	

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	485	95.7	(92.1–97.6)	92	98.7	(90.9–99.8)	393	95.0	(90.7–97.3)	0.1668
N	502			93			409			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	377	80.3	(75.7–84.2)	80	86.0	(74.8–92.7)	297	78.9	(73.6–83.3)	0.2044
N	481			92			389			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	250	55.0	(49.6–60.2)	61	69.9	(58.0–79.7)	189	51.3	(45.4–57.3)	0.0057
N	473			89			384			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	200	76.8	(70.5–82.1)	55	84.2	(70.3–92.3)	145	74.3	(66.9–80.5)	0.1698
N	258			64			194			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	74	29.3	(23.5–35.9)	13	22.8	(12.6–37.5)	61	31.5	(24.8–39.1)	0.2598
N	258			64			194			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	6	2.6	(1.1–5.8)	0	0.0		6	3.4	(1.5–7.6)	0.1596
N	258			64			194			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										
так	203	41.6	(36.4–46.9)	19	21.7	(13.5–33.1)	184	46.4	(40.5–52.4)	0.0002
N	465			88			377			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	160	41.7	(36.0–47.7)	18	23.6	(14.5–36.0)	142	46.6	(40.0–53.4)	0.0014
N	369			78			291			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	98	37.0	(30.6–43.9)	14	20.2	(11.2–33.7)	84	42.7	(35.0–50.7)	0.0044
N	249			61			188			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так				0	0.0		0	0.0		
N				64			194			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	18	3.4	(2.0–5.8)	10	11.7	(5.8–22.2)	8	1.4	(0.6–2.9)	0.0000
N	484			92			392			
Надавав секс-послуги за гроші										
так	21	3.7	(2.3–6.1)	11	12.3	(6.3–22.5)	10	1.6	(0.8–3.3)	0.0000
N	484			92			392			
Платив за секс коли-небудь										
так	75	14.9	(11.4–19.2)	1	0.3	(0.0–1.9)	74	18.5	(14.3–23.6)	0.0000
N	483			92			391			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	23	32.2	(21.1–45.7)	0	0.0		23	32.3	(21.2–45.9)	0.5098
N	75			1			74			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	331	68.2	(63.0–72.9)	72	78.2	(66.0–86.9)	259	65.8	(60.0–71.2)	
випадковий	139	30.4	(25.7–35.6)	17	21.8	(13.1–34.0)	122	32.5	(27.2–38.3)	
ком. секс (я заплатив)	6	1.4	(0.6–3.2)	0	0.0		6	1.7	(0.8–3.9)	
ком. секс (мені заплатили)	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	476			89			387			
З ким останнім був секс										
чоловік	92	19.4	(15.6–23.8)	90	96.1	(84.6–99.1)	2	0.5	(0.1–2.0)	
жінка	390	80.6	(76.2–84.4)	2	3.9	(0.9–15.4)	388	99.5	(98.0–99.9)	
men and women	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	482			92			390			
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	454	96.6	(94.0–98.0)	82	94.3	(83.0–98.3)	372	97.1	(94.6–98.4)	0.3139
N	470			86			384			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	31	6.8	(4.6–10.1)	3	2.8	(0.8–9.0)	28	7.7	(5.1–11.6)	0.0933
N	470			86			384			

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	126	26.0	(21.7–30.8)	26	31.9	(21.6–44.3)	100	24.7	(20.1–29.9)	0.2339
N	470			86			384			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	200	76.8	(70.5–82.1)	55	84.2	(70.3–92.3)	145	74.3	(66.9–80.5)	0.1698
N	258			64			194			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	74	29.3	(23.5–35.9)	13	22.8	(12.6–37.5)	61	31.5	(24.8–39.1)	0.2598
N	258			64			194			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	6	2.6	(1.1–5.8)	0	0.0		6	3.4	(1.5–7.6)	0.1596
N	258			64			194			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні										
1	100	95.8	(87.6–98.6)	26	100.0		74	94.1	(83.2–98.1)	
2-4	3	4.2	(1.4–12.4)	0	0.0		3	5.9	(1.9–16.8)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	103			26			77			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові										
1	21	64.1	(46.8–78.3)	4	84.8	(36.5–98.2)	17	59.8	(41.2–76.0)	0.4885
2-4	14	30.8	(17.7–47.9)	1	15.2	(1.8–63.5)	13	34.0	(19.2–52.7)	
5+	2	5.2	(1.3–18.6)	0	0.0		2	6.2	(1.5–21.9)	
N	37			5			32			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього										
1	118	85.6	(78.2–90.8)	30	97.2	(82.0–99.6)	88	81.7	(72.5–88.3)	0.0772
2-4	19	13.0	(8.1–20.2)	1	2.8	(0.4–18.0)	18	16.4	(10.1–25.5)	
5+	2	1.4	(0.3–5.5)	0	0.0		2	1.9	(0.5–7.3)	
N	139			31			108			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так				0	0.0		0	0.0		
N				64			194			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	465	262	58.4 (53.1–63.6)	203	41.6 (36.4–46.9)	1.0000
Стать							
	чоловік	377	193	53.6 (47.6–59.5)	184	46.4 (40.5–52.4)	0.0002
	жінка	88	69	78.3 (66.9–86.5)	19	21.7 (13.5–33.1)	

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N		ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	20	11	64.3 (40.1–82.9)	9	35.7 (17.1–59.9)	0.4833
25-34	112	63	59.6 (49.2–69.1)	49	40.4 (30.9–50.8)	
35-44	228	119	54.5 (46.4–62.3)	109	45.5 (37.7–53.6)	
45+	105	69	64.4 (52.9–74.4)	36	35.6 (25.6–47.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	53	32	60.6 (46.1–73.5)	21	39.4 (26.5–53.9)	0.4880
3-5	46	29	61.3 (45.1–75.3)	17	38.7 (24.7–54.9)	
6-10	56	31	47.9 (33.0–63.2)	25	52.1 (36.8–67.0)	
≥11	310	170	59.8 (53.1–66.1)	140	40.2 (33.9–46.9)	
Партнерський статус						
живе сам	308	153	52.4 (45.7–59.0)	155	47.6 (41.0–54.3)	0.0009
живе з партнером	157	109	70.8 (62.2–78.1)	48	29.2 (21.9–37.8)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	109	67	62.7 (51.6–72.6)	42	37.3 (27.4–48.4)	0.2872
неповний робочий день або тимчасово	199	112	58.1 (49.7–66.1)	87	41.9 (33.9–50.3)	
безробітний	111	53	50.7 (40.1–61.2)	58	49.3 (38.8–59.9)	
інвалідність	24	14	69.6 (43.9–87.1)	10	30.4 (12.9–56.1)	
інші	22	16	72.3 (46.8–88.6)	6	27.7 (11.4–53.2)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	66	33	47.9 (33.5–62.5)	33	52.1 (37.5–66.5)	0.0651
3-10 тис	158	87	56.4 (46.7–65.7)	71	43.6 (34.3–53.3)	
10-20 тис	137	86	65.9 (56.5–74.2)	51	34.1 (25.8–43.5)	
≥20 тис	36	15	42.8 (26.2–61.3)	21	57.2 (38.7–73.8)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	303	171	57.7 (51.2–63.9)	132	42.3 (36.1–48.8)	0.6910

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
	так	162	91	60.0 (50.2–69.0)	71	40.0 (31.0–49.8)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	281	169	60.0 (53.4–66.3)	112	40.0 (33.7–46.6)	0.3638
так	178	92	55.0 (45.9–63.7)	86	45.0 (36.3–54.1)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	317	193	60.2 (54.2–65.8)	124	39.8 (34.2–45.8)	0.0070
так	143	67	45.7 (37.1–54.5)	76	54.3 (45.5–62.9)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	77	33	41.4 (27.3–57.1)	44	58.6 (42.9–72.7)	0.0198
негативний	388	229	60.6 (55.0–66.0)	159	39.4 (34.0–45.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	329	174	53.8 (47.2–60.3)	155	46.2 (39.7–52.8)	0.1318
стимулятори	76	50	69.8 (58.3–79.3)	26	30.2 (20.7–41.7)	
опі+стимул	50	31	63.3 (47.1–77.0)	19	36.7 (23.0–52.9)	
інші	10	7	60.3 (22.8–88.7)	3	39.7 (11.3–77.2)	
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	363	196	55.8 (49.5–61.9)	167	44.2 (38.1–50.5)	0.0419
стимулятори	86	58	69.7 (58.8–78.7)	28	30.3 (21.3–41.2)	
інші	6	3	34.8 (5.6–82.9)	3	65.2 (17.1–94.4)	

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										
так	91	45.1	(37.5–52.9)	20	34.0	(21.6–49.1)	71	49.3	(40.3–58.4)	0.0809
N	200			55			145			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	43	55.0	(42.2–67.1)	4	27.7	(7.6–64.3)	39	61.2	(47.2–73.5)	0.0750
N	73			12			61			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	2	37.6	(8.7–79.1)	0	0.0		2	37.6	(8.7–79.2)	
N	5			0			5			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	55	26.4	(20.0–34.1)	10	18.9	(9.5–34.0)	45	29.3	(21.5–38.4)	0.7319
часто	11	6.5	(3.6–11.5)	2	4.2	(1.0–15.8)	9	7.4	(3.8–13.7)	
половина	8	3.8	(1.8–7.8)	2	4.2	(1.0–15.9)	6	3.6	(1.5–8.5)	
іноді	5	2.3	(0.9–5.5)	2	2.7	(0.6–11.6)	3	2.1	(0.7–6.4)	
рідко	10	5.6	(2.7–11.3)	2	7.5	(1.8–25.9)	8	4.9	(2.1–11.0)	
ніколи	109	55.5	(47.5–63.1)	36	62.5	(46.6–76.1)	73	52.8	(43.6–61.8)	
N	198			54			144			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	26	37.1	(25.5–50.3)	2	19.9	(3.4–63.6)	24	41.0	(28.2–55.1)	0.0386
часто	9	13.2	(6.7–24.5)	0	0.0		9	16.3	(8.3–29.5)	
половина	3	3.5	(1.0–11.4)	1	6.6	(0.8–36.7)	2	2.8	(0.6–12.6)	
іноді	8	10.8	(5.2–21.2)	0	0.0		8	13.3	(6.4–25.6)	
рідко	5	9.0	(3.7–20.3)	1	7.7	(1.0–40.9)	4	9.3	(3.5–22.7)	
ніколи	18	26.4	(16.5–39.4)	8	65.8	(31.0–89.2)	10	17.4	(9.2–30.3)	
N	69			12			57			
Частота використання презервативів: комерційний (я заплатив) партнер										
завжди	2	42.1	(10.6–81.7)	0	0.0		2	42.1	(10.6–81.7)	
часто	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
половина	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
іноді	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
рідко	1	20.3	(2.7–69.8)	0	0.0		1	20.3	(2.7–69.8)	
ніколи	2	37.5	(9.0–78.6)	0	0.0		2	37.5	(9.0–78.6)	
N	5			0			5			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

			Результат тесту на ВІЛ				
		N	позитивний		негативний		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього							
	Разом	502	83	11.2 (8.3–14.9)	419	88.8 (85.1–91.7)	1.0000
Стать							
	чоловік	409	65	11.2 (7.9–15.5)	344	88.8 (84.5–92.1)	0.9958
	жінка	93	18	11.2 (6.2–19.4)	75	88.8 (80.6–93.8)	

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	20	1	0.9 (0.1–7.6)	19	99.1 (92.4–99.9)	0.0005
25-34	114	9	6.1 (2.8–12.7)	105	93.9 (87.3–97.2)	
35-44	248	55	16.8 (11.6–23.6)	193	83.2 (76.4–88.4)	
45+	120	18	6.9 (4.0–11.6)	102	93.1 (88.4–96.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	57	1	0.5 (0.1–3.6)	56	99.5 (96.4–99.9)	0.0566
3-5	46	5	9.9 (3.8–23.7)	41	90.1 (76.3–96.2)	
6-10	58	6	16.7 (6.5–36.8)	52	83.3 (63.2–93.5)	
≥11	341	71	12.7 (9.4–17.0)	270	87.3 (83.0–90.6)	
Партнерський статус						
живе сам	339	52	11.1 (7.5–16.0)	287	88.9 (84.0–92.5)	0.9008
живе з партнером	163	31	11.5 (7.4–17.4)	132	88.5 (82.6–92.6)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	115	20	11.4 (6.6–18.8)	95	88.6 (81.2–93.4)	0.8892
неповний робочий день або тимчасово	213	34	10.8 (6.4–17.6)	179	89.2 (82.4–93.6)	
безробітний	124	19	11.6 (6.6–19.6)	105	88.4 (80.4–93.4)	
інвалідність	26	8	17.9 (6.5–40.7)	18	82.1 (59.3–93.5)	
інші	24	2	6.9 (1.2–31.0)	22	93.1 (69.0–98.8)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	78	15	12.8 (6.2–24.5)	63	87.2 (75.5–93.8)	0.1131
3-10 тис	165	36	14.2 (8.5–22.7)	129	85.8 (77.3–91.5)	
10-20 тис	144	16	6.9 (3.8–12.1)	128	93.1 (87.9–96.2)	
≥20 тис	39	10	21.0 (9.8–39.5)	29	79.0 (60.5–90.2)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	323	38	6.6 (4.4–9.8)	285	93.4 (90.2–95.6)	0.0000
так	179	45	20.7 (13.9–29.7)	134	79.3 (70.3–86.1)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	303	25	8.2 (5.0–13.1)	278	91.8 (86.9–95.0)	0.0020
так	192	56	19.5 (14.1–26.3)	136	80.5 (73.7–85.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	341	26	8.5 (5.6–12.8)	315	91.5 (87.2–94.4)	0.0000
так	155	57	35.0 (27.4–43.6)	98	65.0 (56.4–72.6)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	354	70	12.9 (9.2–17.8)	284	87.1 (82.2–90.8)	0.3207
стимулятори	82	5	5.1 (2.0–12.4)	77	94.9 (87.6–98.0)	
опі+стимул	54	7	12.5 (5.2–27.0)	47	87.5 (73.0–94.8)	
інші	12	1	9.0 (1.0–50.3)	11	91.0 (49.7–99.0)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	393	77	13.2 (9.6–17.9)	316	86.8 (82.1–90.4)	0.0197
стимулятори	92	3	2.9 (0.9–9.0)	89	97.1 (91.0–99.1)	
інші	6	1	16.7 (1.1–77.7)	5	83.3 (22.3–98.9)	




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)




Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)




Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	495	303	73.9 (69.5–77.9)	192	26.1 (22.1–30.5)	1.0000
Стать						
чоловік	403	246	73.8 (68.8–78.2)	157	26.2 (21.8–31.2)	0.8765
жінка	92	57	74.6 (64.2–82.8)	35	25.4 (17.2–35.8)	
Вікова категорія 4						
<25	20	13	66.6 (41.7–84.8)	7	33.4 (15.2–58.3)	0.5828
25-34	112	76	78.1 (69.4–84.9)	36	21.9 (15.1–30.6)	
35-44	244	135	72.0 (65.4–77.8)	109	28.0 (22.2–34.6)	
45+	119	79	75.3 (65.5–83.0)	40	24.7 (17.0–34.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	57	46	84.1 (71.8–91.7)	11	15.9 (8.3–28.2)	0.0027
3-5	45	35	82.7 (68.6–91.3)	10	17.3 (8.7–31.4)	
6-10	57	45	85.2 (73.5–92.3)	12	14.8 (7.7–26.5)	
≥11	336	177	67.5 (61.5–73.0)	159	32.5 (27.0–38.5)	
Партнерський статус						

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	336	206	73.4 (67.9–78.3)	130	26.6 (21.7–32.1)	0.7242
живе з партнером	159	97	75.0 (67.3–81.4)	62	25.0 (18.6–32.7)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	113	67	74.1 (64.9–81.5)	46	25.9 (18.5–35.1)	0.1950
неповний робочий день або тимчасово	213	127	72.6 (65.6–78.7)	86	27.4 (21.3–34.4)	
безробітний	121	78	75.3 (66.0–82.7)	43	24.7 (17.3–34.0)	
інвалідність	24	11	55.4 (30.1–78.2)	13	44.6 (21.8–69.9)	
інші	24	20	90.4 (69.8–97.4)	4	9.6 (2.6–30.2)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	77	40	64.4 (50.6–76.2)	37	35.6 (23.8–49.4)	0.1831
3-10 тис	164	90	70.8 (62.6–77.8)	74	29.2 (22.2–37.4)	
10-20 тис	142	99	79.2 (71.6–85.2)	43	20.8 (14.8–28.4)	
≥20 тис	36	22	73.1 (53.9–86.3)	14	26.9 (13.7–46.1)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	319	212	77.1 (71.9–81.6)	107	22.9 (18.4–28.1)	0.0330
так	176	91	67.3 (58.9–74.7)	85	32.7 (25.3–41.1)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	338	265	79.9 (75.1–84.0)	73	20.1 (16.0–24.9)	0.0000
так	151	34	23.8 (16.9–32.5)	117	76.2 (67.5–83.1)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	81	25	54.4 (39.3–68.7)	56	45.6 (31.3–60.7)	0.0020
негативний	414	278	76.4 (71.7–80.5)	136	23.6 (19.5–28.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	349	180	66.5 (60.6–71.9)	169	33.5 (28.1–39.4)	0.0001

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
стимулятори	82	71	87.5 (78.1–93.3)	11	12.5 (6.7–21.9)	
опі+стимул	52	41	83.8 (69.7–92.1)	11	16.2 (7.9–30.3)	
інші	12	11	97.6 (80.3–99.8)	1	2.4 (0.2–19.7)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	386	208	68.3 (62.8–73.4)	178	31.7 (26.6–37.2)	0.0003
стимулятори	92	81	89.2 (80.9–94.1)	11	10.8 (5.9–19.1)	
інші	6	4	78.8 (23.9–97.8)	2	21.2 (2.2–76.1)	




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	93.0	92.5	97.4	0.0272
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	35.1	34.0	43.4	0.2506

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом	негативний	позитивний	
	%	%	%	p-значення
невиявлений = непередаваний	34.9	34.4	39.1	0.5341
ПКП знижує ризик	36.0	36.0	36.1	0.9935
АРТ слід починати негайно	50.9	51.0	49.8	0.8878
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	33.7	34.2	30.1	0.5708
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	35.6	35.7	34.8	0.9029
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	94.6	94.6	94.5	0.9591
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	75.0	74.7	76.7	0.7690
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	79.7	80.2	75.2	0.5329
лікування слід починати негайно	77.7	78.0	75.9	0.7523
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	48.2	49.3	39.2	0.1937
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	12.9	13.2	10.6	0.5487
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	81.3	82.3	73.2	0.2405
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	63.3	63.6	60.6	0.7033
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	54.5	55.0	50.7	0.6082
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	4.4	4.8	1.7	0.1030
лікування слід починати негайно	77.9	78.3	75.1	0.6961
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	44.6	45.1	41.3	0.6353
ВГС на 100% передається від матері до дитини	11.7	12.5	5.8	0.1325
ВГС передається через кров і статевим шляхом	79.3	78.2	88.2	0.0854
лікування ВГС не існує	56.8	56.1	63.0	0.3891
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	68.8	69.1	66.7	0.7899
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	65.8	65.1	71.4	0.4201

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	388	78.7	(73.9–82.8)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	427	83.3	(79.3–86.7)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	191	53.2	(46.4–59.8)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	131	34.0	(28.3–40.2)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	408	95.0	(90.9–97.3)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	399	99.5	(98.4–99.8)
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	51	7.4	(5.2–10.5)
негативний	360	92.6	(89.5–94.8)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	190	53.9	(47.2–60.6)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	2	0.1	(0.0–0.4)
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	96	61.2	(51.1–70.3)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	15	12.3	(6.8–21.4)
негативний	80	86.2	(76.7–92.2)
не може розкрити	1	1.5	(0.2–9.9)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	317	126	46.8 (40.2–53.6)	191	53.2 (46.4–59.8)	1.0000
Стать							
	чоловік	250	95	44.6 (37.1–52.4)	155	55.4 (47.6–62.9)	0.1947
	жінка	67	31	55.0 (41.2–68.0)	36	45.0 (32.0–58.8)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	11	6	58.9 (27.6–84.3)	5	41.1 (15.7–72.4)	0.1787
25-34	63	23	42.1 (29.2–56.2)	40	57.9 (43.8–70.8)	
35-44	167	61	42.8 (33.4–52.7)	106	57.2 (47.3–66.6)	
45+	76	36	59.6 (46.7–71.3)	40	40.4 (28.7–53.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	35	20	52.6 (35.1–69.5)	15	47.4 (30.5–64.9)	0.8805
3-5	24	9	41.4 (22.4–63.4)	15	58.6 (36.6–77.6)	
6-10	30	13	48.5 (27.7–69.8)	17	51.5 (30.2–72.3)	
≥11	228	84	46.1 (37.9–54.4)	144	53.9 (45.6–62.1)	
Партнерський статус						
живе сам	212	81	45.5 (37.4–53.9)	131	54.5 (46.1–62.6)	0.5717
живе з партнером	105	45	49.6 (38.3–61.0)	60	50.4 (39.0–61.7)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	81	35	50.8 (37.8–63.7)	46	49.2 (36.3–62.2)	0.7528
неповний робочий день або тимчасово	135	56	48.7 (38.5–58.9)	79	51.3 (41.1–61.5)	
безробітний	69	26	42.6 (29.9–56.4)	43	57.4 (43.6–70.1)	
інвалідність	17	3	35.8 (11.0–71.6)	14	64.2 (28.4–89.0)	
інші	15	6	34.4 (11.9–67.2)	9	65.6 (32.8–88.1)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	53	21	54.1 (37.6–69.8)	32	45.9 (30.2–62.4)	0.7984
3-10 тис	109	43	47.0 (35.4–58.9)	66	53.0 (41.1–64.6)	
10-20 тис	93	38	47.0 (35.3–59.0)	55	53.0 (41.0–64.7)	
≥20 тис	25	10	40.1 (20.1–64.0)	15	59.9 (36.0–79.9)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	197	85	49.2 (41.0–57.5)	112	50.8 (42.5–59.0)	0.3528
так	120	41	42.5 (31.5–54.3)	79	57.5 (45.7–68.5)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

	N	Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців: ні		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців: так		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	179	92	56.8 (48.1–65.0)	87	43.2 (35.0–51.9)	0.0000
так	134	33	25.0 (16.9–35.2)	101	75.0 (64.8–83.1)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	213	102	50.0 (42.6–57.5)	111	50.0 (42.5–57.4)	0.0000
так	103	24	23.3 (15.7–33.0)	79	76.7 (67.0–84.3)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	55	15	33.1 (18.2–52.4)	40	66.9 (47.6–81.8)	0.1220
негативний	262	111	48.8 (41.7–56.0)	151	51.2 (44.0–58.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	222	77	41.7 (33.6–50.3)	145	58.3 (49.7–66.4)	0.2864
стимулятори	54	30	56.8 (42.4–70.2)	24	43.2 (29.8–57.6)	
опі+стимул	34	16	53.1 (34.0–71.3)	18	46.9 (28.7–66.0)	
інші	7	3	55.7 (16.9–88.6)	4	44.3 (11.4–83.1)	
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	250	94	46.1 (38.3–54.1)	156	53.9 (45.9–61.7)	0.9136
стимулятори	59	29	49.4 (36.1–62.8)	30	50.6 (37.2–63.9)	
інші	3	1	50.6 (3.6–96.6)	2	49.4 (3.4–96.4)	

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	83	46.2 (31.9–61.1)	1.0000	48	86.1 (64.2–95.5)	1.0000	45	32	78.0 (62.1–88.5)	1.0000
Стать											
	чоловік	65	41.0 (26.0–57.8)	0.1230	34	86.3 (57.8–96.7)	0.9722	32	26	82.1 (61.6–92.9)	0.3420
	жінка	18	68.2 (36.3–89.0)		14	85.7 (41.8–98.0)		13	6	67.6 (36.6–88.3)	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4										
<25	1	0.0	0.3158	0	0.0		0	0	0.0	
25-34	9	54.7 (20.1–85.3)		5	100.0		5	3	81.7 (39.4–96.8)	
35-44	55	40.7 (24.7–59.1)		31	83.7 (53.1–95.9)		29	24	89.2 (74.4–95.9)	
45+	18	68.4 (41.7–86.7)		12	83.1 (37.6–97.6)		11	5	38.6 (14.5–70.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	1	0.0	0.0553	0	0.0		0	0	0.0	
3-5	5	30.2 (4.2–81.2)		1	100.0		1	1	100.0	
6-10	6	11.4 (1.3–56.0)		1	100.0		1	1	100.0	
≥11	71	58.9 (42.9–73.2)		46	84.3 (60.8–94.9)		43	30	74.6 (57.3–86.6)	
Партнерський статус										
живе сам	52	47.8 (29.2–67.0)	0.7469	32	85.8 (56.7–96.5)	0.9489	30	24	85.0 (66.7–94.1)	0.1319
живе з партнером	31	42.9 (23.6–64.7)		16	86.8 (44.9–98.2)		15	8	62.3 (31.3–85.7)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	20	37.6 (16.5–64.8)	0.5541	9	67.4 (19.1–94.8)	0.5971	8	5	68.5 (29.4–91.9)	0.3256
неповний робочий день або тимчасово	34	40.7 (19.7–65.8)		17	88.9 (50.1–98.5)		16	11	71.1 (39.7–90.2)	
безробітний	19	63.3 (31.9–86.4)		14	90.4 (53.7–98.7)		13	11	92.4 (71.4–98.3)	
інвалідність	8	57.8 (13.0–92.6)		7	100.0		7	4	56.3 (20.5–86.5)	
інші	2	20.8 (1.4–83.1)		1	100.0		1	1	100.0	
Категорія місячного доходу										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	15	27.5 (10.3–55.7)	0.4082	9	100.0	0.1158	9	7	78.8 (42.4–94.9)	0.8781
3-10 тис	36	51.4 (26.0–76.2)		25	91.2 (57.2–98.8)		24	16	77.5 (56.4–90.1)	
10-20 тис	16	37.6 (14.7–67.8)		5	100.0		5	4	80.3 (29.1–97.6)	
≥20 тис	10	65.7 (28.1–90.4)		6	55.0 (14.8–89.6)		4	2	62.5 (13.3–94.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	38	56.2 (35.9–74.6)	0.2538	23	78.3 (43.7–94.4)	0.2683	21	14	77.5 (55.1–90.6)	0.9484
так	45	39.6 (22.4–59.8)		25	93.4 (64.7–99.1)		24	18	78.4 (54.0–91.8)	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	25	32.9 (15.5–56.8)	0.0418	9	91.0 (55.0–98.8)	0.5654	8	7	90.1 (51.8–98.7)	0.2374
так	56	62.7 (45.6–77.1)		38	82.8 (52.3–95.5)		36	25	71.1 (52.4–84.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	26	40.3 (22.3–61.3)	0.1721	12	76.2 (45.1–92.6)	0.1082	9	7	85.6 (55.0–96.7)	0.2765
так	57	58.2 (42.9–72.0)		36	100.0		36	25	69.8 (52.5–82.8)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	83	46.2 (31.7–61.3)		48	86.1 (63.8–95.6)		45	32	78.0 (61.8–88.6)	
негативний	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
опіоїди	70	46.2 (30.0–63.3)	0.7693	42	81.1 (55.2–93.8)		39	27	74.0 (56.0–86.4)	
стимулятори	5	59.5 (18.0–90.8)		3	100.0		3	3	100.0	
опі+стимул	7	45.2 (12.5–82.8)		3	100.0		3	2	76.9 (22.0–97.5)	
інші	1	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	77	48.1 (32.4–64.2)	0.5420	46	84.6 (61.2–95.0)	0.8250	43	30	75.1 (57.9–86.9)	0.6879
стимулятори	3	38.4 (5.1–88.0)		1	100.0		1	1	100.0	
інші	1	100.0		1	100.0		1	1	100.0	

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	1	1.6	(0.2–10.7)
1-2 тижні тому	4	16.9	(6.0–39.1)
3-4 тижні тому	2	3.3	(0.8–13.2)
1-3 місяці тому	2	3.2	(0.7–12.8)
ніколи	35	75.0	(54.9–88.1)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	6	81.1	(49.0–95.0)
ліків не було	3	18.9	(5.0–51.0)
був під впливом	0	0.0	
не хотів, щоб інші бачили	0	0.0	
інші	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	3	25.7	(6.6–63.1)
відсутність часу на відвідування клініки	1	15.0	(2.0–60.5)
відсутність мотивації відвідувати клініку	1	15.0	(2.0–60.5)
пропуск візиту, важко повернутися	1	9.5	(1.1–48.9)
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	1	8.0	(1.0–43.2)
вживання наркотиків	1	6.5	(0.8–37.1)
побічні ефекти або ускладнення	1	6.5	(0.8–37.1)
немає розуміння як	1	6.5	(0.8–37.1)
втрачено або продано всі АРВ-препарати	0	0.0	
Причини відмови від ДРТ			
вживання алкоголю	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			

	n	%	ДІ
довго чекав і пішов	0	0.0	
Час на АРТ			
≤3м	0	0.0	
4-24м	2	9.4	(1.9–35.2)
25-60м	5	45.4	(16.0–78.4)
5 років +	4	45.2	(15.7–78.5)

9. Доконтактна профілактика



Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

			Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
		N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього											
	Разом	502	9	0.9 (0.4–1.9)	2	0.3 (0.1–1.6)	34	5.4 (3.7–8.0)	457	93.3 (90.6–95.3)	1.0000
Стать											
	чоловік	409	7	0.9 (0.4–2.0)	1	0.1 (0.0–0.5)	21	4.4 (2.7–7.3)	380	94.6 (91.7–96.5)	0.0137
	жінка	93	2	1.2 (0.3–5.1)	1	1.3 (0.2–9.1)	13	9.7 (5.1–17.8)	77	87.8 (79.2–93.1)	
Вікова категорія 4											
	<25	20	0	0.0	0	0.0	3	14.8 (4.3–40.2)	17	85.2 (59.8–95.7)	0.3295
	25-34	114	2	1.0 (0.2–4.2)	0	0.0	9	6.4 (3.2–12.5)	103	92.6 (86.4–96.1)	
	35-44	248	4	0.8 (0.3–2.6)	1	0.1 (0.0–0.8)	12	3.7 (1.7–7.7)	231	95.3 (91.4–97.5)	
	45+	120	3	1.2 (0.3–4.4)	1	1.2 (0.2–7.9)	10	6.0 (2.8–12.4)	106	91.6 (84.7–95.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків											
	≤2	57	0	0.0	0	0.0	3	5.6 (1.7–16.5)	54	94.4 (83.5–98.3)	
	3-5	46	0	0.0	0	0.0	2	2.2 (0.5–10.0)	44	97.8 (90.0–99.5)	

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
6-10	58	1	1.1 (0.2–8.1)	0	0.0	7	11.1 (4.6–24.3)	50	87.7 (74.7–94.6)	
≥11	341	8	1.3 (0.6–2.8)	2	0.5 (0.1–2.6)	22	4.8 (2.9–7.8)	309	93.5 (90.2–95.7)	
Партнерський статус										
живе сам	339	5	0.6 (0.3–1.7)	2	0.5 (0.1–2.4)	19	4.7 (2.7–7.9)	313	94.2 (90.9–96.4)	0.3860
живе з партнером	163	4	1.5 (0.5–4.5)	0	0.0	15	7.1 (4.0–12.5)	144	91.4 (85.9–94.9)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	115	3	1.3 (0.4–4.3)	0	0.0	11	5.7 (2.8–11.4)	101	93.0 (87.2–96.3)	0.8542
неповний робочий день або тимчасово	213	3	0.6 (0.2–2.3)	1	0.1 (0.0–0.9)	14	6.0 (3.3–10.8)	195	93.2 (88.5–96.1)	
безробітний	124	2	1.1 (0.2–5.2)	1	1.0 (0.1–7.0)	6	3.8 (1.4–9.7)	115	94.1 (87.7–97.3)	
інвалідність	26	1	2.1 (0.2–15.0)	0	0.0	2	11.9 (2.1–45.5)	23	86.1 (55.2–96.9)	
інші	24	0	0.0	0	0.0	1	2.8 (0.3–20.0)	23	97.2 (80.0–99.7)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	78	0	0.0	0	0.0	3	4.3 (0.9–19.1)	75	95.7 (80.9–99.1)	0.6808
3-10 тис	165	7	2.2 (0.9–5.0)	0	0.0	14	6.6 (3.6–12.0)	144	91.2 (85.7–94.7)	
10-20 тис	144	1	0.5 (0.1–3.6)	1	0.2 (0.0–1.4)	8	3.5 (1.6–7.7)	134	95.8 (91.5–97.9)	
≥20 тис	39	1	0.7 (0.1–5.2)	0	0.0	4	8.4 (2.8–22.8)	34	90.9 (76.8–96.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	323	3	0.5 (0.1–1.5)	1	0.4 (0.1–2.7)	22	6.0 (3.7–9.6)	297	93.1 (89.5–95.6)	0.2128
так	179	6	1.9 (0.7–4.7)	1	0.2 (0.0–1.3)	12	4.3 (2.2–8.2)	160	93.7 (89.4–96.3)	

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	303	0	0.0	1	0.3 (0.0–2.5)	13	3.4 (1.8–6.4)	289	96.2 (93.2–97.9)	0.0000
так	192	9	3.6 (1.7–7.3)	1	0.2 (0.0–1.6)	20	10.6 (6.3–17.2)	162	85.7 (78.8–90.5)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	341	3	0.6 (0.2–1.8)	1	0.3 (0.0–2.0)	18	4.9 (3.0–7.8)	319	94.3 (91.2–96.3)	0.0031
так	155	6	3.8 (1.7–8.5)	1	0.5 (0.1–3.8)	15	9.1 (5.4–14.8)	133	86.5 (80.1–91.1)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	83	7	6.2 (2.6–14.3)	1	0.5 (0.1–3.7)	8	4.2 (2.0–8.9)	67	89.0 (80.7–94.0)	0.0000
негативний	419	2	0.3 (0.1–1.1)	1	0.3 (0.0–2.0)	26	5.6 (3.6–8.5)	390	93.9 (90.9–95.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	354	9	1.4 (0.7–3.0)	0	0.0	29	6.8 (4.4–10.5)	316	91.7 (88.0–94.4)	0.3717
стимулятори	82	0	0.0	1	1.3 (0.2–8.8)	3	3.9 (1.2–11.5)	78	94.8 (86.8–98.1)	
опі+стимул	54	0	0.0	1	0.4 (0.1–3.1)	2	2.3 (0.5–9.3)	51	97.3 (90.7–99.2)	
інші	12	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	393	9	1.3 (0.6–2.6)	1	0.1 (0.0–0.6)	29	5.9 (3.8–9.1)	354	92.7 (89.4–95.1)	0.5123
стимулятори	92	0	0.0	1	1.1 (0.2–7.7)	5	4.9 (2.0–11.5)	86	94.0 (87.0–97.3)	
інші	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	100.0	

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	9	0.9	(0.4–1.9)
приймав в минулому	2	0.3	(0.1–1.6)
ніколи не приймав	34	5.4	(3.7–8.0)
не знає що це	457	93.3	(90.6–95.3)
Обізнаність про ДКП			
ні	457	93.3	(90.6–95.3)
так	45	6.7	(4.7–9.4)
Використання ДКП зараз			
ні	493	99.1	(98.1–99.6)
так	9	0.9	(0.4–1.9)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	36	86.2	(73.1–93.5)
так	9	13.8	(6.5–26.9)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)




Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)




Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	0	0.0	
клініка закрита після лютого 2022 року	1	7.5	(1.0–40.2)
слабкий або відсутній ефект	1	14.1	(1.9–57.9)
побічні ефекти	2	16.5	(2.9–56.7)
не хочу відвідувати клініку	2	25.0	(6.0–63.4)
не хочу кидати наркотики	1	2.0	(0.3–14.6)
важко дістатися до клініки	1	20.7	(3.1–68.4)
не потребує	3	39.1	(12.6–74.1)
не подобається ставлення лікаря	0	0.0	
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	3	26.6	(7.1–63.1)
не змінилось	6	59.7	(25.9–86.3)
зменшилося	1	13.7	(1.9–56.8)
Чи купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	174	31.7	(27.2–36.7)
так, бупренорфін	84	20.1	(16.1–24.7)
не купував	239	48.2	(43.0–53.4)
Де купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	239	49.1	(43.9–54.4)
купляв на чорн. ринку	239	49.9	(44.7–55.2)
купляв в приватній клініці	6	0.9	(0.3–2.5)
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорн.ринку			
ін'єкційно	204	83.0	(77.6–87.4)
ін'єкційно у суміші	35	10.9	(7.5–15.6)
ковтав або розсмоктував	9	2.7	(1.3–5.6)
нюхав	9	3.4	(1.7–6.8)

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

		Отримував ЗПТ (з усіх)							
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього										
Разом	496	155	10.7 (8.9–12.8)	9	2.9 (1.5–5.6)	55	14.1 (10.8–18.1)	277	72.4 (67.9–76.4)	1.0000
Стать										
чоловік	404	129	10.7 (8.8–13.1)	9	3.6 (1.8–6.8)	46	14.3 (10.7–18.7)	220	71.4 (66.4–76.0)	0.3847
жінка	92	26	10.5 (6.5–16.4)	0	0.0	9	13.3 (6.8–24.3)	57	76.2 (65.7–84.3)	
Вікова категорія 4										
<25	19	1	1.0 (0.1–8.0)	0	0.0	3	22.4 (6.8–53.1)	15	76.6 (46.6–92.5)	0.4982
25-34	112	24	7.7 (4.8–12.3)	2	2.5 (0.6–9.5)	13	12.2 (7.0–20.2)	73	77.7 (68.9–84.5)	
35-44	246	92	13.0 (10.1–16.5)	5	3.6 (1.5–8.6)	30	15.5 (10.9–21.6)	119	67.9 (60.9–74.1)	
45+	119	38	11.0 (7.6–15.6)	2	2.3 (0.5–9.5)	9	11.2 (5.7–20.9)	70	75.5 (66.2–82.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	55	3	1.7 (0.5–5.3)	1	1.8 (0.2–12.4)	6	11.1 (4.9–23.4)	45	85.4 (73.1–92.6)	0.0107
3-5	46	4	2.5 (0.9–7.0)	2	7.4 (1.8–26.1)	5	10.2 (4.2–23.1)	35	79.9 (64.1–89.8)	
6-10	56	10	6.6 (2.9–14.2)	0	0.0	9	18.7 (9.5–33.5)	37	74.7 (60.2–85.3)	
≥11	339	138	15.1 (12.4–18.4)	6	2.9 (1.3–6.4)	35	14.5 (10.4–19.7)	160	67.5 (61.6–72.9)	
Партнерський статус										
живе сам	334	107	11.0 (8.8–13.7)	6	2.8 (1.2–6.0)	35	13.7 (9.9–18.8)	186	72.5 (67.0–77.4)	0.9645
живе з партнером	162	48	10.0 (7.2–13.8)	3	3.1 (0.9–10.0)	20	14.8 (9.5–22.2)	91	72.1 (64.0–78.9)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	115	29	8.0 (5.2–11.9)	2	2.5 (0.6–9.6)	19	19.8 (12.7–29.5)	65	69.8 (59.8–78.2)	0.0120
неповний робочий день або тимчасово	210	65	10.3 (7.8–13.6)	3	2.4 (0.7–7.6)	19	12.0 (7.6–18.4)	123	75.4 (68.5–81.1)	

	N	Отримував ЗПТ (з усіх)								p-значення
		приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
безробітний	121	36	10.4 (7.2–15.0)	2	2.4 (0.6–9.4)	14	14.1 (8.4–22.8)	69	73.0 (64.0–80.5)	
інвалідність	26	17	29.9 (15.1–50.5)	2	19.6 (4.9–53.6)	1	7.5 (1.0–40.7)	6	42.9 (20.5–68.6)	
інші	24	8	15.0 (5.5–35.1)	0	0.0	2	8.7 (1.9–31.6)	14	76.3 (52.9–90.2)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	78	37	18.4 (12.1–27.1)	0	0.0	9	19.8 (10.3–34.6)	32	61.8 (48.2–73.7)	0.0644
3-10 тис	163	56	11.6 (8.5–15.6)	2	2.1 (0.5–8.0)	20	15.7 (10.2–23.5)	85	70.6 (62.4–77.7)	
10-20 тис	141	31	7.0 (4.7–10.4)	3	3.6 (1.1–11.1)	14	11.8 (7.0–19.2)	93	77.5 (69.3–84.1)	
≥20 тис	39	10	8.2 (3.8–16.6)	3	10.3 (3.1–29.2)	5	11.8 (4.6–27.1)	21	69.7 (51.5–83.3)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	319	78	7.6 (5.9–9.6)	3	1.4 (0.4–4.3)	27	10.1 (6.9–14.5)	211	81.0 (76.2–85.0)	0.0000
так	177	77	17.2 (13.0–22.4)	6	6.0 (2.6–13.1)	28	22.4 (15.6–30.9)	66	54.5 (45.4–63.4)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

	N	Отримував ЗПТ (з усіх)								p-значення
		приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	299	34	3.4 (2.3–5.0)	6	2.5 (1.1–5.8)	36	13.0 (9.4–17.7)	223	81.1 (76.0–85.3)	0.0000
так	190	117	30.8 (24.6–37.7)	2	2.6 (0.7–9.9)	19	17.8 (11.5–26.5)	52	48.8 (40.0–57.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	341	0	0.0	9	3.2 (1.6–6.2)	55	15.8 (12.1–20.2)	277	81.0 (76.2–85.0)	0.0000
так	155	155	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	83	57	33.0 (22.4–45.6)	2	4.5 (1.0–17.7)	5	11.9 (4.9–26.3)	19	50.5 (35.4–65.6)	0.0000

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
негативний	413	98	7.8 (6.3–9.7)	7	2.7 (1.3–5.6)	50	14.4 (10.9–18.7)	258	75.2 (70.4–79.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	351	144	15.3 (12.6–18.5)	4	2.2 (0.8–6.0)	33	12.8 (9.1–17.7)	170	69.7 (64.1–74.7)	0.0008
стимулятори	79	3	1.1 (0.3–3.6)	2	3.5 (0.9–13.1)	7	9.7 (4.4–19.9)	67	85.7 (74.9–92.3)	
опі+стимул	54	6	2.4 (1.0–5.6)	3	5.7 (1.7–17.1)	14	27.6 (16.4–42.7)	31	64.3 (49.1–77.1)	
інші	12	2	11.4 (1.8–47.5)	0	0.0	1	7.1 (0.7–43.7)	9	81.5 (47.0–95.6)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	390	152	14.0 (11.6–16.9)	7	3.0 (1.4–6.4)	41	14.0 (10.3–18.7)	190	69.0 (63.6–73.8)	0.0168
стимулятори	89	1	0.2 (0.0–1.6)	2	3.0 (0.7–11.4)	12	14.5 (8.2–24.5)	74	82.3 (71.8–89.4)	
інші	6	1	4.5 (0.3–44.6)	0	0.0	0	0.0	5	95.5 (55.4–99.7)	




Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)




Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

		n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь				
	так	142	26.5	(22.2–31.3)
Кількість передозувань протягом життя				
	1	51	36.9	(27.9–47.0)
	2-4	58	44.9	(35.1–55.2)
	5+	25	18.1	(10.7–29.0)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	так	31	6.0	(4.0–8.9)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)				
	так	31	22.9	(15.7–32.2)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців				
	1	19	74.2	(48.6–89.7)

	n	%	ДІ
2-4	5	25.8	(10.3–51.4)
5+	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)			
метадон	4	30.8	(9.7–64.7)
інші опіоїди	1	9.5	(1.3–45.3)
стимулятор	7	54.4	(25.6–80.6)
інші	2	5.3	(1.2–21.1)
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)			
метадон+стимулятор	1	7.5	(0.8–44.7)
метадон+барбіт. або димедр.	1	7.5	(0.8–44.7)
метадон+інше	3	85.0	(46.0–97.4)
інші	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)			
метадон	7	60.9	(31.7–84.0)
інші опіоїди	0	0.0	
стимулятор	4	32.2	(11.9–62.4)
інші	1	6.9	(0.9–36.9)
Знання та досвід налоксону			
ніколи не чув	287	65.7	(60.8–70.2)
знає, але не користувався	161	25.9	(21.8–30.3)
користувався	34	5.1	(3.4–7.8)
користувались друзі	19	3.3	(2.0–5.5)
користувався сам та друзі	0	0.0	

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	499	468	94.0 (91.1–96.0)	31	6.0 (4.0–8.9)	1.0000
Стать						
чоловік	406	380	94.2 (91.0–96.2)	26	5.8 (3.8–9.0)	0.7800
жінка	93	88	93.2 (83.0–97.5)	5	6.8 (2.5–17.0)	
Вікова категорія 4						
<25	20	18	83.8 (51.3–96.2)	2	16.2 (3.8–48.7)	0.1824
25-34	114	106	92.7 (85.5–96.4)	8	7.3 (3.6–14.5)	
35-44	246	230	94.4 (90.1–96.9)	16	5.6 (3.1–9.9)	
45+	119	114	96.9 (91.6–98.9)	5	3.1 (1.1–8.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	57	56	97.7 (84.8–99.7)	1	2.3 (0.3–15.2)	0.4885

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	45	41	91.8 (78.3–97.2)	4	8.2 (2.8–21.7)	
6-10	58	53	90.6 (76.9–96.5)	5	9.4 (3.5–23.1)	
≥11	339	318	94.2 (90.6–96.5)	21	5.8 (3.5–9.4)	
Партнерський статус						
живе сам	338	320	94.8 (91.5–96.9)	18	5.2 (3.1–8.5)	0.3006
живе з партнером	161	148	92.1 (85.5–95.9)	13	7.9 (4.1–14.5)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	114	112	98.7 (93.3–99.8)	2	1.3 (0.2–6.7)	0.0152
неповний робочий день або тимчасово	213	203	95.2 (90.4–97.7)	10	4.8 (2.3–9.6)	
безробітний	123	107	87.5 (79.3–92.8)	16	12.5 (7.2–20.7)	
інвалідність	26	24	91.5 (61.2–98.6)	2	8.5 (1.4–38.8)	
інші	23	22	95.4 (70.3–99.4)	1	4.6 (0.6–29.7)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	78	71	87.4 (73.5–94.5)	7	12.6 (5.5–26.5)	0.0573
3-10 тис	164	156	97.4 (94.0–98.9)	8	2.6 (1.1–6.0)	
10-20 тис	142	135	95.0 (89.4–97.7)	7	5.0 (2.3–10.6)	
≥20 тис	39	37	92.8 (74.2–98.3)	2	7.2 (1.7–25.8)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	322	305	94.9 (91.2–97.0)	17	5.1 (3.0–8.8)	0.2928
так	177	163	92.1 (86.1–95.7)	14	7.9 (4.3–13.9)	

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	301	285	94.4 (90.9–96.7)	16	5.6 (3.3–9.1)	0.7754
так	192	178	93.7 (88.1–96.8)	14	6.3 (3.2–11.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	339	319	93.9 (90.6–96.1)	20	6.1 (3.9–9.4)	0.8348
так	154	143	93.4 (88.1–96.5)	11	6.6 (3.5–11.9)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	83	76	92.4 (80.5–97.3)	7	7.6 (2.7–19.5)	0.6216
негативний	416	392	94.2 (91.1–96.2)	24	5.8 (3.8–8.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	351	331	95.1 (91.8–97.1)	20	4.9 (2.9–8.2)	0.3864
стимулятори	82	77	92.6 (82.6–97.1)	5	7.4 (2.9–17.4)	
опі+стимул	54	48	89.6 (76.9–95.7)	6	10.4 (4.3–23.1)	
інші	12	12	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	390	366	94.6 (91.4–96.6)	24	5.4 (3.4–8.6)	0.6650
стимулятори	92	86	92.5 (83.6–96.7)	6	7.5 (3.3–16.4)	
інші	6	6	100.0	0	0.0	

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	501	287	65.7 (60.8–70.2)	180	29.2 (24.9–33.8)	34	5.1 (3.4–7.8)	1.0000
Стать								
чоловік	408	229	65.1 (59.7–70.2)	148	29.6 (24.8–34.9)	31	5.2 (3.4–8.0)	0.9057
жінка	93	58	67.9 (56.6–77.5)	32	27.4 (18.9–38.0)	3	4.7 (1.3–15.9)	
Вікова категорія 4								
<25	20	10	42.3 (21.5–66.2)	6	28.4 (12.1–53.3)	4	29.3 (11.1–57.9)	0.0000

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
25-34	114	65	63.3 (53.2–72.4)	39	30.1 (21.8–40.0)	10	6.5 (3.1–13.3)	
35-44	247	134	66.4 (59.2–72.8)	96	29.9 (23.7–36.8)	17	3.8 (2.1–6.7)	
45+	120	78	72.1 (62.5–80.1)	39	26.9 (19.1–36.6)	3	0.9 (0.3–3.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	56	47	84.3 (71.2–92.1)	6	10.5 (4.5–22.3)	3	5.2 (1.4–17.3)	0.0200
3-5	46	31	71.1 (55.7–82.8)	14	27.1 (15.8–42.4)	1	1.9 (0.2–12.8)	
6-10	58	41	70.5 (55.2–82.2)	14	22.8 (12.9–37.0)	3	6.8 (1.8–21.9)	
≥11	341	168	59.4 (53.0–65.4)	146	35.3 (29.6–41.5)	27	5.3 (3.3–8.5)	
Партнерський статус								
живе сам	339	192	65.6 (59.6–71.1)	124	29.3 (24.2–35.1)	23	5.1 (3.1–8.3)	0.9961
живе з партнером	162	95	65.9 (57.3–73.6)	56	28.9 (21.9–37.1)	11	5.2 (2.3–11.2)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	115	64	64.4 (53.9–73.6)	45	31.2 (22.5–41.4)	6	4.4 (1.7–11.3)	0.4398
неповний робочий день або тимчасово	212	123	66.2 (58.5–73.1)	75	28.9 (22.5–36.2)	14	4.9 (2.4–9.8)	
безробітний	124	71	66.7 (57.0–75.1)	42	27.8 (20.0–37.3)	11	5.5 (2.6–11.0)	
інвалідність	26	10	42.3 (20.2–67.9)	13	40.6 (19.7–65.6)	3	17.1 (4.8–46.2)	
інші	24	19	78.7 (53.9–92.1)	5	21.3 (7.9–46.1)	0	0.0	
Категорія місячного доходу								

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	78	42	59.2 (45.2–71.9)	30	31.2 (20.1–45.0)	6	9.6 (3.5–23.4)	0.3337
3-10 тис	165	85	63.9 (55.1–71.8)	73	34.3 (26.6–43.0)	7	1.8 (0.7–4.7)	
10-20 тис	144	89	66.6 (57.6–74.5)	44	27.4 (20.1–36.1)	11	6.0 (3.0–11.8)	
≥20 тис	39	21	61.3 (42.1–77.6)	14	30.7 (16.6–49.6)	4	8.0 (2.3–24.3)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	322	204	69.6 (63.7–74.9)	105	26.4 (21.5–32.0)	13	4.0 (2.1–7.5)	0.0475
так	179	83	57.6 (48.6–66.1)	75	35.0 (27.1–43.7)	21	7.4 (4.3–12.5)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	302	215	74.1 (68.4–79.1)	76	22.4 (17.8–27.9)	11	3.5 (1.8–6.7)	0.0000
так	192	69	42.3 (33.7–51.4)	101	47.8 (39.2–56.6)	22	9.9 (5.8–16.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	340	230	69.3 (63.9–74.2)	98	26.7 (22.1–31.9)	12	4.0 (2.2–7.1)	0.0000
так	155	52	32.8 (25.2–41.4)	82	53.8 (45.3–62.2)	21	13.4 (8.6–20.1)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	83	37	56.2 (41.1–70.2)	34	36.6 (23.8–51.7)	12	7.2 (3.5–14.3)	0.2719
негативний	418	250	66.9 (61.7–71.7)	146	28.3 (23.8–33.2)	22	4.9 (3.0–7.8)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	353	184	61.7 (55.5–67.5)	138	31.2 (25.9–37.0)	31	7.1 (4.6–10.8)	0.0382
стимулятори	82	61	76.4 (65.3–84.7)	20	21.2 (13.5–31.5)	1	2.5 (0.3–15.8)	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
опі+стимул	54	31	62.6 (47.1–75.8)	21	36.6 (23.5–52.1)	2	0.8 (0.2–3.3)	
інші	12	11	94.0 (60.6–99.4)	1	6.0 (0.6–39.4)	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	392	208	62.6 (56.7–68.0)	151	31.1 (26.0–36.6)	33	6.4 (4.2–9.6)	0.2040
стимулятори	92	65	72.5 (61.9–81.0)	26	25.4 (17.4–35.5)	1	2.1 (0.3–13.9)	
інші	6	6	100.0	0	0.0	0	0.0	

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	47	7.1	(4.9–10.1)
	гепатит C	172	27.8	(23.4–32.8)
	сифіліс	13	1.8	(1.0–3.3)
	гонорея	10	1.9	(1.0–3.7)
	хламідіоз	14	2.7	(1.5–4.7)
	герпес	73	13.2	(10.3–16.8)
	папіломавірус	19	4.0	(2.5–6.4)
	туберкульоз	12	2.3	(1.2–4.6)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	26	50.8	(33.0–68.3)
	пролікувався неуспішно	1	0.9	(0.1–6.0)
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	4	7.6	(2.0–25.1)
	ніколи не лікувався	16	40.7	(24.4–59.4)
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	54	30.4	(22.4–39.8)
	пролікувався неуспішно	14	9.2	(5.1–16.2)
	не завершив	9	4.5	(2.1–9.4)
	зараз лікується	21	9.9	(5.9–16.1)
	ніколи не лікувався	72	46.0	(36.4–55.9)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	10	88.6	(49.1–98.4)
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	1	11.4	(1.6–50.9)
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	11	100.0	
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	

	n	%	ДІ
зараз лікується	0	0.0	
ніколи не лікувався	0	0.0	

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

	n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців			
так	193	40.7	(35.6–46.0)
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	165	34.2	(29.4–39.3)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	131	78.4	(69.4–85.3)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	49	32.0	(24.0–41.2)
приватна клініка	4	2.7	(1.0–7.1)
приватна лабораторія	1	0.8	(0.1–5.2)
протитуберкульозного диспансеру	1	0.6	(0.1–4.3)
наркологічний диспансер	3	2.4	(0.7–7.2)
ІПСШ	0	0.0	
швидкої допомоги	1	0.8	(0.1–5.2)
мобільна амбулаторія	1	0.2	(0.0–1.2)
інше	0	0.0	
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	118	70.1	(60.9–77.9)
лікарня, ВІЛ-клініка	37	23.4	(16.3–32.5)
приватна клініка	4	2.7	(1.0–7.1)
приватна лабораторія	1	0.8	(0.1–5.2)
протитуберкульозний диспансер	1	0.6	(0.1–4.3)
наркологічна клініка	3	2.4	(0.7–7.2)
ІПСШ клініка	0	0.0	
швидка допомога	0	0.0	
мобільна клініка	0	0.0	
інші	0	0.0	
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	160	96.8	(91.9–98.8)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	406	78.4	(73.5–82.7)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	28	5.6	(3.6–8.7)
раз на місяць	71	16.5	(12.6–21.3)
3-4 рази в 12 місяців	153	42.3	(36.5–48.3)
тільки один раз	130	35.6	(30.1–41.6)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

			Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	482	356	70.9 (65.8–75.5)	126	29.1 (24.5–34.2)	1.0000
Стать							
	чоловік	392	278	67.9 (62.2–73.2)	114	32.1 (26.8–37.8)	0.0177
	жінка	90	78	83.1 (71.6–90.5)	12	16.9 (9.5–28.4)	
Вікова категорія 4							
	<25	19	11	55.6 (31.2–77.6)	8	44.4 (22.4–68.8)	0.1816
	25-34	108	83	76.7 (66.9–84.3)	25	23.3 (15.7–33.1)	
	35-44	237	175	67.8 (59.9–74.9)	62	32.2 (25.1–40.1)	
	45+	118	87	74.7 (65.0–82.5)	31	25.3 (17.5–35.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	56	40	73.5 (60.0–83.7)	16	26.5 (16.3–40.0)	0.9748
	3-5	42	31	69.8 (52.6–82.7)	11	30.2 (17.3–47.4)	
	6-10	55	40	71.0 (55.7–82.7)	15	29.0 (17.3–44.3)	
	≥11	329	245	70.4 (63.9–76.3)	84	29.6 (23.7–36.1)	
Партнерський статус							

	Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	326	241	71.5 (65.2–77.0)	85	28.5 (23.0–34.8)	0.7380
живе з партнером	156	115	69.7 (60.7–77.5)	41	30.3 (22.5–39.3)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	113	80	68.1 (57.5–77.1)	33	31.9 (22.9–42.5)	0.8373
неповний робочий день або тимчасово	202	149	70.2 (61.8–77.4)	53	29.8 (22.6–38.2)	
безробітний	119	91	73.8 (63.9–81.8)	28	26.2 (18.2–36.1)	
інвалідність	25	20	67.1 (38.8–86.8)	5	32.9 (13.2–61.2)	
інші	23	16	78.7 (55.5–91.6)	7	21.3 (8.4–44.5)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	78	62	77.5 (64.1–86.9)	16	22.5 (13.1–35.9)	0.1519
3-10 тис	159	129	75.1 (65.1–82.9)	30	24.9 (17.1–34.9)	
10-20 тис	137	88	64.0 (54.6–72.5)	49	36.0 (27.5–45.4)	
≥20 тис	37	28	79.4 (60.5–90.7)	9	20.6 (9.3–39.5)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	310	234	72.2 (65.9–77.8)	76	27.8 (22.2–34.1)	0.4218
так	172	122	68.1 (59.2–75.8)	50	31.9 (24.2–40.8)	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

	Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	287	199	68.7 (62.4–74.4)	88	31.3 (25.6–37.6)	0.0969
так	189	154	77.2 (68.7–84.0)	35	22.8 (16.0–31.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	326	226	69.7 (64.0–74.8)	100	30.3 (25.2–36.0)	0.0009
так	151	128	84.7 (77.6–89.9)	23	15.3 (10.1–22.4)	
Результат тесту на ВІЛ						

	N	Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
		ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	79	69	80.7 (65.3–90.3)	10	19.3 (9.7–34.7)	0.1532
негативний	403	287	69.8 (64.3–74.7)	116	30.2 (25.3–35.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	340	263	74.9 (69.0–80.0)	77	25.1 (20.0–31.0)	0.0289
стимулятори	79	50	63.9 (52.1–74.3)	29	36.1 (25.7–47.9)	
опі+стимул	52	33	58.3 (41.8–73.2)	19	41.7 (26.8–58.2)	
інші	11	10	92.0 (52.7–99.2)	1	8.0 (0.8–47.3)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	377	290	73.4 (67.4–78.6)	87	26.6 (21.4–32.6)	0.1393
стимулятори	90	55	62.9 (51.9–72.7)	35	37.1 (27.3–48.1)	
інші	5	4	82.6 (20.2–98.9)	1	17.4 (1.1–79.8)	

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	502	120	22.6 (18.6–27.3)	215	44.1 (39.0–49.4)	108	20.8 (17.1–25.1)	59	12.4 (9.5–16.2)	1.0000
Стать										
чоловік	409	106	25.4 (20.7–30.7)	178	44.3 (38.6–50.3)	77	17.6 (13.8–22.1)	48	12.7 (9.4–17.0)	0.0040
жінка	93	14	11.1 (5.7–20.6)	37	43.1 (32.0–55.0)	31	34.5 (24.4–46.2)	11	11.2 (5.6–21.1)	
Вікова категорія 4										
<25	20	3	13.6 (4.0–37.5)	8	44.9 (22.9–69.1)	4	12.7 (4.0–33.8)	5	28.9 (11.7–55.3)	0.4268
25-34	114	25	22.4 (15.0–32.1)	53	44.0 (34.2–54.3)	24	21.9 (14.6–31.5)	12	11.7 (6.3–20.6)	
35-44	248	56	22.0 (16.1–29.3)	115	47.5 (39.8–55.4)	48	19.1 (14.0–25.5)	29	11.4 (7.6–16.7)	

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
45+	120	36	26.4 (18.5–36.1)	39	36.6 (27.0–47.5)	32	25.3 (17.6–34.9)	13	11.7 (6.4–20.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	57	13	21.5 (12.5–34.5)	24	44.9 (31.5–59.0)	12	17.9 (10.0–29.9)	8	15.7 (7.7–29.5)	0.9849
3-5	46	8	22.6 (11.4–39.8)	22	42.9 (28.6–58.6)	12	25.0 (13.8–40.9)	4	9.5 (3.4–23.5)	
6-10	58	12	19.6 (10.7–33.1)	27	49.9 (35.0–64.8)	12	17.9 (9.5–31.4)	7	12.6 (5.8–25.0)	
≥11	341	87	23.6 (18.4–29.6)	142	42.9 (36.5–49.6)	72	21.4 (16.7–26.9)	40	12.2 (8.6–16.9)	
Партнерський статус										
живе сам	339	82	22.4 (17.7–27.8)	146	45.4 (39.1–51.9)	67	18.2 (14.0–23.3)	44	14.0 (10.2–18.9)	0.2259
живе з партнером	163	38	23.2 (16.0–32.5)	69	41.4 (32.9–50.4)	41	26.3 (19.3–34.7)	15	9.1 (5.1–15.7)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	115	34	26.5 (18.3–36.7)	43	40.5 (30.2–51.7)	25	21.4 (14.1–31.2)	13	11.6 (6.4–20.0)	0.0712
неповний робочий день або тимчасово	213	52	23.6 (17.7–30.8)	108	50.1 (42.1–58.1)	35	15.9 (11.1–22.3)	18	10.4 (6.4–16.3)	
безробітний	124	22	14.5 (9.1–22.4)	47	42.3 (32.7–52.7)	34	25.9 (18.2–35.4)	21	17.2 (10.8–26.4)	
інвалідність	26	6	21.2 (7.1–48.8)	13	51.2 (27.2–74.7)	4	16.9 (5.2–42.9)	3	10.7 (2.3–37.7)	
інші	24	6	38.1 (14.3–69.6)	4	13.2 (4.0–35.6)	10	37.6 (17.0–63.9)	4	11.0 (3.1–32.2)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	78	15	17.9 (9.9–30.2)	42	54.6 (40.9–67.6)	11	14.5 (7.1–27.3)	10	12.9 (6.5–24.3)	0.7430
3-10 тис	165	43	22.4 (15.9–30.5)	71	44.5 (35.3–54.1)	36	21.8 (15.2–30.1)	15	11.3 (6.5–18.9)	
10-20 тис	144	37	27.0 (19.5–36.1)	59	43.0 (33.9–52.6)	32	19.3 (13.4–26.9)	16	10.7 (6.3–17.8)	
≥20 тис	39	13	35.5 (18.0–57.9)	16	37.3 (21.5–56.5)	5	14.5 (5.4–33.2)	5	12.8 (4.7–30.3)	
Був позбавлений волі будь-коли										

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	323	73	22.7 (17.8–28.6)	141	44.4 (38.2–50.8)	66	18.9 (14.6–24.0)	43	14.0 (10.2–18.9)	0.4043
так	179	47	22.4 (16.0–30.5)	74	43.5 (34.5–53.0)	42	24.8 (18.0–33.2)	16	9.2 (5.3–15.6)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	502	120	22.6 (18.6–27.3)	215	44.1 (39.0–49.4)	108	20.8 (17.1–25.1)	59	12.4 (9.5–16.2)	1.0000
Стать										
чоловік	409	106	25.4 (20.7–30.7)	178	44.3 (38.6–50.3)	77	17.6 (13.8–22.1)	48	12.7 (9.4–17.0)	0.0040
жінка	93	14	11.1 (5.7–20.6)	37	43.1 (32.0–55.0)	31	34.5 (24.4–46.2)	11	11.2 (5.6–21.1)	
Вікова категорія 4										
<25	20	3	13.6 (4.0–37.5)	8	44.9 (22.9–69.1)	4	12.7 (4.0–33.8)	5	28.9 (11.7–55.3)	0.4268
25-34	114	25	22.4 (15.0–32.1)	53	44.0 (34.2–54.3)	24	21.9 (14.6–31.5)	12	11.7 (6.3–20.6)	
35-44	248	56	22.0 (16.1–29.3)	115	47.5 (39.8–55.4)	48	19.1 (14.0–25.5)	29	11.4 (7.6–16.7)	
45+	120	36	26.4 (18.5–36.1)	39	36.6 (27.0–47.5)	32	25.3 (17.6–34.9)	13	11.7 (6.4–20.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	57	13	21.5 (12.5–34.5)	24	44.9 (31.5–59.0)	12	17.9 (10.0–29.9)	8	15.7 (7.7–29.5)	0.9849
3-5	46	8	22.6 (11.4–39.8)	22	42.9 (28.6–58.6)	12	25.0 (13.8–40.9)	4	9.5 (3.4–23.5)	
6-10	58	12	19.6 (10.7–33.1)	27	49.9 (35.0–64.8)	12	17.9 (9.5–31.4)	7	12.6 (5.8–25.0)	
≥11	341	87	23.6 (18.4–29.6)	142	42.9 (36.5–49.6)	72	21.4 (16.7–26.9)	40	12.2 (8.6–16.9)	
Партнерський статус										

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	339	82	22.4 (17.7–27.8)	146	45.4 (39.1–51.9)	67	18.2 (14.0–23.3)	44	14.0 (10.2–18.9)	0.2259
живе з партнером	163	38	23.2 (16.0–32.5)	69	41.4 (32.9–50.4)	41	26.3 (19.3–34.7)	15	9.1 (5.1–15.7)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	115	34	26.5 (18.3–36.7)	43	40.5 (30.2–51.7)	25	21.4 (14.1–31.2)	13	11.6 (6.4–20.0)	0.0712
неповний робочий день або тимчасово	213	52	23.6 (17.7–30.8)	108	50.1 (42.1–58.1)	35	15.9 (11.1–22.3)	18	10.4 (6.4–16.3)	
безробітний	124	22	14.5 (9.1–22.4)	47	42.3 (32.7–52.7)	34	25.9 (18.2–35.4)	21	17.2 (10.8–26.4)	
інвалідність	26	6	21.2 (7.1–48.8)	13	51.2 (27.2–74.7)	4	16.9 (5.2–42.9)	3	10.7 (2.3–37.7)	
інші	24	6	38.1 (14.3–69.6)	4	13.2 (4.0–35.6)	10	37.6 (17.0–63.9)	4	11.0 (3.1–32.2)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	78	15	17.9 (9.9–30.2)	42	54.6 (40.9–67.6)	11	14.5 (7.1–27.3)	10	12.9 (6.5–24.3)	0.7430
3-10 тис	165	43	22.4 (15.9–30.5)	71	44.5 (35.3–54.1)	36	21.8 (15.2–30.1)	15	11.3 (6.5–18.9)	
10-20 тис	144	37	27.0 (19.5–36.1)	59	43.0 (33.9–52.6)	32	19.3 (13.4–26.9)	16	10.7 (6.3–17.8)	
≥20 тис	39	13	35.5 (18.0–57.9)	16	37.3 (21.5–56.5)	5	14.5 (5.4–33.2)	5	12.8 (4.7–30.3)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	323	73	22.7 (17.8–28.6)	141	44.4 (38.2–50.8)	66	18.9 (14.6–24.0)	43	14.0 (10.2–18.9)	0.4043
так	179	47	22.4 (16.0–30.5)	74	43.5 (34.5–53.0)	42	24.8 (18.0–33.2)	16	9.2 (5.3–15.6)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Разом	502	153	29.4 (24.7–34.5)	251	51.0 (45.8–56.2)	81	16.2 (12.8–20.3)	17	3.4 (2.0–5.7)	1.0000
Стать										
чоловік	409	134	31.9 (26.6–37.7)	198	49.4 (43.6–55.2)	63	15.0 (11.5–19.4)	14	3.7 (2.1–6.4)	0.0886
жінка	93	19	18.7 (11.2–29.6)	53	57.7 (45.8–68.8)	18	21.5 (13.1–33.2)	3	2.1 (0.5–7.9)	
Вікова категорія 4										
<25	20	5	25.2 (9.9–50.8)	11	52.5 (29.0–74.9)	3	18.2 (5.5–45.7)	1	4.1 (0.5–27.0)	0.2966
25-34	114	24	18.4 (12.0–27.1)	70	62.7 (52.3–71.9)	18	16.9 (10.3–26.5)	2	2.1 (0.5–8.2)	
35-44	248	78	33.1 (25.8–41.3)	117	45.9 (38.3–53.7)	44	17.3 (12.4–23.6)	9	3.7 (1.8–7.6)	
45+	120	46	34.3 (25.3–44.6)	53	49.0 (38.7–59.3)	16	12.8 (7.6–20.6)	5	4.0 (1.5–10.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	57	18	30.3 (19.4–44.1)	22	40.3 (27.5–54.5)	13	23.9 (13.7–38.3)	4	5.5 (1.9–15.0)	0.7808
3-5	46	10	27.0 (14.8–44.0)	29	56.3 (40.3–71.1)	6	14.4 (6.3–29.3)	1	2.3 (0.3–15.4)	
6-10	58	14	25.9 (13.7–43.4)	33	55.1 (39.6–69.7)	8	13.9 (6.4–27.7)	3	5.1 (1.6–15.4)	
≥11	341	111	30.3 (24.5–36.9)	167	51.6 (45.0–58.1)	54	15.3 (11.4–20.3)	9	2.8 (1.3–5.7)	
Партнерський статус										
живе сам	339	107	30.4 (24.8–36.8)	168	50.4 (44.0–56.7)	53	15.8 (11.8–20.8)	11	3.4 (1.8–6.3)	0.9250
живе з партнером	163	46	27.1 (19.6–36.3)	83	52.3 (43.2–61.2)	28	17.2 (11.5–24.9)	6	3.5 (1.4–8.2)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	115	33	24.7 (16.9–34.6)	59	55.1 (44.4–65.4)	17	14.8 (8.8–23.8)	6	5.3 (2.2–12.2)	0.3450

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
неповний робочий день або тимчасово	213	66	31.3 (24.0–39.6)	113	52.1 (44.0–60.0)	29	14.3 (9.6–20.8)	5	2.3 (0.9–5.9)	
безробітний	124	37	27.8 (19.7–37.6)	59	50.2 (40.2–60.2)	26	20.0 (13.2–29.2)	2	2.0 (0.5–7.9)	
інвалідність	26	10	33.0 (13.9–59.9)	10	36.0 (16.3–61.8)	4	15.9 (4.7–42.2)	2	15.1 (3.6–45.8)	
інші	24	7	41.3 (16.8–70.9)	10	35.0 (15.7–60.9)	5	20.8 (7.2–47.0)	2	2.9 (0.6–12.6)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	78	26	30.3 (19.5–43.8)	38	55.1 (41.5–68.0)	12	11.0 (5.4–21.0)	2	3.6 (0.9–13.7)	0.5599
3-10 тис	165	56	31.4 (22.9–41.2)	83	51.2 (41.8–60.5)	24	16.1 (10.3–24.3)	2	1.3 (0.3–5.4)	
10-20 тис	144	36	26.6 (19.2–35.6)	76	51.3 (42.0–60.6)	23	16.0 (10.4–23.6)	9	6.1 (3.0–12.0)	
≥20 тис	39	14	37.3 (19.5–59.3)	20	50.6 (31.4–69.6)	4	11.6 (4.0–29.0)	1	0.5 (0.1–3.9)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	323	93	28.7 (23.1–35.0)	162	50.2 (43.9–56.5)	58	17.8 (13.5–23.1)	10	3.3 (1.7–6.2)	0.6904
так	179	60	30.8 (22.9–40.1)	89	52.5 (43.3–61.5)	23	13.0 (8.2–19.9)	7	3.7 (1.6–8.5)	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	303	87	29.4 (23.7–35.9)	150	50.2 (43.8–56.5)	56	17.3 (13.1–22.4)	10	3.1 (1.6–5.8)	0.7796
так	192	64	30.0 (22.8–38.3)	96	51.6 (42.9–60.3)	25	13.9 (8.8–21.3)	7	4.5 (1.9–10.1)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	341	90	28.0 (22.8–33.7)	179	51.8 (46.0–57.6)	60	16.9 (13.1–21.5)	12	3.3 (1.9–5.8)	0.1037

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	155	60	39.0 (31.2–47.5)	70	45.7 (37.4–54.2)	21	12.9 (8.3–19.5)	4	2.4 (0.9–6.3)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	83	36	41.7 (27.1–58.0)	32	42.3 (28.3–57.7)	13	13.0 (6.2–25.5)	2	2.9 (0.6–13.5)	0.2862
негативний	419	117	27.8 (23.0–33.2)	219	52.1 (46.5–57.6)	68	16.6 (13.0–21.1)	15	3.5 (2.0–5.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	354	113	29.3 (23.6–35.7)	176	52.7 (46.2–59.1)	52	14.4 (10.6–19.2)	13	3.6 (2.0–6.6)	0.2537
стимулятори	82	22	25.2 (16.7–36.0)	39	45.9 (34.8–57.5)	19	25.9 (16.7–38.0)	2	3.0 (0.7–11.4)	
опі+стимул	54	16	39.4 (24.9–56.1)	28	45.4 (30.9–60.7)	8	11.4 (5.1–23.6)	2	3.8 (0.9–14.4)	
інші	12	2	13.1 (2.6–46.2)	8	73.7 (41.1–91.9)	2	13.1 (2.6–46.2)	0	0.0	
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання										
опіоїди	393	122	29.3 (23.9–35.4)	195	52.1 (46.0–58.2)	62	15.0 (11.4–19.5)	14	3.5 (2.0–6.2)	0.7337
стимулятори	92	26	28.8 (20.0–39.7)	46	46.1 (35.6–56.9)	17	21.4 (13.4–32.4)	3	3.7 (1.2–11.1)	
інші	6	2	43.4 (7.2–88.5)	4	56.6 (11.5–92.8)	0	0.0	0	0.0	

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	27	4.5	(2.9–6.9)
збут наркотиків	11	1.9	(1.0–3.7)
зберігання наркотиків	24	4.8	(3.0–7.5)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	25	4.4	(2.8–6.8)
збут наркотиків	7	1.3	(0.5–3.0)
зберігання наркотиків	15	2.6	(1.4–4.6)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	390	75.5	(70.4–79.9)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	179	32.6	(27.9–37.7)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	16	9.0	(5.2–15.1)
6м-2р	31	14.5	(9.5–21.6)
2-4р	60	33.8	(25.8–42.8)
4 роки +	67	42.7	(33.6–52.3)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	25	15.3	(9.9–22.8)

	n	%	ДІ
1-3р	23	16.3	(10.5–24.5)
3-5р	21	12.4	(7.6–19.5)
5-10р	36	22.2	(14.4–32.5)
10 років +	68	33.8	(26.0–42.6)
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	105	61.6	(52.6–69.9)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	288	57.8	(52.6–62.8)
так, за останні 6м	97	19.3	(15.5–23.8)
так, але 6+ місяців тому	111	22.9	(18.9–27.5)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	231	47.9	(42.8–53.2)
так, за останні 6м	128	24.7	(20.6–29.4)
так, але 6+ місяців тому	142	27.3	(23.1–32.0)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	430	86.7	(83.0–89.7)
так, за останні 6м	26	5.0	(3.2–7.6)
так, але 6+ місяців тому	45	8.3	(6.0–11.5)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	356	72.4	(67.6–76.8)
так	139	27.6	(23.2–32.4)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	247	49.9	(44.7–55.1)
так	254	50.1	(44.9–55.3)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			

		n	%	ДІ
	ні	166	63.2	(55.9–69.9)
	так	88	36.8	(30.1–44.1)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців				
	ні	313	61.3	(56.1–66.3)
	так	183	38.7	(33.7–43.9)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

		Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	495	139	27.6 (23.2–32.4)	1.0000	254	88	36.8 (30.1–44.1)	1.0000
Стать									
	чоловік	403	120	29.6 (24.6–35.1)	0.0645	209	73	37.4 (29.9–45.6)	0.7290
	жінка	92	19	19.0 (11.7–29.4)		45	15	34.2 (20.1–51.8)	
Вікова категорія 4									
	<25	20	7	27.8 (11.9–52.2)	0.0057	10	6	52.1 (21.3–81.4)	0.2825
	25-34	111	31	25.8 (17.9–35.6)		52	25	46.9 (32.5–61.8)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
35-44	245	82	34.7 (27.7–42.4)		138	41	32.9 (24.0–43.3)	
45+	119	19	14.3 (8.5–23.0)		54	16	31.3 (18.7–47.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	56	17	28.3 (17.7–41.9)	0.3285	27	12	44.4 (26.0–64.5)	0.1123
3-5	45	13	23.6 (13.2–38.6)		26	15	57.8 (37.2–76.0)	
6-10	56	9	17.4 (8.4–32.7)		27	11	31.8 (16.2–53.0)	
≥11	338	100	30.2 (24.5–36.6)		174	50	32.0 (24.0–41.3)	
Партнерський статус								
живе сам	333	95	28.5 (23.1–34.7)	0.5441	174	60	36.9 (28.8–45.9)	0.9657
живе з партнером	162	44	25.6 (18.9–33.7)		80	28	36.6 (25.2–49.7)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	113	26	22.9 (15.3–32.9)	0.6814	52	19	40.5 (26.4–56.5)	0.8768
неповний робочий день або тимчасово	209	60	28.9 (22.0–36.8)		110	39	37.3 (27.2–48.7)	
безробітний	124	43	31.3 (22.9–41.1)		69	22	36.5 (24.5–50.5)	
інвалідність	25	5	21.4 (7.5–47.9)		12	4	24.6 (6.9–59.0)	
інші	24	5	23.5 (8.7–49.8)		11	4	26.4 (7.1–63.0)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	77	25	29.4 (18.5–43.2)	0.9921	47	12	31.7 (17.2–51.1)	0.7573
3-10 тис	164	45	27.9 (20.2–37.2)		76	26	37.4 (24.8–51.9)	
10-20 тис	144	41	27.4 (20.1–36.2)		69	31	43.6 (31.4–56.7)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
≥20 тис	36	9	26.5 (13.1–46.3)		23	10	42.2 (20.7–67.1)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	319	99	30.5 (24.9–36.6)	0.0604	150	57	38.5 (29.9–47.9)	0.5449
так	176	40	21.4 (15.1–29.3)		104	31	34.0 (23.6–46.1)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	299	78	26.5 (21.2–32.5)	0.2993	144	57	37.1 (28.8–46.3)	0.7825
так	189	60	31.6 (24.1–40.2)		107	29	35.0 (24.2–47.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	337	97	27.8 (22.9–33.2)	0.7267	164	69	39.5 (31.8–47.9)	0.0052
так	152	42	29.5 (22.3–37.8)		87	19	21.3 (13.7–31.7)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	82	21	26.3 (15.9–40.2)	0.8298	48	12	33.2 (17.0–54.7)	0.6992
негативний	413	118	27.7 (23.0–32.9)		206	76	37.4 (30.2–45.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	350	95	27.2 (22.0–33.1)	0.4886	175	52	30.7 (23.1–39.6)	0.1839
стимулятори	82	21	23.3 (15.1–34.2)		43	18	41.8 (27.3–57.9)	
опі+стимул	52	19	36.1 (22.1–52.9)		33	16	50.3 (31.1–69.5)	
інші	11	4	26.7 (7.8–61.3)		3	2	51.2 (5.9–94.6)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	388	113	29.5 (24.3–35.3)	0.0875	196	63	34.7 (26.9–43.4)	0.5748
стимулятори	91	21	21.9 (14.3–32.0)		52	22	42.7 (29.3–57.3)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
інші	6	1	4.5 (0.3–44.6)		4	2	32.1 (3.0–88.0)	

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	72	14.9	(11.4–19.1)
так, з інших причин	9	2.2	(1.1–4.3)
ні	420	83.0	(78.6–86.6)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	1	1.8	(0.3–11.9)
інша країна	0	0.0	
інша область	63	86.8	(75.9–93.2)
інше місто	6	8.8	(3.9–18.7)
інший район	1	1.4	(0.2–9.5)
інший будинок	1	1.2	(0.2–8.2)
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			
та сама область	14	18.5	(10.8–29.8)
інша область	65	81.5	(70.2–89.2)
інша країна	0	0.0	



Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)




Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)

Результати для міста: Харків




Рис. A. Мережа рекрутингу RDS у місті Харків

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	500	39.6	(38.7–40.5)	40	(35–45)
Вік першого неін'єкційного вживання наркотиків	481	16.7	(16.4–17.1)	16	(14–18)
Років з початку неін'єкційного вживання наркотиків	481	23.0	(22.1–24.0)	23	(18–29)
Вік першого ін'єкційного вживання наркотиків	500	20.6	(20.1–21.1)	19	(17–24)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків	500	18.9	(18.0–19.9)	19	(12–25)
Особистий місячний дохід, грн	453	8,696.0	(7985.6–9406.5)	7,000	(4000–12000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

	Сайт	n	%	ДІ
Стать				
чоловік	Харків	435	87.9	(84.5–90.7)
жінка	Харків	65	12.1	(9.3–15.5)
Вікова категорія 4				
<25	Харків	25	6.1	(3.8–9.4)
25-34	Харків	95	18.9	(15.4–22.9)
35-44	Харків	253	49.4	(44.5–54.3)
45+	Харків	127	25.6	(21.5–30.2)
Сімейний стан				
одружений або проживають разом	Харків	90	16.9	(13.7–20.7)
одружений, але має іншого партнера	Харків	13	3.1	(1.6–5.8)
не одружений, але є партнер	Харків	175	37.2	(32.5–42.1)
одружений, але не живуть разом	Харків	23	3.8	(2.5–5.7)
не одружений та не мають партнера	Харків	199	39.1	(34.5–43.9)
Партнерський статус				
живе сам	Харків	222	42.8	(38.1–47.7)
живе з партнером	Харків	278	57.2	(52.3–61.9)
Освіта 3 категорії				
незак. середня школа	Харків	66	13.5	(10.5–17.1)
середня школа	Харків	216	42.2	(37.5–47.1)
> середня школа	Харків	218	44.3	(39.5–49.3)
Поточна професія				
учень школи	Харків	0	0.0	
студент коледжу/університету	Харків	1	0.2	(0.0–1.8)
постійна робота	Харків	94	18.5	(15.0–22.4)
непостійна робота	Харків	273	53.1	(48.2–58.0)
безробітний	Харків	104	22.1	(18.2–26.6)
домогосподарка	Харків	8	2.0	(0.8–4.6)
інвалідність	Харків	10	2.4	(1.1–5.1)
військовий	Харків	4	0.9	(0.3–2.3)
інші	Харків	5	0.8	(0.3–1.9)
Безхатченко				
ніколи	Харків	452	89.7	(86.0–92.5)
так, 12м+ тому	Харків	48	10.3	(7.5–14.0)

	Сайт	n	%	ДІ
так, за останні 12м	Харків	0	0.0	
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Харків	48	100.0	
так	Харків	0	0.0	
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Харків	70	16.5	(12.8–21.0)
3-10 тис	Харків	203	44.9	(39.9–50.1)
10-20 тис	Харків	140	29.7	(25.3–34.5)
≥20 тис	Харків	40	8.9	(6.3–12.4)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Харків	68	15.9	(12.3–20.3)
≥2684	Харків	385	84.1	(79.7–87.7)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Харків	18	4.4	(2.5–7.6)
3-5	Харків	24	4.7	(3.1–7.2)
6-10	Харків	53	10.8	(8.2–14.3)
≥11	Харків	405	80.1	(75.7–83.8)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Сайт	n	%	ДІ
власне житло	Харків	289	57.5	(52.6–62.3)
у друзів або родичів	Харків	166	33.1	(28.7–37.8)
оренда	Харків	47	10.1	(7.4–13.7)
різне	Харків	8	1.5	(0.7–2.9)
на вулиці (безхатько)	Харків	0	0.0	
у притулку для біженців	Харків	8	1.4	(0.7–2.9)




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Всього								
	Разом	500	449	89.5 (85.9–92.2)	18	3.9 (2.3–6.6)	33	6.6 (4.5–9.6)
Стать								
	чоловік	435	394	89.8 (85.9–92.8)	12	3.4 (1.8–6.5)	29	6.8 (4.5–10.1)
	жінка	65	55	86.9 (76.5–93.1)	6	7.4 (3.2–16.2)	4	5.7 (2.1–14.8)
Вікова категорія 4								

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
	N		опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
<25	25	20	72.6 (44.0–90.0)	3	17.1 (4.0–50.3)	2	10.2 (2.3–35.6)
25-34	95	79	84.9 (76.3–90.8)	6	5.3 (2.3–11.8)	10	9.8 (5.2–17.6)
35-44	253	229	91.0 (86.6–94.1)	8	3.3 (1.6–6.7)	16	5.7 (3.4–9.4)
45+	127	121	93.8 (84.1–97.7)	1	1.0 (0.1–6.7)	5	5.3 (1.7–15.3)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
≤2	18	15	75.7 (37.4–94.2)	3	24.3 (5.8–62.6)	0	0.0
3-5	24	16	66.7 (43.1–84.0)	5	16.2 (6.1–36.7)	3	17.1 (5.2–44.0)
6-10	53	45	87.0 (75.1–93.7)	3	5.4 (1.7–16.3)	5	7.6 (3.0–17.7)
≥11	405	373	91.9 (88.2–94.5)	7	1.9 (0.8–4.0)	25	6.2 (4.0–9.7)
Партнерський статус							
живе сам	222	190	86.0 (80.0–90.4)	11	5.8 (2.8–11.5)	21	8.2 (5.3–12.6)
живе з партнером	278	259	92.1 (87.1–95.2)	7	2.5 (1.1–5.4)	12	5.4 (2.8–10.2)
Поточний статус зайнятості							
повний робочий день	94	89	95.5 (89.3–98.2)	4	3.5 (1.3–9.2)	1	1.0 (0.1–7.1)
неповний робочий день або тимчасово	273	241	87.3 (81.9–91.3)	8	4.0 (1.7–9.0)	24	8.7 (5.7–13.0)
безробітний	104	96	91.6 (81.1–96.5)	1	0.7 (0.1–4.9)	7	7.8 (3.0–18.4)
інвалідність	10	10	100.0	0	0.0	0	0.0
інші	18	12	71.3 (44.1–88.7)	5	25.4 (9.3–52.9)	1	3.3 (0.4–23.3)
Категорія місячного доходу							
<3 тис	70	65	90.9 (75.0–97.1)	1	1.0 (0.1–7.2)	4	8.0 (2.3–24.8)
3-10 тис	203	178	87.4 (80.9–91.9)	8	4.7 (2.0–10.9)	17	7.9 (4.8–12.9)
10-20 тис	140	128	91.1 (84.3–95.1)	7	5.7 (2.6–12.0)	5	3.3 (1.3–8.0)
≥20 тис	40	36	91.0 (77.3–96.8)	2	4.3 (1.0–16.5)	2	4.7 (1.1–17.9)
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	329	289	87.5 (82.8–91.0)	18	6.1 (3.5–10.2)	22	6.5 (4.2–9.9)
так	169	158	93.0 (86.2–96.6)	0	0.0	11	7.0 (3.4–13.8)

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії					
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	264	233	88.3 (82.7–92.2)	16	6.3 (3.5–11.0)	15	5.4 (2.9–9.8)
так	231	211	90.8 (85.8–94.1)	2	0.9 (0.2–3.8)	18	8.3 (5.1–13.1)
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	429	383	89.4 (85.7–92.3)	18	4.5 (2.6–7.6)	28	6.1 (4.1–8.9)
так	63	59	94.3 (85.1–97.9)	0	0.0	4	5.7 (2.1–14.9)
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	77	66	82.1 (67.7–90.9)	3	7.9 (2.0–26.3)	8	10.0 (4.9–19.3)
негативний	423	383	90.7 (87.0–93.4)	15	3.3 (1.9–5.5)	25	6.1 (3.9–9.4)
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання							
опіоїди	475	443	93.1 (89.9–95.3)	3	0.5 (0.2–1.7)	29	6.4 (4.3–9.5)
стимулятори	23	4	13.5 (4.5–34.3)	15	74.9 (52.6–88.9)	4	11.6 (3.8–30.3)
інші	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Частота ін'єкцій: останні 24 години								
0 разів	12	2.9	2	14.3	0	0.0	0	
1 раз	296	65.4	12	64.2	15	49.5	0	
2-3 рази	131	29.2	3	15.1	17	47.7	0	
4+ рази	10	2.5	1	6.4	1	2.8	0	
N	449		18		33		0	
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)								
1 раз	296	67.4	12	75.0	15	49.5	0	
2-3 рази	131	30.0	3	17.6	17	47.7	0	
4+ рази	10	2.6	1	7.4	1	2.8	0	
N	437		16		33		0	
Частота ін'єкцій: останній тиждень								
0 разів	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
1-6 разів	140	33.1	13	77.1	11	30.3	0	
кожен день	309	66.9	5	22.9	22	69.7	0	
N	449		18		33		0	
Частота ін'єкцій: останні 30 днів								
1-9 разів	30	6.5	2	23.3	4	14.1	0	

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші	
	n	%	n	%	n	%	n	%
10-19 разів	62	14.2	7	33.9	1	2.8	0	
20-29 разів	90	21.1	5	23.8	11	27.6	0	
кожен день	267	58.2	4	19.0	17	55.5	0	
N	449		18		33		0	
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів								
0-9 разів	13	3.4	2	23.3	1	5.6	0	
10-19 разів	65	14.9	6	24.4	5	12.7	0	
20-29 разів	82	18.9	5	29.4	11	29.0	0	
кожен день	288	62.8	5	22.9	16	52.7	0	
N	448		18		33		0	

Таблиця 2.4. Ін'єкційний вид наркотику на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	66	16.7	2	6.7	2	100.0
3-10 тис	190	44.4	13	58.8	0	0.0
10-20 тис	133	29.7	7	31.2	0	0.0
≥20 тис	39	9.2	1	3.3	0	0.0
N	428		23		2	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
Разом		опіоїди		стимулятори		інші		
n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
готую сам								
118	22.6	114	22.9	2	11.0	2	100.0	0.0398
приготовлене друзями								
55	10.8	51	10.8	4	12.7	0	0.0	0.8492
від дилера								
145	29.5	140	30.3	5	15.5	0	0.0	0.1621
куплене в Інтернеті								
289	58.0	273	57.3	15	72.1	1	54.3	0.3310
з аптеки								
2	0.3	1	0.1	0	0.0	1	54.3	0.0000
з програми ЗПТ								
12	2.2	12	2.3	0	0.0	0	0.0	0.7228
інше								
2	0.5	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0.9293
N								
623		593		26		4		




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін'єкції використовував чистий шприц			
так	487	97.6	(95.6–98.7)
Джерело шприца для останньої ін'єкції			
купив в аптеці	303	63.4	(58.7–67.8)
отримав в аптеці	2	0.3	(0.1–1.1)
отримав від НУО	182	33.9	(29.6–38.5)
отримав від друга	9	1.7	(0.9–3.4)
отримав вживаний від друга	0	0.0	
використовував вживаний свій	2	0.3	(0.1–1.4)
отримав заповнений	2	0.3	(0.1–1.4)
інші	0	0.0	
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	12	2.2	(1.2–4.1)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	42	8.2	(5.9–11.3)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	161	31.4	(27.1–36.1)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	137	25.8	(21.8–30.2)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	264	51.0	(46.2–55.9)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	23	4.7	(2.9–7.5)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	233	44.1	(39.4–49.0)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	0	0.0	
часто	0	0.0	
половина	2	13.5	(3.2–42.5)
іноді	3	20.8	(6.3–50.6)
рідко	3	29.8	(9.1–64.5)
ніколи	4	35.8	(12.8–67.9)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	57	10.8	(8.2–14.2)
часто	62	12.2	(9.4–15.8)
половина	51	10.3	(7.7–13.8)
іноді	72	15.3	(12.1–19.2)
рідко	133	27.1	(22.9–31.8)
ніколи	114	24.1	(20.1–28.6)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			
1-9	182	72.2	(65.9–77.7)
10-29	69	25.6	(20.3–31.7)
30+	7	2.2	(1.1–4.7)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	10	3.9	(2.0–7.4)
2-3	167	64.5	(58.0–70.5)
4-9	59	23.0	(17.8–29.1)
10+	25	8.6	(5.8–12.6)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	6	13.6	(6.0–28.0)
від друзів	24	59.9	(43.0–74.8)
із закладки	11	26.4	(14.5–43.2)
Хтось використав один шприц для ін’єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	420	85.2	(81.5–88.2)
так	78	14.8	(11.8–18.5)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін’єкцій (%)



Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	499	12	2.2 (1.2–4.1)	1.0000	500	42	8.2 (5.9–11.3)	1.0000
Стать									
	чоловік	434	8	1.8 (0.8–3.9)	0.0778	435	34	7.6 (5.2–10.8)	0.1883
	жінка	65	4	5.3 (1.9–13.8)		65	8	12.9 (6.1–25.0)	
Вікова категорія 4									

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<25	25	1	2.5 (0.3–17.7)	0.9414	25	5	12.6 (4.6–30.0)	0.2437
25-34	95	3	2.5 (0.8–7.6)		95	13	12.7 (7.2–21.4)	
35-44	252	5	1.9 (0.7–4.9)		253	15	7.1 (4.0–12.3)	
45+	127	3	2.8 (0.8–9.1)		127	9	6.1 (3.1–11.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	18	1	3.5 (0.4–24.6)	0.8422	18	5	17.3 (5.9–40.8)	0.2258
3-5	24	0	0.0		24	3	14.6 (4.0–40.8)	
6-10	53	1	1.7 (0.2–11.9)		53	7	10.7 (4.9–21.6)	
≥11	404	10	2.4 (1.2–4.7)		405	27	7.0 (4.6–10.5)	
Партнерський статус								
живе сам	221	1	0.4 (0.1–3.1)	0.0168	222	15	6.2 (3.6–10.4)	0.1831
живе з партнером	278	11	3.6 (1.9–6.8)		278	27	9.7 (6.4–14.5)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	94	4	4.5 (1.5–12.6)	0.5642	94	4	3.9 (1.4–10.4)	0.3573
неповний робочий день або тимчасово	273	5	1.7 (0.6–4.6)		273	26	10.3 (6.7–15.4)	
безробітний	104	2	1.5 (0.4–6.1)		104	10	8.0 (4.2–14.7)	
інвалідність	10	0	0.0		10	0	0.0	
інші	17	1	4.1 (0.5–27.6)		18	2	7.2 (1.5–28.1)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	69	0	0.0	0.2581	70	5	5.7 (2.2–13.8)	0.5972
3-10 тис	203	6	3.3 (1.3–7.8)		203	21	9.7 (6.2–14.9)	
10-20 тис	140	2	1.1 (0.3–4.5)		140	5	5.8 (2.0–15.4)	
≥20 тис	40	2	3.5 (0.8–13.9)		40	4	8.5 (3.0–21.8)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	328	9	2.7 (1.3–5.6)	0.3195	329	33	10.4 (7.2–14.9)	0.0144
так	169	3	1.4 (0.4–4.3)		169	9	4.2 (2.1–8.1)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	264	8	2.7 (1.3–5.5)	0.5310	264	24	8.8 (5.6–13.6)	0.6312
так	230	4	1.7 (0.6–5.3)		231	18	7.5 (4.7–12.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	428	12	2.6 (1.4–4.8)	0.2351	429	41	9.3 (6.7–12.9)	0.0180
так	63	0	0.0		63	1	1.3 (0.2–9.0)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	77	0	0.0	0.1974	77	2	2.3 (0.5–9.1)	0.0347
негативний	422	12	2.6 (1.4–4.8)		423	40	9.2 (6.5–12.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	449	10	1.9 (1.0–3.7)		449	35	7.7 (5.4–11.0)	
стимулятори	17	1	5.0 (0.6–32.3)		18	4	15.9 (5.1–39.9)	
опі+стимул	33	1	5.6 (0.7–32.2)		33	3	10.4 (2.9–31.1)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	475	11	2.2 (1.1–4.1)	0.7613	475	37	7.8 (5.5–11.0)	0.2542
стимулятори	22	1	4.3 (0.5–27.7)		23	5	16.4 (6.1–37.3)	
інші	2	0	0.0		2	0	0.0	

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		n	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Всього								
	Разом	161	31.4 (27.1–36.1)	1.0000	500	137	25.8 (21.8–30.2)	1.0000
Стать								
	чоловік	137	30.5 (26.0–35.5)	0.2869	435	108	23.5 (19.4–28.1)	0.0027
	жінка	24	37.7 (25.8–51.4)		65	29	42.5 (30.1–56.0)	

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4							
<25	7	20.5 (8.8–40.9)	0.3304	25	7	20.5 (8.8–40.9)	0.0007
25-34	33	35.9 (25.9–47.3)		95	40	41.3 (30.9–52.4)	
35-44	84	33.3 (27.2–39.9)		253	67	25.8 (20.4–32.2)	
45+	37	27.0 (19.2–36.6)		127	23	15.5 (10.1–23.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
≤2	4	15.6 (4.9–39.7)	0.3251	18	6	22.5 (8.4–47.9)	0.3179
3-5	5	25.1 (10.0–50.3)		24	10	39.8 (20.8–62.3)	
6-10	13	26.2 (14.3–43.0)		53	17	32.3 (19.4–48.5)	
≥11	139	33.3 (28.5–38.6)		405	104	24.3 (20.0–29.0)	
Партнерський статус							
живе сам	70	29.9 (23.9–36.6)	0.5603	222	56	22.6 (17.4–28.7)	0.1786
живе з партнером	91	32.5 (26.6–39.1)		278	81	28.2 (22.7–34.5)	
Поточний статус зайнятості							
повний робочий день	26	29.1 (19.6–40.8)	0.6494	94	25	26.0 (17.1–37.4)	0.6667
неповний робочий день або тимчасово	90	33.0 (27.2–39.4)		273	75	27.9 (22.4–34.2)	
безробітний	37	32.3 (23.2–43.1)		104	29	22.4 (15.4–31.5)	
інвалідність	3	19.6 (4.2–57.5)		10	2	11.8 (1.9–48.4)	
інші	4	18.4 (5.9–44.7)		18	6	24.6 (9.6–50.1)	
Категорія місячного доходу							
<3 тис	23	31.5 (20.1–45.6)	0.0958	70	23	27.4 (17.6–39.9)	0.9070
3-10 тис	70	33.2 (26.6–40.4)		203	61	28.5 (22.4–35.5)	
10-20 тис	40	28.3 (20.7–37.4)		140	36	25.1 (17.9–34.0)	
≥20 тис	20	52.3 (34.7–69.4)		40	12	30.7 (15.9–50.9)	
Був позбавлений волі будь-коли							
ні	94	29.1 (24.1–34.8)	0.1653	329	90	26.8 (21.9–32.3)	0.4938

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
	так	67	35.9 (28.2–44.5)		169	46	23.7 (17.4–31.5)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	83	30.7 (24.7–37.3)	0.6903	264	79	27.5 (21.9–33.9)	0.3243
так	77	32.5 (26.4–39.2)		231	56	23.3 (18.1–29.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	138	30.7 (26.1–35.6)	0.8290	429	126	27.6 (23.3–32.5)	0.0644
так	20	32.1 (21.1–45.5)		63	11	16.3 (8.9–28.1)	
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	25	30.4 (20.7–42.1)	0.8416	77	19	20.6 (13.0–30.9)	0.2571
негативний	136	31.6 (26.9–36.7)		423	118	26.6 (22.3–31.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
опіоїди	145	31.0 (26.5–35.9)		449	120	25.4 (21.3–30.1)	
стимулятори	5	24.7 (8.9–52.4)		18	5	18.7 (6.6–42.8)	
опі+стимул	11	40.6 (22.2–62.0)		33	12	34.5 (18.9–54.4)	
інші	0			0	0		
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання							
опіоїди	153	31.6 (27.1–36.4)	0.7219	475	127	25.6 (21.5–30.1)	0.7693
стимулятори	7	26.9 (11.5–50.9)		23	9	29.1 (13.5–52.0)	
інші	1	54.3 (0.0–100.0)		2	1	45.7 (0.0–100.0)	

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	494	98.8	(97.4–99.5)	65	100.0		429	98.7	(97.1–99.4)	0.3701
N	500			65			435			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	427	86.0	(82.2–89.1)	60	92.0	(81.7–96.8)	367	85.1	(81.0–88.5)	0.1551
N	494			65			429			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	322	65.9	(61.1–70.3)	54	81.6	(68.8–90.0)	268	63.6	(58.5–68.5)	0.0095
N	491			65			426			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	280	87.7	(83.7–90.9)	51	95.4	(86.1–98.6)	229	86.3	(81.7–90.0)	0.0477
N	325			54			271			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	53	15.2	(11.5–20.0)	4	5.9	(2.1–15.3)	49	16.9	(12.6–22.3)	0.0270
N	325			54			271			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	14	4.4	(2.6–7.4)	0	0.0		14	5.2	(3.0–8.7)	0.1185
N	324			54			270			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	1	0.2	(0.0–1.4)	1	1.3	(0.2–9.0)	0	0.0		0.0186
N	325			54			271			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										
так	267	54.7	(49.7–59.6)	27	36.0	(24.8–49.0)	240	57.3	(51.9–62.5)	0.0023
N	484			65			419			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	242	56.1	(50.8–61.4)	27	39.2	(26.9–52.9)	215	58.7	(52.9–64.3)	0.0082
N	424			60			364			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	177	54.0	(47.8–60.1)	25	40.9	(27.8–55.6)	152	56.4	(49.5–63.0)	0.0552
N	322			54			268			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	13	2.3	(1.3–4.1)	8	12.2	(5.7–24.2)	5	0.9	(0.4–2.3)	0.0000
N	493			65			428			
Надавав секс-послуги за гроші										
так	23	3.9	(2.6–5.8)	15	19.6	(11.8–31.0)	8	1.7	(0.8–3.4)	0.0000
N	494			65			429			
Платив за секс коли-небудь										
так	211	43.4	(38.6–48.4)	1	1.3	(0.2–8.7)	210	49.3	(44.0–54.6)	0.0000
N	494			65			429			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	41	22.1	(16.0–29.7)	0	0.0		41	22.1	(16.0–29.8)	0.5974
N	210			1			209			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	365	76.0	(71.6–80.0)	58	92.1	(80.3–97.1)	307	73.8	(68.9–78.2)	0.0055
випадковий	103	20.8	(17.1–25.0)	4	6.8	(2.2–18.9)	99	22.8	(18.7–27.4)	
ком. секс (я заплатив)	12	3.0	(1.6–5.8)	0	0.0		12	3.4	(1.8–6.5)	
ком. секс (мені заплатили)	1	0.1	(0.0–0.9)	1	1.1	(0.1–7.6)	0	0.0		
N	481			63			418			
З ким останнім був секс										
чоловік	64	12.1	(9.3–15.5)	63	96.9	(80.4–99.6)	1	0.2	(0.0–1.3)	
жінка	420	87.9	(84.5–90.7)	1	3.1	(0.4–19.6)	419	99.8	(98.7–100.0)	
men and women	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	484			64			420			
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	465	96.6	(94.5–97.8)	63	98.7	(91.1–99.8)	402	96.3	(94.0–97.7)	0.2672
N	483			64			419			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	23	4.7	(3.1–7.1)	3	4.7	(1.4–14.5)	20	4.7	(2.9–7.3)	0.9797
N	483			64			419			

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	111	22.8	(18.9–27.2)	9	12.2	(6.1–22.6)	102	24.2	(20.0–29.1)	0.0304
N	483			64			419			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	280	87.7	(83.7–90.9)	51	95.4	(86.1–98.6)	229	86.3	(81.7–90.0)	0.0477
N	325			54			271			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	53	15.2	(11.5–20.0)	4	5.9	(2.1–15.3)	49	16.9	(12.6–22.3)	0.0270
N	325			54			271			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	14	4.4	(2.6–7.4)	0	0.0		14	5.2	(3.0–8.7)	0.1185
N	324			54			270			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	1	0.2	(0.0–1.4)	1	1.3	(0.2–9.0)	0	0.0		0.0186
N	325			54			271			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні										
1	235	97.8	(95.3–99.0)	42	100.0		193	97.3	(94.4–98.8)	0.5183
2-4	6	1.9	(0.9–4.3)	0	0.0		6	2.3	(1.0–5.1)	
5+	1	0.3	(0.0–2.1)	0	0.0		1	0.4	(0.0–2.5)	
N	242			42			200			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові										
1	25	54.8	(39.2–69.6)	3	81.0	(29.6–97.7)	22	53.0	(36.7–68.7)	0.5618
2-4	21	43.0	(28.6–58.7)	1	19.0	(2.3–70.4)	20	44.7	(29.4–61.1)	
5+	1	2.1	(0.3–13.8)	0	0.0		1	2.3	(0.3–14.7)	
N	47			4			43			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: комерційний (я платив)										
1	5	51.1	(22.5–79.0)	0	0.0		5	51.1	(22.5–79.0)	
2-4	5	48.9	(21.0–77.5)	0	0.0		5	48.9	(21.0–77.5)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	10			0			10			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього										
1	240	85.5	(80.4–89.5)	43	97.2	(89.0–99.3)	197	83.5	(77.7–88.1)	0.0280
2-4	41	13.9	(10.0–19.0)	2	2.8	(0.7–11.0)	39	15.8	(11.3–21.6)	
5+	2	0.6	(0.1–2.4)	0	0.0		2	0.7	(0.2–2.8)	
N	283			45			238			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	484	217	45.3 (40.4–50.3)	267	54.7 (49.7–59.6)	1.0000
Стать							
	чоловік	419	179	42.7 (37.5–48.1)	240	57.3 (51.9–62.5)	0.0023
	жінка	65	38	64.0 (51.0–75.2)	27	36.0 (24.8–49.0)	

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N		ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	25	9	37.9 (17.8–63.1)	16	62.1 (36.9–82.2)	0.8722
25-34	92	39	44.4 (33.6–55.7)	53	55.6 (44.3–66.4)	
35-44	247	113	45.5 (38.8–52.4)	134	54.5 (47.6–61.2)	
45+	120	56	47.6 (37.4–57.9)	64	52.4 (42.1–62.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	18	8	42.4 (17.4–72.1)	10	57.6 (27.9–82.6)	0.6302
3-5	24	10	45.3 (24.8–67.5)	14	54.7 (32.5–75.2)	
6-10	53	17	35.7 (22.1–52.0)	36	64.3 (48.0–77.9)	
≥11	389	182	46.9 (41.4–52.4)	207	53.1 (47.6–58.6)	
Партнерський статус						
живе сам	210	76	35.3 (28.7–42.6)	134	64.7 (57.4–71.3)	0.0006
живе з партнером	274	141	52.5 (45.8–59.2)	133	47.5 (40.8–54.2)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	91	44	52.5 (41.4–63.4)	47	47.5 (36.6–58.6)	0.1126
неповний робочий день або тимчасово	265	109	40.9 (34.6–47.5)	156	59.1 (52.5–65.4)	
безробітний	101	46	45.0 (34.2–56.4)	55	55.0 (43.6–65.8)	
інвалідність	9	5	43.8 (11.2–82.7)	4	56.2 (17.3–88.8)	
інші	18	13	73.7 (45.9–90.2)	5	26.3 (9.8–54.1)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	68	33	49.2 (35.5–63.0)	35	50.8 (37.0–64.5)	0.8478
3-10 тис	196	97	48.7 (41.1–56.4)	99	51.3 (43.6–58.9)	
10-20 тис	139	58	44.3 (35.3–53.6)	81	55.7 (46.4–64.7)	
≥20 тис	38	15	42.6 (25.4–61.9)	23	57.4 (38.1–74.6)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	320	147	46.8 (40.9–52.8)	173	53.2 (47.2–59.1)	0.5022

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
	так	162	70	43.1 (34.5–52.2)	92	56.9 (47.8–65.5)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	255	115	45.5 (38.6–52.6)	140	54.5 (47.4–61.4)	0.8596
так	225	99	44.6 (37.7–51.7)	126	55.4 (48.3–62.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	415	189	45.7 (40.4–51.1)	226	54.3 (48.9–59.6)	0.2142
так	62	23	36.9 (25.2–50.3)	39	63.1 (49.7–74.8)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	73	26	32.5 (22.4–44.6)	47	67.5 (55.4–77.6)	0.0251
негативний	411	191	47.3 (42.0–52.8)	220	52.7 (47.2–58.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	433	189	44.2 (39.1–49.5)	244	55.8 (50.5–60.9)	
стимулятори	18	11	55.5 (26.9–80.9)	7	44.5 (19.1–73.1)	
опі+стимул	33	17	54.2 (34.7–72.5)	16	45.8 (27.5–65.3)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	459	203	44.9 (39.9–50.1)	256	55.1 (49.9–60.1)	0.7255
стимулятори	23	13	53.0 (28.4–76.2)	10	47.0 (23.8–71.6)	
інші	2	1	54.3 (0.0–100.0)	1	45.7 (0.0–100.0)	

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
так	135	47.8	(41.2–54.5)	21	36.8	(24.0–51.7)	114	49.9	(42.5–57.3)	0.1115
N	279			51			228			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	44	86.8	(75.2–93.4)	4	100.0		40	86.0	(73.7–93.1)	0.4499
N	52			4			48			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	13	93.4	(64.7–99.1)	0	0.0		13	93.4	(64.7–99.1)	
N	14			0			14			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	78	28.8	(23.0–35.3)	10	18.3	(9.7–31.8)	68	30.9	(24.3–38.3)	0.1564
часто	39	12.2	(8.9–16.5)	8	14.2	(7.0–26.7)	31	11.8	(8.2–16.6)	
половина	14	4.0	(2.3–6.8)	5	7.3	(2.9–17.0)	9	3.4	(1.7–6.5)	
іноді	15	6.6	(3.7–11.4)	1	4.0	(0.5–23.7)	14	7.1	(3.9–12.6)	
рідко	28	9.5	(6.4–13.9)	3	4.1	(1.3–12.6)	25	10.6	(7.0–15.7)	
ніколи	105	38.9	(32.5–45.7)	24	52.2	(37.0–66.9)	81	36.3	(29.4–43.9)	
N	279			51			228			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	37	75.7	(62.5–85.4)	3	77.9	(25.7–97.3)	34	75.6	(61.7–85.6)	0.0159
часто	4	6.9	(2.6–17.4)	0	0.0		4	7.4	(2.7–18.4)	
половина	2	3.0	(0.7–12.0)	0	0.0		2	3.2	(0.8–12.7)	
іноді	1	1.3	(0.2–8.8)	1	22.1	(2.7–74.3)	0	0.0		
рідко	1	1.5	(0.2–10.3)	0	0.0		1	1.6	(0.2–10.9)	
ніколи	7	11.4	(5.4–22.7)	0	0.0		7	12.2	(5.7–24.0)	
N	52			4			48			
Частота використання презервативів: комерційний (я заплатив) партнер										
завжди	9	69.8	(42.7–87.8)	0	0.0		9	69.8	(42.7–87.8)	
часто	3	19.7	(6.1–48.0)	0	0.0		3	19.7	(6.1–48.0)	
половина	1	3.8	(0.5–23.5)	0	0.0		1	3.8	(0.5–23.6)	
іноді	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	1	6.6	(0.9–35.3)	0	0.0		1	6.6	(0.9–35.3)	
N	14			0			14			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

			Результат тесту на ВІЛ				
		N	позитивний		негативний		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	77	13.9 (11.0–17.4)	423	86.1 (82.6–89.0)	1.0000
Стать							
	чоловік	435	69	14.4 (11.3–18.2)	366	85.6 (81.8–88.7)	0.3657
	жінка	65	8	10.4 (5.0–20.1)	57	89.6 (79.9–95.0)	

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	25	1	11.9 (1.6–53.0)	24	88.1 (47.0–98.4)	0.6014
25-34	95	10	9.2 (4.9–16.7)	85	90.8 (83.3–95.1)	
35-44	253	44	16.0 (11.9–21.1)	209	84.0 (78.9–88.1)	
45+	127	22	13.8 (8.9–20.7)	105	86.2 (79.3–91.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	18	2	20.0 (3.6–62.4)	16	80.0 (37.6–96.4)	0.6896
3-5	24	4	15.2 (5.2–36.8)	20	84.8 (63.2–94.8)	
6-10	53	5	8.7 (3.5–20.0)	48	91.3 (80.0–96.5)	
≥11	405	66	14.2 (11.2–17.9)	339	85.8 (82.1–88.8)	
Партнерський статус						
живе сам	222	50	20.9 (15.7–27.2)	172	79.1 (72.8–84.3)	0.0002
живе з партнером	278	27	8.7 (5.9–12.6)	251	91.3 (87.4–94.1)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	94	15	14.5 (8.7–23.3)	79	85.5 (76.7–91.3)	0.2803
неповний робочий день або тимчасово	273	30	10.8 (7.3–15.8)	243	89.2 (84.2–92.7)	
безробітний	104	23	17.4 (11.4–25.7)	81	82.6 (74.3–88.6)	
інвалідність	10	4	27.2 (6.9–65.2)	6	72.8 (34.8–93.1)	
інші	18	4	19.3 (6.3–46.1)	14	80.7 (53.9–93.7)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	70	22	22.5 (14.3–33.4)	48	77.5 (66.6–85.7)	0.0286
3-10 тис	203	30	14.7 (10.0–21.1)	173	85.3 (78.9–90.0)	
10-20 тис	140	17	11.6 (7.2–18.3)	123	88.4 (81.7–92.8)	
≥20 тис	40	2	3.5 (0.8–13.9)	38	96.5 (86.1–99.2)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	329	39	11.7 (8.4–16.2)	290	88.3 (83.8–91.6)	0.0653
так	169	38	18.0 (13.0–24.4)	131	82.0 (75.6–87.0)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	264	26	8.5 (5.4–13.0)	238	91.5 (87.0–94.6)	0.0003
так	231	50	20.7 (15.8–26.6)	181	79.3 (73.4–84.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	429	57	12.0 (9.1–15.7)	372	88.0 (84.3–90.9)	0.0006
так	63	19	28.8 (18.6–41.6)	44	71.2 (58.4–81.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	449	66	12.8 (10.0–16.1)	383	87.2 (83.9–90.0)	
стимулятори	18	3	28.1 (7.4–65.9)	15	71.9 (34.1–92.6)	
опі+стимул	33	8	21.0 (9.9–39.0)	25	79.0 (61.0–90.1)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	475	74	13.4 (10.7–16.7)	401	86.6 (83.3–89.3)	0.3958
стимулятори	23	3	24.7 (6.7–60.1)	20	75.3 (39.9–93.3)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)




Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)




Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	495	264	56.0 (51.1–60.7)	231	44.0 (39.3–48.9)	1.0000
Стать						
чоловік	431	226	55.1 (49.9–60.2)	205	44.9 (39.8–50.1)	0.2970
жінка	64	38	62.5 (49.1–74.2)	26	37.5 (25.8–50.9)	

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	25	20	82.7 (60.1–93.8)	5	17.3 (6.2–39.9)	0.0266
25-34	93	57	60.6 (49.5–70.8)	36	39.4 (29.2–50.5)	
35-44	252	127	53.7 (47.0–60.3)	125	46.3 (39.7–53.0)	
45+	125	60	50.5 (40.5–60.5)	65	49.5 (39.5–59.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	18	13	77.7 (49.3–92.6)	5	22.3 (7.4–50.7)	0.0288
3-5	23	17	72.3 (47.7–88.2)	6	27.7 (11.8–52.3)	
6-10	52	34	66.9 (51.8–79.2)	18	33.1 (20.8–48.2)	
≥11	402	200	52.4 (47.0–57.7)	202	47.6 (42.3–53.0)	
Партнерський статус						
живе сам	220	111	52.8 (45.7–59.9)	109	47.2 (40.1–54.3)	0.2604
живе з партнером	275	153	58.3 (51.7–64.7)	122	41.7 (35.3–48.3)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	93	63	66.9 (55.8–76.4)	30	33.1 (23.6–44.2)	0.2487
неповний робочий день або тимчасово	269	138	53.1 (46.6–59.5)	131	46.9 (40.5–53.4)	
безробітний	104	49	51.9 (41.0–62.7)	55	48.1 (37.3–59.0)	
інвалідність	10	5	68.8 (31.1–91.5)	5	31.2 (8.5–68.9)	
інші	18	8	56.1 (29.5–79.6)	10	43.9 (20.4–70.5)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	69	24	39.6 (26.6–54.3)	45	60.4 (45.7–73.4)	0.0238
3-10 тис	200	104	53.6 (46.0–61.0)	96	46.4 (39.0–54.0)	
10-20 тис	139	84	64.7 (55.9–72.6)	55	35.3 (27.4–44.1)	
≥20 тис	40	22	55.4 (37.5–72.0)	18	44.6 (28.0–62.5)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	325	178	57.6 (51.8–63.3)	147	42.4 (36.7–48.2)	0.3862
так	168	85	53.1 (44.4–61.6)	83	46.9 (38.4–55.6)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	424	250	61.5 (56.3–66.4)	174	38.5 (33.6–43.7)	0.0000
так	63	8	11.6 (5.6–22.4)	55	88.4 (77.6–94.4)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	76	26	34.3 (23.2–47.4)	50	65.7 (52.6–76.8)	0.0003
негативний	419	238	59.5 (54.2–64.5)	181	40.5 (35.5–45.8)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	444	233	55.3 (50.2–60.3)	211	44.7 (39.7–49.8)	
стимулятори	18	16	89.7 (62.4–97.9)	2	10.3 (2.1–37.6)	
опі+стимул	33	15	45.4 (26.7–65.5)	18	54.6 (34.5–73.3)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	471	247	55.0 (50.1–59.9)	224	45.0 (40.1–49.9)	0.0517
стимулятори	23	17	77.5 (54.4–90.9)	6	22.5 (9.1–45.6)	
інші	1	0	0.0	1	100.0	




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	93.0	94.1	86.8	0.0953
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	40.1	39.1	46.3	0.2836

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
невиявлений = непередаваний	59.3	57.4	71.0	0.0600
ПКП знижує ризик	59.0	56.8	72.6	0.0134
АРТ слід починати негайно	89.1	87.8	97.1	0.0068
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	74.0	73.0	80.3	0.1800
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	78.7	77.3	87.3	0.0408
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	93.5	93.4	94.1	0.8998
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	82.6	80.3	97.0	0.0001
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	87.6	88.1	84.3	0.4738
лікування слід починати негайно	91.3	90.5	96.2	0.1008
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	76.5	75.1	85.5	0.0454
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	20.1	20.1	20.1	0.9995
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	92.5	92.4	92.9	0.8994
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	72.8	71.9	77.9	0.3034
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	77.7	77.5	79.4	0.7568
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	4.3	4.7	1.8	0.3278
лікування слід починати негайно	91.4	91.1	93.0	0.5983
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	81.3	79.9	89.8	0.0379
ВГС на 100% передається від матері до дитини	18.1	19.0	12.3	0.1683
ВГС передається через кров і статевим шляхом	95.1	94.8	96.4	0.5649
лікування ВГС не існує	83.8	82.1	94.4	0.0064
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	88.5	87.2	96.9	0.0091
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	80.4	79.4	87.0	0.1371

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	433	86.2	(81.9–89.6)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	440	88.1	(84.6–90.9)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	218	55.7	(50.1–61.2)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	129	34.5	(29.3–40.0)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	430	97.5	(94.5–98.8)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	410	97.0	(94.6–98.3)
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	58	12.9	(9.8–16.7)
негативний	358	87.1	(83.3–90.2)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	227	60.7	(54.8–66.2)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	0	0.0	
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	168	66.0	(58.7–72.5)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	11	7.6	(3.7–14.9)
негативний	147	87.3	(79.9–92.3)
не може розкрити	9	5.1	(2.6–9.7)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

			Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	386	168	44.3 (38.8–49.9)	218	55.7 (50.1–61.2)	1.0000
Стать							
	чоловік	340	148	44.1 (38.2–50.1)	192	55.9 (49.9–61.8)	0.8005
	жінка	46	20	46.3 (30.6–62.7)	26	53.7 (37.3–69.4)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	11	5	47.9 (16.7–80.9)	6	52.1 (19.1–83.3)	0.8708
25-34	72	30	45.7 (33.4–58.5)	42	54.3 (41.5–66.6)	
35-44	200	87	41.9 (34.6–49.5)	113	58.1 (50.5–65.4)	
45+	103	46	47.4 (36.6–58.5)	57	52.6 (41.5–63.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	8	3	48.4 (13.0–85.5)	5	51.6 (14.5–87.0)	0.5879
3-5	13	9	66.4 (34.0–88.4)	4	33.6 (11.6–66.0)	
6-10	37	12	38.6 (22.0–58.3)	25	61.4 (41.7–78.0)	
≥11	328	144	44.0 (38.1–50.0)	184	56.0 (50.0–61.9)	
Партнерський статус						
живе сам	174	79	45.1 (37.2–53.2)	95	54.9 (46.8–62.8)	0.8139
живе з партнером	212	89	43.7 (36.2–51.6)	123	56.3 (48.4–63.8)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	76	33	45.7 (33.7–58.3)	43	54.3 (41.7–66.3)	0.3583
неповний робочий день або тимчасово	206	91	44.0 (36.7–51.5)	115	56.0 (48.5–63.3)	
безробітний	82	33	42.0 (30.4–54.6)	49	58.0 (45.4–69.6)	
інвалідність	6	2	16.8 (2.4–62.7)	4	83.2 (37.3–97.6)	
інші	15	8	63.5 (34.3–85.3)	7	36.5 (14.7–65.7)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	60	20	33.7 (21.6–48.4)	40	66.3 (51.6–78.4)	0.4179
3-10 тис	158	65	40.2 (32.2–48.9)	93	59.8 (51.1–67.8)	
10-20 тис	111	51	46.3 (36.3–56.7)	60	53.7 (43.3–63.7)	
≥20 тис	35	16	49.6 (30.9–68.3)	19	50.4 (31.7–69.1)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	239	109	46.0 (39.1–53.0)	130	54.0 (47.0–60.9)	0.4983
так	146	59	42.0 (33.1–51.5)	87	58.0 (48.5–66.9)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	188	112	59.9 (51.5–67.8)	76	40.1 (32.2–48.5)	0.0000
так	195	53	26.7 (20.6–33.9)	142	73.3 (66.1–79.4)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	324	151	47.4 (41.3–53.5)	173	52.6 (46.5–58.7)	0.0020
так	57	14	24.0 (14.1–37.6)	43	76.0 (62.4–85.9)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	71	29	37.3 (26.3–49.9)	42	62.7 (50.1–73.7)	0.2285
негативний	315	139	45.7 (39.6–52.0)	176	54.3 (48.0–60.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	351	151	44.3 (38.6–50.2)	200	55.7 (49.8–61.4)	
стимулятори	9	7	59.9 (17.3–91.4)	2	40.1 (8.6–82.7)	
опі+стимул	26	10	37.2 (20.1–58.3)	16	62.8 (41.7–79.9)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	372	162	44.5 (38.9–50.2)	210	55.5 (49.8–61.1)	0.7333
стимулятори	13	6	42.5 (15.6–74.6)	7	57.5 (25.4–84.4)	
інші	1	0	0.0	1	100.0	

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	77	73.6 (62.3–82.5)	1.0000	55	98.9 (92.7–99.9)	1.0000	54	46	86.7 (75.0–93.4)	1.0000
Стать											
	чоловік	69	74.4 (62.3–83.5)	0.6147	50	98.8 (92.1–99.8)	0.7755	49	41	85.5 (72.9–92.8)	0.3780
	жінка	8	66.0 (30.3–89.6)		5	100.0		5	5	100.0	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4										
<25	1	100.0	0.6090	1	100.0	0.9011	1	1	100.0	0.6713
25-34	10	84.0 (52.1–96.2)		8	100.0		8	6	76.9 (39.4–94.4)	
35-44	44	72.2 (57.0–83.6)		31	98.1 (87.3–99.7)		30	27	90.1 (72.6–96.9)	
45+	22	66.3 (43.3–83.5)		15	100.0		15	12	80.6 (53.5–93.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	2	100.0	0.5594	2	100.0	0.9766	2	2	100.0	0.5248
3-5	4	61.0 (16.3–92.6)		2	100.0		2	1	57.0 (6.6–96.1)	
6-10	5	86.4 (40.2–98.4)		4	100.0		4	4	100.0	
≥11	66	71.3 (58.8–81.2)		47	98.6 (90.9–99.8)		46	39	85.5 (72.1–93.1)	
Партнерський статус										
живе сам	50	67.9 (52.9–80.0)	0.1346	33	98.2 (87.9–99.8)	0.4177	32	27	85.7 (68.6–94.2)	0.7815
живе з партнером	27	83.9 (65.2–93.5)		22	100.0		22	19	88.2 (68.5–96.2)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	15	62.8 (36.5–83.2)	0.2692	9	100.0	0.9340	9	9	100.0	0.6000
неповний робочий день або тимчасово	30	82.2 (64.8–92.1)		23	97.7 (84.6–99.7)		22	18	83.9 (62.4–94.2)	
безробітний	23	81.4 (58.7–93.1)		19	100.0		19	15	80.6 (57.5–92.7)	
інвалідність	4	42.6 (7.1–87.8)		2	100.0		2	2	100.0	
інші	4	58.1 (14.0–92.2)		2	100.0		2	2	100.0	
Категорія місячного доходу										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	22	80.1 (58.6–92.0)	0.8566	17	100.0	0.8215	17	16	94.3 (67.8–99.2)	0.2085
3-10 тис	30	74.8 (56.2–87.3)		21	97.5 (83.7–99.7)		20	18	90.8 (67.9–97.8)	
10-20 тис	17	75.1 (51.1–89.8)		12	100.0		12	9	78.9 (49.8–93.4)	
≥20 тис	2	100.0		2	100.0		2	1	45.7 (4.6–93.6)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	39	79.1 (63.6–89.1)	0.2445	29	98.2 (87.7–99.8)	0.4103	28	26	94.2 (79.0–98.6)	0.0495
так	38	67.1 (50.1–80.6)		26	100.0		26	20	76.3 (55.7–89.2)	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	26	66.0 (44.3–82.6)	0.2568	16	96.5 (77.6–99.5)	0.1466	15	10	71.5 (42.9–89.3)	0.0363
так	50	78.8 (65.0–88.1)		39	100.0		39	36	93.1 (80.4–97.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	57	71.4 (57.9–82.0)	0.5122	39	100.0	0.1013	39	32	83.9 (68.9–92.5)	0.3006
так	19	79.3 (54.4–92.5)		15	95.9 (74.7–99.5)		14	13	94.1 (66.6–99.2)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	77	73.6 (62.1–82.6)		55	98.9 (92.5–99.9)		54	46	86.7 (74.8–93.5)	
негативний	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	р-значення	N	% (ДІ)	р-значення	N	n	% (ДІ)	р-значення
опіоїди	66	71.7 (59.3–81.5)		47	100.0		47	40	85.9 (72.7–93.3)	
стимулятори	3	88.4 (34.1–99.1)		2	100.0		2	2	100.0	
опі+стимул	8	77.3 (38.4–94.9)		6	89.8 (48.4–98.8)		5	4	80.5 (29.6–97.6)	
інші	0			0			0	0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	74	71.3 (59.7–80.7)		52	98.8 (91.8–99.8)		51	43	85.0 (72.4–92.5)	
стимулятори	3	100.0		3	100.0		3	3	100.0	
інші	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	1	1.8	(0.3–11.8)
1-2 тижні тому	2	3.3	(0.8–12.3)
3-4 тижні тому	4	7.4	(2.8–18.6)
1-3 місяці тому	5	8.2	(3.3–18.8)
ніколи	44	79.3	(66.3–88.2)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	8	64.6	(37.0–85.0)
ліків не було	5	35.4	(15.0–63.0)
був під впливом	0	0.0	
не хотів, щоб інші бачили	0	0.0	
інші	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	2	17.4	(4.4–49.3)
відсутність часу на відвідування клініки	2	16.0	(4.0–46.5)
відсутність мотивації відвідувати клініку	2	14.5	(3.6–43.7)
пропуск візиту, важко повернутися	2	14.0	(3.4–43.0)
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	0	0.0	
вживання наркотиків	2	17.4	(4.4–49.3)
побічні ефекти або ускладнення	0	0.0	
немає розуміння як	0	0.0	
втрачено або продано всі АРВ-препарати	0	0.0	
Причини відмови від ДРТ			
вживання алкоголю	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
довго чекав і пішов	0	0.0	

	n	%	ДІ
Час на АРТ			
≤3м	2	16.0	(4.0–46.5)
4-24м	5	40.6	(17.9–68.2)
25-60м	3	20.9	(6.7–49.4)
5 років +	3	22.5	(7.3–51.7)

9. Доконтактна профілактика




Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

			Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
		N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього											
	Разом	496	6	1.0 (0.4–2.4)	3	0.5 (0.2–1.7)	130	26.5 (22.3–31.2)	357	71.9 (67.2–76.2)	1.0000
Стать											
	чоловік	432	5	1.1 (0.4–2.6)	3	0.6 (0.2–1.9)	116	27.3 (22.8–32.4)	308	71.0 (65.9–75.7)	0.6095
	жінка	64	1	0.9 (0.1–6.5)	0	0.0	14	20.9 (12.2–33.7)	49	78.1 (65.4–87.1)	
Вікова категорія 4											
	<25	25	0	0.0	0	0.0	4	19.9 (5.6–50.9)	21	80.1 (49.1–94.4)	
	25-34	95	0	0.0	0	0.0	22	21.7 (14.1–31.7)	73	78.3 (68.3–85.9)	
	35-44	250	5	1.6 (0.6–4.0)	3	1.1 (0.3–3.3)	69	27.9 (22.0–34.6)	173	69.5 (62.7–75.5)	
	45+	126	1	1.0 (0.1–6.7)	0	0.0	35	29.2 (20.9–39.2)	90	69.8 (59.8–78.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків											
	≤2	18	0	0.0	0	0.0	5	31.1 (9.9–65.1)	13	68.9 (34.9–90.1)	
	3-5	24	1	5.3 (0.7–31.7)	0	0.0	6	18.4 (7.7–37.9)	17	76.3 (55.0–89.5)	

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
6-10	53	0	0.0	0	0.0	8	14.4 (6.9–27.8)	45	85.6 (72.2–93.1)	
≥11	401	5	1.0 (0.4–2.5)	3	0.7 (0.2–2.1)	111	28.4 (23.7–33.7)	282	69.9 (64.6–74.7)	
Партнерський статус										
живе сам	219	3	1.1 (0.3–3.7)	1	0.4 (0.0–2.5)	54	25.0 (19.2–31.9)	161	73.5 (66.6–79.4)	0.8751
живе з партнером	277	3	1.0 (0.3–3.2)	2	0.7 (0.2–2.6)	76	27.7 (22.0–34.2)	196	70.7 (64.1–76.5)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	94	1	1.0 (0.1–7.1)	0	0.0	26	28.0 (19.2–39.0)	67	70.9 (59.9–79.9)	
неповний робочий день або тимчасово	271	2	0.7 (0.2–3.0)	1	0.4 (0.0–2.5)	71	27.0 (21.3–33.5)	197	72.0 (65.4–77.7)	
безробітний	102	3	2.2 (0.6–7.2)	2	1.6 (0.4–6.2)	23	24.7 (16.1–35.8)	74	71.6 (60.5–80.6)	
інвалідність	10	0	0.0	0	0.0	2	14.1 (2.4–52.1)	8	85.9 (47.9–97.6)	
інші	18	0	0.0	0	0.0	8	33.6 (14.6–60.1)	10	66.4 (39.9–85.4)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	70	1	0.7 (0.1–5.3)	1	1.3 (0.2–8.8)	21	31.2 (19.8–45.4)	47	66.8 (52.6–78.5)	0.8545
3-10 тис	201	2	0.7 (0.2–3.1)	2	0.9 (0.2–3.4)	53	26.2 (20.0–33.5)	144	72.2 (64.9–78.5)	
10-20 тис	139	1	0.9 (0.1–6.5)	0	0.0	38	29.6 (21.4–39.4)	100	69.5 (59.6–77.8)	
≥20 тис	40	1	1.6 (0.2–11.3)	0	0.0	8	18.3 (8.5–35.0)	31	80.1 (63.4–90.4)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	326	3	1.0 (0.3–3.1)	3	0.8 (0.3–2.6)	84	26.1 (21.0–31.9)	236	72.1 (66.3–77.3)	0.6752
так	168	3	1.2 (0.4–3.9)	0	0.0	45	27.1 (20.1–35.4)	120	71.7 (63.3–78.8)	

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	263	1	0.2 (0.0–1.4)	0	0.0	46	18.4 (13.4–24.8)	216	81.4 (75.0–86.4)	0.0000
так	228	5	2.1 (0.8–5.3)	3	1.2 (0.4–3.8)	83	37.1 (30.5–44.1)	137	59.6 (52.5–66.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	428	6	1.2 (0.5–2.8)	3	0.6 (0.2–1.9)	114	27.6 (23.0–32.7)	305	70.6 (65.4–75.3)	0.5161
так	60	0	0.0	0	0.0	15	21.5 (12.9–33.6)	45	78.5 (66.4–87.1)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	73	4	6.0 (2.1–15.7)	0	0.0	23	34.0 (22.6–47.6)	46	60.0 (46.7–71.9)	0.0001
негативний	423	2	0.3 (0.1–1.1)	3	0.6 (0.2–1.9)	107	25.4 (21.0–30.4)	311	73.7 (68.7–78.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	445	4	0.8 (0.3–2.1)	3	0.6 (0.2–1.8)	123	27.8 (23.3–32.7)	315	70.9 (65.9–75.4)	
стимулятори	18	1	6.4 (0.7–38.0)	0	0.0	3	25.2 (5.8–64.8)	14	68.4 (33.2–90.4)	
опі+стимул	33	1	1.7 (0.2–11.9)	0	0.0	4	10.8 (3.7–27.5)	28	87.5 (71.1–95.3)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	471	5	0.8 (0.3–2.1)	3	0.6 (0.2–1.7)	124	26.4 (22.2–31.1)	339	72.2 (67.5–76.5)	0.5472
стимулятори	23	1	5.5 (0.7–33.1)	0	0.0	6	31.0 (11.1–61.7)	16	63.5 (35.0–84.9)	
інші	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	6	1.0	(0.4–2.4)
приймав в минулому	3	0.5	(0.2–1.7)
ніколи не приймав	130	26.5	(22.3–31.2)
не знає що це	357	71.9	(67.2–76.2)
Обізнаність про ДКП			
ні	357	71.5	(66.9–75.8)
так	142	28.5	(24.2–33.1)
Використання ДКП зараз			
ні	490	99.0	(97.6–99.6)
так	6	1.0	(0.4–2.4)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	133	96.3	(91.6–98.4)
так	6	3.7	(1.6–8.4)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)



Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)




Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	1	3.8	(0.5–22.9)
клініка закрита після лютого 2022 року	2	7.7	(1.8–27.5)
слабкий або відсутній ефект	10	43.3	(25.3–63.2)
побічні ефекти	2	7.7	(1.9–26.1)
не хочу відвідувати клініку	13	42.9	(25.6–62.1)
не хочу кидати наркотики	4	13.3	(5.0–31.3)
важко дістатися до клініки	2	5.7	(1.4–20.5)
не потребує	1	2.6	(0.4–16.6)
не подобається ставлення лікаря	0	0.0	
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	3	12.1	(3.9–32.2)
не змінилось	12	48.8	(29.8–68.1)
зменшилося	11	39.1	(22.2–59.1)
Чи купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	326	65.6	(60.8–70.1)
так, бупренорфін	0	0.0	
не купував	170	34.4	(29.9–39.2)
Де купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	170	34.5	(29.9–39.3)
купляв на чорн. ринку	317	63.9	(59.0–68.5)
купляв в приватній клініці	8	1.6	(0.8–3.4)
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорн.ринку			
ін'єкційно	224	69.5	(63.7–74.7)
ін'єкційно у суміші	63	18.6	(14.4–23.7)
ковтав або розсмоктував	37	11.8	(8.5–16.1)
нюхав	1	0.2	(0.0–1.2)

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

		Отримував ЗПТ (з усіх)							
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	492	63	12.0 (9.3–15.2)	27	5.0 (3.4–7.3)	135	27.1 (23.0–31.7)	267	55.9 (51.0–60.7)	1.0000
Стать										
чоловік	428	55	12.1 (9.3–15.7)	26	5.5 (3.7–8.1)	120	27.8 (23.3–32.8)	227	54.6 (49.3–59.7)	0.2557
жінка	64	8	11.0 (5.3–21.4)	1	1.3 (0.2–8.8)	15	22.1 (13.1–34.7)	40	65.6 (52.3–76.9)	
Вікова категорія 4										
<25	25	1	4.1 (0.5–26.4)	0	0.0	4	10.2 (3.4–26.9)	20	85.7 (66.6–94.7)	0.0515
25-34	94	9	9.6 (4.8–18.2)	2	1.7 (0.4–6.8)	29	34.1 (24.1–45.7)	54	54.6 (43.4–65.3)	
35-44	249	34	12.0 (8.6–16.6)	19	6.8 (4.3–10.6)	66	25.9 (20.4–32.4)	130	55.2 (48.4–61.8)	
45+	124	19	15.6 (9.8–23.8)	6	5.2 (2.2–11.7)	36	28.3 (20.3–38.0)	63	50.9 (41.0–60.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	18	0	0.0	0	0.0	2	12.8 (2.6–44.8)	16	87.2 (55.2–97.4)	0.0606
3-5	23	2	6.6 (1.5–25.0)	0	0.0	2	8.8 (1.9–31.9)	19	84.6 (62.7–94.7)	
6-10	53	7	13.9 (6.4–27.8)	4	5.8 (2.1–15.3)	16	33.0 (19.9–49.5)	26	47.2 (32.9–62.0)	
≥11	398	54	12.7 (9.7–16.4)	23	5.5 (3.6–8.3)	115	28.2 (23.6–33.3)	206	53.7 (48.3–59.0)	
Партнерський статус										
живе сам	217	31	13.6 (9.5–19.0)	15	6.3 (3.8–10.3)	65	28.6 (22.6–35.3)	106	51.6 (44.4–58.7)	0.3618
живе з партнером	275	32	10.8 (7.5–15.1)	12	4.0 (2.2–7.3)	70	26.1 (20.5–32.5)	161	59.1 (52.5–65.5)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	93	13	13.0 (7.4–21.6)	5	6.1 (2.4–14.7)	28	32.5 (22.6–44.3)	47	48.4 (37.5–59.5)	0.9250
неповний робочий день або тимчасово	268	31	11.6 (8.1–16.4)	12	4.3 (2.4–7.5)	71	25.0 (19.8–30.9)	154	59.2 (52.7–65.4)	

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	102	16	13.2 (8.0–21.1)	8	6.1 (3.0–12.1)	26	27.3 (18.4–38.6)	52	53.3 (42.3–64.0)	
інвалідність	10	1	7.8 (0.7–49.6)	0	0.0	3	18.1 (3.9–54.8)	6	74.1 (36.2–93.5)	
інші	18	2	8.7 (1.8–32.6)	2	7.2 (1.5–28.1)	6	30.5 (12.2–58.1)	8	53.6 (27.1–78.2)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	69	10	14.2 (7.4–25.5)	8	9.2 (4.5–18.2)	19	24.4 (15.3–36.6)	32	52.2 (38.8–65.3)	0.7107
3-10 тис	200	29	13.5 (9.4–19.2)	12	5.8 (3.2–10.3)	62	27.5 (21.6–34.2)	97	53.2 (45.6–60.6)	
10-20 тис	137	14	9.6 (5.6–15.8)	5	3.7 (1.5–8.9)	37	29.3 (21.3–38.7)	81	57.5 (48.1–66.3)	
≥20 тис	40	6	14.2 (5.7–31.1)	0	0.0	9	30.2 (14.9–51.7)	25	55.6 (36.9–72.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	325	39	10.9 (8.0–14.9)	17	5.0 (3.1–8.1)	88	26.4 (21.6–31.9)	181	57.6 (51.7–63.3)	0.7675
так	165	23	13.5 (8.8–20.0)	10	5.0 (2.6–9.4)	47	28.7 (21.4–37.3)	85	52.8 (44.1–61.3)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз n	% (ДІ)	приймав в минулому n	% (ДІ)	ніколи не приймав, але планує n	% (ДІ)	не знає або не планує n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	258	8	2.5 (1.2–5.1)	11	4.2 (2.3–7.7)	70	26.1 (20.5–32.7)	169	67.1 (60.4–73.3)	0.0000
так	229	55	23.9 (18.6–30.3)	15	5.6 (3.4–9.3)	62	27.9 (22.1–34.5)	97	42.6 (35.8–49.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	429	0	0.0	27	5.7 (3.8–8.3)	135	30.8 (26.2–35.9)	267	63.5 (58.3–68.4)	0.0000
так	63	63	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										

	N	Отримував ЗПТ (з усіх)								
		приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	76	19	24.5 (15.8–36.1)	5	6.7 (2.7–15.9)	23	28.9 (19.4–40.7)	29	39.8 (28.2–52.7)	0.0026
негативний	416	44	9.9 (7.3–13.3)	22	4.7 (3.1–7.2)	112	26.8 (22.3–31.9)	238	58.5 (53.2–63.6)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	442	59	12.5 (9.7–16.1)	25	5.2 (3.5–7.8)	120	27.3 (22.9–32.2)	238	54.9 (49.8–60.0)	
стимулятори	18	0	0.0	1	3.9 (0.4–26.7)	2	10.3 (2.1–37.6)	15	85.9 (59.6–96.2)	
опі+стимул	32	4	11.4 (4.0–28.2)	1	2.2 (0.3–14.9)	13	35.6 (20.5–54.3)	14	50.8 (32.6–68.8)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	467	62	12.4 (9.6–15.8)	24	4.8 (3.2–7.2)	126	27.1 (22.8–31.8)	255	55.7 (50.7–60.6)	0.1040
стимулятори	23	1	4.1 (0.5–26.9)	2	6.1 (1.3–23.9)	8	27.0 (12.0–50.1)	12	62.7 (38.9–81.6)	
інші	2	0	0.0	1	54.3 (0.0–100.0)	1	45.7 (0.0–100.0)	0	0.0	




Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)




Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

		n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь				
	так	224	46.0	(41.1–50.9)
Кількість передозувань протягом життя				
	1	79	33.8	(27.3–40.9)
	2-4	111	52.5	(45.1–59.8)
	5+	30	13.7	(9.3–19.8)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	так	28	5.7	(3.9–8.3)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)				
	так	28	12.4	(8.5–17.8)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців				
	1	18	69.9	(49.6–84.5)

	n	%	ДІ
2-4	8	27.8	(13.7–48.3)
5+	1	2.3	(0.3–15.0)
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)			
метадон	12	80.0	(51.5–93.8)
інші опіоїди	0	0.0	
стимулятор	3	20.0	(6.2–48.5)
інші	0	0.0	
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)			
метадон+стимулятор	1	14.8	(1.9–60.6)
метадон+барбіт. або димедр.	4	63.1	(22.5–90.9)
метадон+інше	1	22.1	(3.1–71.5)
інші	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)			
метадон	5	75.4	(36.3–94.3)
інші опіоїди	1	14.7	(2.0–59.3)
стимулятор	1	10.0	(1.3–48.3)
інші	0	0.0	
Знання та досвід налоксону			
ніколи не чув	79	17.0	(13.5–21.2)
знає, але не користувався	331	63.9	(58.9–68.5)
користувався	49	10.4	(7.7–14.1)
користувались друзі	31	6.3	(4.3–9.0)
користувався сам та друзі	10	2.4	(1.2–4.6)

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	499	471	94.3 (91.7–96.1)	28	5.7 (3.9–8.3)	1.0000
Стать						
чоловік	434	408	93.9 (90.9–95.9)	26	6.1 (4.1–9.1)	0.2034
жінка	65	63	97.5 (89.9–99.4)	2	2.5 (0.6–10.1)	
Вікова категорія 4						
<25	25	25	100.0	0	0.0	0.1451
25-34	95	85	90.7 (83.0–95.1)	10	9.3 (4.9–17.0)	
35-44	252	238	93.5 (89.0–96.3)	14	6.5 (3.7–11.0)	
45+	127	123	97.1 (92.2–98.9)	4	2.9 (1.1–7.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	18	18	100.0	0	0.0	0.6938

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	24	22	93.7 (75.3–98.6)	2	6.3 (1.4–24.7)	
6-10	53	49	94.7 (86.1–98.1)	4	5.3 (1.9–13.9)	
≥11	404	382	94.0 (90.8–96.1)	22	6.0 (3.9–9.2)	
Партнерський статус						
живе сам	222	208	92.9 (88.0–95.9)	14	7.1 (4.1–12.0)	0.2729
живе з партнером	277	263	95.4 (92.1–97.3)	14	4.6 (2.7–7.9)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	94	90	95.5 (87.4–98.5)	4	4.5 (1.5–12.6)	0.5062
неповний робочий день або тимчасово	273	260	95.2 (91.7–97.3)	13	4.8 (2.7–8.3)	
безробітний	104	95	91.1 (83.1–95.5)	9	8.9 (4.5–16.9)	
інвалідність	10	10	100.0	0	0.0	
інші	17	15	89.7 (61.4–97.9)	2	10.3 (2.1–38.6)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	70	67	97.0 (90.6–99.1)	3	3.0 (0.9–9.4)	0.0552
3-10 тис	203	186	90.5 (84.8–94.2)	17	9.5 (5.8–15.2)	
10-20 тис	140	134	96.0 (90.9–98.3)	6	4.0 (1.7–9.1)	
≥20 тис	40	39	97.6 (84.0–99.7)	1	2.4 (0.3–16.0)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	328	312	95.2 (92.0–97.1)	16	4.8 (2.9–8.0)	0.2874
так	169	157	92.7 (87.0–96.0)	12	7.3 (4.0–13.0)	

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	264	252	95.3 (91.5–97.4)	12	4.7 (2.6–8.5)	0.3008
так	230	214	92.9 (88.5–95.7)	16	7.1 (4.3–11.5)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	428	403	94.0 (91.1–96.1)	25	6.0 (3.9–8.9)	0.7197
так	63	60	95.2 (85.8–98.5)	3	4.8 (1.5–14.2)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	76	71	93.6 (85.1–97.4)	5	6.4 (2.6–14.9)	0.7725
негативний	423	400	94.4 (91.5–96.4)	23	5.6 (3.6–8.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	448	428	95.5 (92.9–97.2)	20	4.5 (2.8–7.1)	
стимулятори	18	16	90.8 (63.9–98.2)	2	9.2 (1.8–36.1)	
опі+стимул	33	27	80.2 (60.0–91.6)	6	19.8 (8.4–40.0)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	474	449	94.5 (91.8–96.4)	25	5.5 (3.6–8.2)	0.5008
стимулятори	23	20	89.3 (67.3–97.1)	3	10.7 (2.9–32.7)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	500	79	17.0 (13.5–21.2)	362	70.1 (65.3–74.6)	59	12.9 (9.8–16.7)	1.0000
Стать								
чоловік	435	68	17.1 (13.3–21.7)	313	69.2 (63.9–74.0)	54	13.7 (10.3–18.0)	0.2495
жінка	65	11	16.2 (8.9–27.8)	49	77.2 (65.0–86.1)	5	6.5 (2.6–15.3)	
Вікова категорія 4								
<25	25	10	39.8 (19.3–64.6)	15	60.2 (35.4–80.7)	0	0.0	0.0809

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
25-34	95	13	16.4 (8.8–28.3)	70	71.2 (59.5–80.7)	12	12.4 (6.9–21.3)	
35-44	253	41	16.5 (12.1–21.9)	177	68.2 (61.5–74.3)	35	15.3 (10.8–21.3)	
45+	127	15	13.2 (7.4–22.4)	100	75.3 (64.8–83.5)	12	11.5 (6.0–20.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	18	10	54.4 (25.6–80.5)	8	45.6 (19.5–74.4)	0	0.0	0.0013
3-5	24	6	22.9 (9.2–46.5)	18	77.1 (53.5–90.8)	0	0.0	
6-10	53	11	23.0 (11.7–40.2)	38	68.4 (51.7–81.4)	4	8.6 (3.0–22.5)	
≥11	405	52	13.8 (10.4–18.1)	298	71.3 (66.0–76.1)	55	14.9 (11.2–19.5)	
Партнерський статус								
живе сам	222	35	18.6 (13.3–25.5)	163	71.0 (63.8–77.3)	24	10.3 (6.9–15.3)	0.3808
живе з партнером	278	44	15.8 (11.4–21.4)	199	69.5 (62.7–75.5)	35	14.8 (10.3–20.7)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	94	17	21.5 (12.9–33.5)	61	60.4 (48.7–70.9)	16	18.2 (11.0–28.4)	0.7604
неповний робочий день або тимчасово	273	39	15.0 (10.8–20.6)	207	73.3 (66.8–78.9)	27	11.6 (7.8–17.1)	
безробітний	104	16	17.4 (10.2–28.1)	76	70.3 (58.6–79.8)	12	12.3 (6.3–22.9)	
інвалідність	10	3	19.6 (4.2–57.5)	6	72.6 (34.2–93.1)	1	7.8 (0.7–49.6)	
інші	18	4	19.9 (6.6–46.9)	11	68.7 (41.9–87.0)	3	11.4 (3.1–34.1)	
Категорія місячного доходу								

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	70	9	10.3 (5.1–19.7)	50	71.6 (57.5–82.4)	11	18.1 (9.1–32.7)	0.7143
3-10 тис	203	21	12.1 (7.6–18.8)	157	74.5 (67.1–80.8)	25	13.3 (9.0–19.4)	
10-20 тис	140	25	18.4 (12.4–26.6)	101	69.5 (60.0–77.5)	14	12.1 (6.7–21.1)	
≥20 тис	40	4	18.0 (5.9–43.4)	30	69.4 (48.4–84.6)	6	12.6 (5.3–27.1)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	329	51	16.1 (12.2–21.1)	247	72.7 (66.9–77.8)	31	11.2 (7.7–16.0)	0.2824
так	169	28	18.8 (12.5–27.3)	113	65.1 (56.2–73.1)	28	16.1 (10.7–23.5)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	264	63	24.8 (19.2–31.4)	182	66.5 (59.5–72.9)	19	8.6 (5.1–14.2)	0.0000
так	231	15	7.0 (4.1–11.8)	176	74.5 (67.9–80.2)	40	18.5 (13.6–24.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	429	71	18.1 (14.1–22.8)	307	69.5 (64.2–74.2)	51	12.5 (9.3–16.5)	0.1012
так	63	5	7.4 (3.0–17.0)	51	80.9 (68.8–89.0)	7	11.7 (5.6–23.0)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	77	10	16.4 (7.9–30.9)	57	72.0 (58.7–82.4)	10	11.6 (6.1–20.7)	0.9265
негативний	423	69	17.1 (13.4–21.6)	305	69.8 (64.5–74.6)	49	13.1 (9.7–17.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	449	65	15.2 (11.8–19.4)	332	72.6 (67.7–77.0)	52	12.2 (9.1–16.0)	
стимулятори	18	9	59.9 (32.7–82.1)	9	40.1 (17.9–67.3)	0	0.0	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N		не знає		знає, але не користувався		користувався	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
опі+стимул	33	5	15.9 (6.0–36.1)	21	54.3 (34.0–73.3)	7	29.8 (13.2–54.1)	
інші	0	0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	475	71	15.6 (12.3–19.8)	346	71.0 (66.1–75.4)	58	13.4 (10.2–17.4)	0.0062
стимулятори	23	8	46.7 (23.3–71.6)	14	50.5 (26.7–74.2)	1	2.8 (0.3–19.7)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	0	0.0	

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	79	16.3	(13.0–20.3)
	гепатит C	229	47.9	(42.9–52.9)
	сифіліс	14	2.2	(1.3–3.8)
	гонорея	61	11.2	(8.5–14.5)
	хламідіоз	29	5.0	(3.4–7.3)
	герпес	84	16.4	(13.1–20.2)
	папіломавірус	14	3.2	(1.7–5.9)
	туберкульоз	33	7.4	(5.0–10.8)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	50	64.4	(52.3–74.9)
	пролікувався неуспішно	4	6.3	(2.3–16.5)
	не завершив	6	9.0	(4.1–18.9)
	зараз лікується	3	3.1	(1.0–9.3)
	ніколи не лікувався	15	17.1	(10.1–27.5)
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	72	30.0	(24.1–36.7)
	пролікувався неуспішно	21	10.2	(6.3–16.0)
	не завершив	14	6.7	(3.6–12.0)
	зараз лікується	16	6.5	(3.9–10.7)
	ніколи не лікувався	106	46.6	(39.5–53.8)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	14	100.0	
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	0	0.0	
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	29	83.1	(57.3–94.8)
	пролікувався неуспішно	2	12.3	(2.6–42.5)
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	2	4.6	(1.1–17.2)

	n	%	ДІ
ніколи не лікувався	0	0.0	

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

	n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців			
так	171	34.1	(29.6–38.8)
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	135	28.3	(23.9–33.0)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	72	53.4	(43.7–62.8)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	58	43.7	(34.5–53.3)
приватна клініка	14	7.7	(4.5–12.9)
приватна лабораторія	2	1.1	(0.3–4.5)
протитуберкульозного диспансеру	2	3.2	(0.7–14.4)
наркологічний диспансер	0	0.0	
ІПСШ	1	0.5	(0.1–3.7)
швидкої допомоги	8	6.0	(2.8–12.3)
мобільна амбулаторія	0	0.0	
інше	1	0.5	(0.1–3.7)
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	63	47.6	(38.1–57.3)
лікарня, ВІЛ-клініка	51	39.3	(30.4–49.1)
приватна клініка	13	7.1	(4.0–12.1)
приватна лабораторія	2	1.1	(0.3–4.5)
протитуберкульозний диспансер	1	2.6	(0.4–16.0)
наркологічна клініка	0	0.0	
ІПСШ клініка	1	0.5	(0.1–3.8)
швидка допомога	3	1.7	(0.6–5.4)
мобільна клініка	0	0.0	
інші	0	0.0	
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	124	91.4	(83.2–95.8)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	413	83.3	(79.5–86.5)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	8	2.4	(1.2–4.9)
раз на місяць	54	12.5	(9.5–16.2)
3-4 рази в 12 місяців	84	20.5	(16.4–25.3)
тільки один раз	245	64.6	(59.2–69.6)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	490	438	89.0 (85.3–91.8)	52	11.0 (8.2–14.7)	1.0000
Стать							
	чоловік	425	379	89.3 (85.7–92.2)	46	10.7 (7.8–14.3)	0.5957
	жінка	65	59	86.2 (68.8–94.7)	6	13.8 (5.3–31.2)	
Вікова категорія 4							
	<25	24	23	86.5 (43.5–98.1)	1	13.5 (1.9–56.5)	0.4111
	25-34	94	80	83.2 (71.5–90.7)	14	16.8 (9.3–28.5)	
	35-44	247	220	89.6 (85.0–92.9)	27	10.4 (7.1–15.0)	
	45+	125	115	92.6 (86.4–96.1)	10	7.4 (3.9–13.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	17	14	65.8 (29.8–89.7)	3	34.2 (10.3–70.2)	0.0139
	3-5	24	24	100.0	0	0.0	
	6-10	52	43	81.0 (63.2–91.4)	9	19.0 (8.6–36.8)	
	≥11	397	357	90.5 (87.1–93.0)	40	9.5 (7.0–12.9)	
Партнерський статус							

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	218	195	89.5 (84.4–93.1)	23	10.5 (6.9–15.6)	0.7586
живе з партнером	272	243	88.5 (83.0–92.4)	29	11.5 (7.6–17.0)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	94	81	83.8 (72.1–91.2)	13	16.2 (8.8–27.9)	0.1399
неповний робочий день або тимчасово	266	242	91.5 (87.5–94.3)	24	8.5 (5.7–12.5)	
безробітний	103	91	89.1 (81.0–94.0)	12	10.9 (6.0–19.0)	
інвалідність	9	9	100.0	0	0.0	
інші	17	14	72.6 (33.0–93.4)	3	27.4 (6.6–67.0)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	69	60	89.6 (80.3–94.8)	9	10.4 (5.2–19.7)	0.4264
3-10 тис	198	177	88.5 (82.1–92.9)	21	11.5 (7.1–17.9)	
10-20 тис	138	126	91.4 (85.2–95.2)	12	8.6 (4.8–14.8)	
≥20 тис	40	35	80.5 (56.1–93.0)	5	19.5 (7.0–43.9)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	321	286	88.7 (84.1–92.1)	35	11.3 (7.9–15.9)	0.8593
так	167	150	89.3 (82.3–93.8)	17	10.7 (6.2–17.7)	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	261	228	86.5 (80.7–90.7)	33	13.5 (9.3–19.3)	0.0429
так	224	207	92.7 (88.3–95.5)	17	7.3 (4.5–11.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	420	372	88.0 (83.9–91.2)	48	12.0 (8.8–16.1)	0.1786
так	62	58	93.8 (84.3–97.7)	4	6.2 (2.3–15.7)	
Результат тесту на ВІЛ						

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	74	70	94.6 (86.3–98.0)	4	5.4 (2.0–13.7)	0.1024
негативний	416	368	88.1 (84.0–91.3)	48	11.9 (8.7–16.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	441	403	90.5 (86.6–93.3)	38	9.5 (6.7–13.4)	
стимулятори	17	13	78.6 (51.8–92.7)	4	21.4 (7.3–48.2)	
опі+стимул	32	22	73.7 (54.9–86.6)	10	26.3 (13.4–45.1)	
інші	0	0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	466	421	89.6 (85.9–92.5)	45	10.4 (7.5–14.1)	0.0287
стимулятори	22	16	74.9 (51.8–89.2)	6	25.1 (10.8–48.2)	
інші	2	1	54.3 (0.0–100.0)	1	45.7 (0.0–100.0)	

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	222	44.0 (39.3–48.9)	210	42.0 (37.3–46.9)	53	11.1 (8.3–14.7)	15	2.9 (1.7–4.9)	1.0000
Стать										
чоловік	435	190	42.9 (37.8–48.2)	186	42.9 (37.8–48.2)	45	11.0 (8.0–15.0)	14	3.1 (1.8–5.4)	0.4764
жінка	65	32	52.1 (38.8–65.2)	24	35.3 (23.9–48.7)	8	11.3 (5.5–21.9)	1	1.3 (0.2–8.7)	
Вікова категорія 4										
<25	25	17	62.9 (37.3–82.9)	8	37.1 (17.1–62.7)	0	0.0	0	0.0	0.1816
25-34	95	45	44.8 (34.3–55.7)	35	39.6 (29.2–50.9)	9	10.1 (5.1–18.9)	6	5.6 (2.4–12.3)	
35-44	253	116	46.5 (39.9–53.3)	104	40.3 (34.0–47.1)	28	10.6 (7.3–15.3)	5	2.5 (1.0–6.3)	
45+	127	44	34.2 (25.5–44.1)	63	48.2 (38.4–58.1)	16	15.3 (8.6–25.8)	4	2.3 (0.8–6.2)	

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	18	12	60.2 (29.2–84.7)	5	31.3 (10.0–65.1)	1	8.5 (1.0–45.9)	0	0.0	0.5997
3-5	24	15	56.6 (33.9–76.8)	7	36.7 (17.8–60.8)	1	2.7 (0.3–18.8)	1	4.0 (0.5–25.7)	
6-10	53	28	52.0 (37.0–66.5)	20	39.2 (25.4–54.9)	3	5.4 (1.7–16.3)	2	3.5 (0.8–14.2)	
≥11	405	167	41.3 (36.1–46.7)	178	43.3 (38.1–48.7)	48	12.5 (9.2–16.8)	12	2.9 (1.6–5.3)	
Партнерський статус										
живе сам	222	85	36.1 (29.7–43.1)	99	47.0 (40.0–54.2)	28	12.4 (8.5–17.7)	10	4.4 (2.3–8.4)	0.0267
живе з партнером	278	137	50.0 (43.3–56.6)	111	38.2 (32.1–44.8)	25	10.1 (6.4–15.5)	5	1.7 (0.7–4.5)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	94	56	57.9 (46.5–68.4)	32	35.2 (25.2–46.7)	4	4.7 (1.7–12.2)	2	2.2 (0.5–8.8)	0.0008
неповний робочий день або тимчасово	273	120	43.7 (37.3–50.2)	120	44.8 (38.5–51.4)	25	8.3 (5.6–12.2)	8	3.2 (1.5–6.7)	
безробітний	104	36	35.4 (25.6–46.6)	47	44.7 (34.1–55.9)	17	16.9 (9.8–27.4)	4	3.0 (1.1–7.9)	
інвалідність	10	3	21.9 (4.9–60.4)	4	24.9 (6.2–62.5)	3	53.2 (17.0–86.3)	0	0.0	
інші	18	7	48.7 (22.8–75.4)	6	27.1 (10.7–53.5)	4	20.9 (6.8–48.7)	1	3.3 (0.4–23.3)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	70	15	20.9 (12.3–33.3)	37	56.3 (42.5–69.1)	14	18.6 (9.8–32.3)	4	4.3 (1.5–11.4)	0.0390
3-10 тис	203	87	43.1 (35.9–50.7)	89	42.7 (35.4–50.2)	23	11.7 (7.4–17.9)	4	2.5 (0.9–7.2)	
10-20 тис	140	72	51.9 (42.7–60.9)	56	39.0 (30.6–48.1)	9	7.3 (3.7–13.9)	3	1.8 (0.6–5.7)	
≥20 тис	40	19	41.7 (25.8–59.5)	16	43.8 (26.9–62.4)	3	9.4 (2.8–27.5)	2	5.0 (1.1–19.5)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	329	167	50.4 (44.6–56.3)	125	38.0 (32.5–43.9)	26	8.0 (5.4–11.7)	11	3.5 (1.9–6.5)	0.0005

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	169	54	32.2 (24.8–40.7)	84	49.2 (40.6–57.9)	27	16.8 (10.9–24.9)	4	1.8 (0.6–4.7)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	222	44.0 (39.3–48.9)	210	42.0 (37.3–46.9)	53	11.1 (8.3–14.7)	15	2.9 (1.7–4.9)	1.0000
Стать										
чоловік	435	190	42.9 (37.8–48.2)	186	42.9 (37.8–48.2)	45	11.0 (8.0–15.0)	14	3.1 (1.8–5.4)	0.4764
жінка	65	32	52.1 (38.8–65.2)	24	35.3 (23.9–48.7)	8	11.3 (5.5–21.9)	1	1.3 (0.2–8.7)	
Вікова категорія 4										
<25	25	17	62.9 (37.3–82.9)	8	37.1 (17.1–62.7)	0	0.0	0	0.0	0.1816
25-34	95	45	44.8 (34.3–55.7)	35	39.6 (29.2–50.9)	9	10.1 (5.1–18.9)	6	5.6 (2.4–12.3)	
35-44	253	116	46.5 (39.9–53.3)	104	40.3 (34.0–47.1)	28	10.6 (7.3–15.3)	5	2.5 (1.0–6.3)	
45+	127	44	34.2 (25.5–44.1)	63	48.2 (38.4–58.1)	16	15.3 (8.6–25.8)	4	2.3 (0.8–6.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	18	12	60.2 (29.2–84.7)	5	31.3 (10.0–65.1)	1	8.5 (1.0–45.9)	0	0.0	0.5997
3-5	24	15	56.6 (33.9–76.8)	7	36.7 (17.8–60.8)	1	2.7 (0.3–18.8)	1	4.0 (0.5–25.7)	
6-10	53	28	52.0 (37.0–66.5)	20	39.2 (25.4–54.9)	3	5.4 (1.7–16.3)	2	3.5 (0.8–14.2)	
≥11	405	167	41.3 (36.1–46.7)	178	43.3 (38.1–48.7)	48	12.5 (9.2–16.8)	12	2.9 (1.6–5.3)	
Партнерський статус										
живе сам	222	85	36.1 (29.7–43.1)	99	47.0 (40.0–54.2)	28	12.4 (8.5–17.7)	10	4.4 (2.3–8.4)	0.0267

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе з партнером	278	137	50.0 (43.3–56.6)	111	38.2 (32.1–44.8)	25	10.1 (6.4–15.5)	5	1.7 (0.7–4.5)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	94	56	57.9 (46.5–68.4)	32	35.2 (25.2–46.7)	4	4.7 (1.7–12.2)	2	2.2 (0.5–8.8)	0.0008
неповний робочий день або тимчасово	273	120	43.7 (37.3–50.2)	120	44.8 (38.5–51.4)	25	8.3 (5.6–12.2)	8	3.2 (1.5–6.7)	
безробітний	104	36	35.4 (25.6–46.6)	47	44.7 (34.1–55.9)	17	16.9 (9.8–27.4)	4	3.0 (1.1–7.9)	
інвалідність	10	3	21.9 (4.9–60.4)	4	24.9 (6.2–62.5)	3	53.2 (17.0–86.3)	0	0.0	
інші	18	7	48.7 (22.8–75.4)	6	27.1 (10.7–53.5)	4	20.9 (6.8–48.7)	1	3.3 (0.4–23.3)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	70	15	20.9 (12.3–33.3)	37	56.3 (42.5–69.1)	14	18.6 (9.8–32.3)	4	4.3 (1.5–11.4)	0.0390
3-10 тис	203	87	43.1 (35.9–50.7)	89	42.7 (35.4–50.2)	23	11.7 (7.4–17.9)	4	2.5 (0.9–7.2)	
10-20 тис	140	72	51.9 (42.7–60.9)	56	39.0 (30.6–48.1)	9	7.3 (3.7–13.9)	3	1.8 (0.6–5.7)	
≥20 тис	40	19	41.7 (25.8–59.5)	16	43.8 (26.9–62.4)	3	9.4 (2.8–27.5)	2	5.0 (1.1–19.5)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	329	167	50.4 (44.6–56.3)	125	38.0 (32.5–43.9)	26	8.0 (5.4–11.7)	11	3.5 (1.9–6.5)	0.0005
так	169	54	32.2 (24.8–40.7)	84	49.2 (40.6–57.9)	27	16.8 (10.9–24.9)	4	1.8 (0.6–4.7)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	274	54.0 (49.1–58.9)	197	39.6 (34.9–44.5)	26	5.9 (3.8–8.9)	3	0.5 (0.2–1.5)	1.0000

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Стать										
чоловік	435	238	53.4 (48.1–58.6)	173	40.3 (35.2–45.6)	22	6.0 (3.7–9.4)	2	0.4 (0.1–1.6)	0.6357
жінка	65	36	58.9 (45.5–71.0)	24	34.8 (23.6–48.0)	4	5.1 (1.8–13.9)	1	1.3 (0.2–8.7)	
Вікова категорія 4										
<25	25	20	77.0 (47.6–92.5)	5	23.0 (7.5–52.4)	0	0.0	0	0.0	0.2763
25-34	95	58	60.0 (48.7–70.3)	31	33.6 (23.8–45.0)	4	4.6 (1.7–11.9)	2	1.8 (0.4–7.1)	
35-44	253	131	51.5 (44.8–58.2)	105	41.8 (35.3–48.6)	16	6.4 (3.8–10.6)	1	0.3 (0.0–2.2)	
45+	127	65	49.1 (39.2–59.0)	56	43.7 (34.1–53.8)	6	7.2 (2.8–17.2)	0	0.0	
Років з початку ін’єкційного вживання наркотиків										
≤2	18	11	57.7 (27.7–82.9)	7	42.3 (17.1–72.3)	0	0.0	0	0.0	0.1382
3-5	24	18	78.4 (56.8–90.9)	4	14.9 (5.1–36.2)	1	2.7 (0.3–18.8)	1	4.0 (0.5–25.7)	
6-10	53	33	59.6 (43.9–73.6)	18	36.9 (23.3–53.0)	2	3.5 (0.8–14.2)	0	0.0	
≥11	405	212	51.6 (46.2–57.0)	168	41.3 (36.1–46.7)	23	6.7 (4.2–10.4)	2	0.4 (0.1–1.5)	
Партнерський статус										
живе сам	222	109	48.3 (41.2–55.4)	99	45.1 (38.0–52.3)	13	6.3 (3.6–10.9)	1	0.4 (0.0–2.5)	0.1988
живе з партнером	278	165	58.3 (51.6–64.8)	98	35.5 (29.4–42.2)	13	5.5 (2.9–10.3)	2	0.6 (0.1–2.4)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	94	61	60.8 (49.1–71.3)	29	34.3 (24.2–46.2)	3	4.1 (1.3–12.0)	1	0.8 (0.1–5.8)	0.3330
неповний робочий день або тимчасово	273	149	54.6 (48.1–60.9)	107	38.9 (32.8–45.4)	15	5.9 (3.4–10.0)	2	0.6 (0.2–2.6)	

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	104	50	49.0 (38.1–60.0)	48	46.3 (35.5–57.5)	6	4.7 (2.1–10.3)	0	0.0	
інвалідність	10	5	35.0 (9.7–72.9)	4	35.0 (8.8–75.1)	1	30.0 (3.7–82.6)	0	0.0	
інші	18	9	58.4 (31.5–81.1)	8	35.2 (15.3–62.0)	1	6.4 (0.8–38.0)	0	0.0	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	70	26	34.5 (23.2–47.8)	40	59.9 (46.3–72.1)	4	5.7 (1.9–15.8)	0	0.0	0.0083
3-10 тис	203	121	60.0 (52.3–67.1)	67	30.9 (24.5–38.2)	14	8.7 (4.8–15.3)	1	0.4 (0.1–2.7)	
10-20 тис	140	85	60.2 (51.1–68.8)	48	35.0 (26.9–44.1)	5	3.5 (1.4–8.5)	2	1.3 (0.3–5.1)	
≥20 тис	40	22	49.7 (32.3–67.3)	16	45.2 (28.1–63.6)	2	5.0 (1.1–19.5)	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	329	189	57.7 (51.8–63.3)	121	36.5 (31.0–42.3)	16	5.1 (3.0–8.4)	3	0.8 (0.2–2.4)	0.1436
так	169	84	47.5 (39.0–56.1)	75	45.2 (36.7–54.0)	10	7.3 (3.5–14.6)	0	0.0	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	264	145	53.7 (46.8–60.5)	107	41.5 (34.8–48.4)	11	4.6 (2.2–9.1)	1	0.3 (0.0–1.9)	0.4772
так	231	124	53.7 (46.7–60.5)	90	38.0 (31.5–44.9)	15	7.6 (4.5–12.6)	2	0.8 (0.2–3.1)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	429	228	52.6 (47.3–57.8)	179	41.8 (36.7–47.1)	20	5.2 (3.2–8.6)	2	0.4 (0.1–1.6)	0.0203
так	63	42	67.0 (53.7–78.0)	15	21.6 (13.1–33.7)	5	10.1 (4.1–22.9)	1	1.3 (0.2–9.0)	
Результат тесту на ВІЛ										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	77	31	40.0 (28.9–52.1)	41	54.4 (42.3–66.1)	3	3.2 (1.0–9.8)	2	2.4 (0.6–9.6)	0.0011
негативний	423	243	56.3 (50.9–61.5)	156	37.2 (32.2–42.5)	23	6.3 (4.0–9.8)	1	0.2 (0.0–1.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	449	254	56.2 (51.1–61.3)	174	38.5 (33.7–43.6)	19	4.9 (2.9–8.1)	2	0.3 (0.1–1.4)	
стимулятори	18	11	48.8 (22.9–75.4)	5	41.5 (16.5–71.9)	2	9.6 (1.9–36.7)	0	0.0	
опі+стимул	33	9	27.2 (13.6–47.1)	18	53.0 (33.5–71.7)	5	17.0 (6.5–37.3)	1	2.8 (0.4–18.9)	
інші	0	0		0		0		0		
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	475	262	54.7 (49.7–59.6)	187	39.2 (34.4–44.2)	23	5.6 (3.6–8.8)	3	0.5 (0.2–1.6)	0.2491
стимулятори	23	11	41.2 (20.7–65.3)	10	50.9 (27.2–74.3)	2	7.9 (1.6–31.2)	0	0.0	
інші	2	1	45.7 (0.0–100.0)	0	0.0	1	54.3 (0.0–100.0)	0	0.0	

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	83	15.5	(12.5–19.0)
збут наркотиків	4	0.8	(0.3–2.2)
зберігання наркотиків	41	7.9	(5.8–10.8)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	70	12.7	(10.0–15.9)
збут наркотиків	3	0.7	(0.2–2.5)
зберігання наркотиків	32	6.3	(4.4–8.9)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	374	75.7	(71.3–79.6)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	169	35.4	(30.7–40.3)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	19	9.7	(6.2–15.0)
6м-2р	37	21.7	(15.2–29.9)
2-4р	73	43.4	(35.1–52.1)
4 роки +	40	25.2	(18.2–33.9)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	12	8.1	(4.1–15.2)
1-3р	25	14.4	(9.6–21.1)
3-5р	18	10.0	(6.2–15.9)
5-10р	40	26.6	(19.2–35.5)
10 років +	73	41.0	(32.8–49.6)

	n	%	ДІ
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	91	53.8	(45.1–62.3)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	291	57.2	(52.2–61.9)
так, за останні 6м	39	8.4	(6.0–11.7)
так, але 6+ місяців тому	170	34.5	(29.9–39.3)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	191	37.7	(33.1–42.5)
так, за останні 6м	70	14.2	(11.2–18.0)
так, але 6+ місяців тому	237	48.1	(43.2–53.0)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	445	88.5	(84.9–91.3)
так, за останні 6м	11	2.5	(1.4–4.7)
так, але 6+ місяців тому	43	9.0	(6.5–12.3)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	423	84.2	(80.2–87.5)
так	75	15.8	(12.5–19.8)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	307	62.4	(57.7–67.0)
так	193	37.6	(33.0–42.3)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
ні	108	57.2	(49.5–64.5)
так	85	42.8	(35.5–50.5)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців			
ні	332	69.1	(64.7–73.3)

		n	%	ДІ
	так	167	30.9	(26.7–35.3)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

		Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	498	75	15.8 (12.5–19.8)	1.0000	193	85	42.8 (35.5–50.5)	1.0000
Стать									
	чоловік	433	67	16.5 (12.8–20.9)	0.2599	167	73	42.3 (34.5–50.5)	0.6669
	жінка	65	8	11.0 (5.4–21.2)		26	12	47.0 (28.3–66.5)	
Вікова категорія 4									
	<25	25	10	42.7 (21.5–67.0)	0.0013	7	5	77.9 (37.2–95.5)	0.0001
	25-34	95	18	17.4 (10.9–26.5)		39	24	63.0 (46.2–77.2)	
	35-44	252	35	15.3 (10.8–21.3)		94	43	45.3 (34.9–56.1)	
	45+	126	12	9.1 (5.1–15.8)		53	13	19.7 (11.1–32.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків									

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
≤2	18	6	35.6 (12.8–67.6)	0.1351	4	2	37.8 (6.5–84.2)	0.0639
3-5	24	4	22.4 (8.2–48.4)		3	3	100.0	
6-10	53	11	16.4 (8.9–28.3)		21	13	61.6 (38.0–80.8)	
≥11	403	54	14.2 (10.8–18.6)		165	67	39.2 (31.6–47.5)	
Партнерський статус								
живе сам	222	33	17.0 (11.7–24.1)	0.5677	78	35	43.3 (32.1–55.2)	0.9199
живе з партнером	276	42	14.9 (10.9–19.9)		115	50	42.5 (33.1–52.5)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	94	12	13.9 (7.7–23.8)	0.7141	34	10	28.9 (15.5–47.2)	0.0307
неповний робочий день або тимчасово	272	43	16.7 (12.2–22.4)		115	59	53.0 (43.3–62.5)	
безробітний	104	17	17.2 (10.1–27.6)		32	12	33.3 (18.6–52.2)	
інвалідність	10	0	0.0		5	0	0.0	
інші	18	3	14.5 (4.0–41.1)		7	4	51.2 (17.0–84.3)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	70	11	19.7 (10.2–34.5)	0.0640	19	8	40.4 (20.3–64.3)	0.0542
3-10 тис	203	42	21.8 (16.0–28.9)		76	42	55.8 (43.4–67.5)	
10-20 тис	139	17	10.7 (6.6–17.0)		65	23	34.6 (23.5–47.8)	
≥20 тис	40	2	7.0 (1.6–26.4)		21	8	31.6 (15.3–54.1)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	327	48	15.0 (11.2–19.9)	0.5585	115	61	51.6 (42.0–61.2)	0.0062

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
так	169	27	17.4 (11.6–25.2)		78	24	30.1 (20.2–42.3)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	262	38	15.3 (10.8–21.3)	0.7286	110	51	43.7 (34.0–54.0)	0.7355
так	231	37	16.6 (12.1–22.5)		81	33	41.1 (30.3–52.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	427	70	17.3 (13.6–21.8)	0.0236	170	76	42.8 (35.0–51.0)	0.8860
так	63	4	6.0 (2.2–15.6)		21	8	41.0 (21.3–64.1)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	76	10	18.3 (9.2–33.2)	0.6262	20	10	49.5 (28.3–70.8)	0.5450
негативний	422	65	15.4 (12.0–19.6)		173	75	42.2 (34.5–50.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	447	62	14.0 (10.8–18.0)		173	73	40.9 (33.3–49.0)	
стимулятори	18	3	28.7 (7.7–66.1)		6	4	67.7 (23.4–93.5)	
опі+стимул	33	10	32.2 (16.7–52.9)		14	8	57.4 (30.4–80.6)	
інші	0	0			0	0		
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання								
опіоїди	473	69	15.0 (11.8–18.9)	0.1080	183	80	42.3 (34.8–50.2)	0.4806
стимулятори	23	6	33.3 (12.7–63.2)		9	5	57.6 (23.1–86.0)	
інші	2	0	0.0		1	0	0.0	

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	163	33.5	(29.1–38.3)
так, з інших причин	3	0.5	(0.2–1.5)
ні	334	66.0	(61.2–70.4)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	0	0.0	
інша країна	10	6.3	(3.2–11.8)
інша область	52	34.5	(26.7–43.2)
інше місто	41	23.4	(17.3–30.8)
інший район	54	32.0	(24.7–40.3)
інший будинок	6	3.9	(1.6–8.8)
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			
та сама область	144	84.7	(76.2–90.6)
інша область	20	15.3	(9.4–23.8)
інша країна	0	0.0	




Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)



Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)

Результати для міста: Черкаси




Рис. А. Мережа рекрутингу RDS у місті Черкаси

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	500	39.8	(39.1–40.5)	40	(35–46)
Вік першого неін'єкційного вживання наркотиків	462	16.4	(16.2–16.7)	16	(15–18)
Років з початку неін'єкційного вживання наркотиків	462	23.4	(22.6–24.2)	24	(17–29)
Вік першого ін'єкційного вживання наркотиків	500	20.6	(20.2–20.9)	20	(18–22)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків	500	19.2	(18.4–20.0)	19	(12–26)
Особистий місячний дохід, грн	499	7,053.3	(6290.6–7815.9)	5,000	(1500–10000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

		Сайт	n	%	ДІ
Стать					
	чоловік	Черкаси	343	67.5	(62.9–71.8)
	жінка	Черкаси	157	32.5	(28.2–37.1)
Вікова категорія 4					
	<25	Черкаси	8	1.7	(0.8–3.5)
	25-34	Черкаси	126	23.3	(19.6–27.4)
	35-44	Черкаси	227	46.2	(41.4–51.0)
	45+	Черкаси	139	28.8	(24.7–33.4)
Сімейний стан					
	одружений або проживають разом	Черкаси	78	15.4	(12.3–19.2)
	одружений, але має іншого партнера	Черкаси	43	9.1	(6.7–12.3)
	не одружений, але є партнер	Черкаси	188	35.9	(31.5–40.5)
	одружений, але не живуть разом	Черкаси	59	11.7	(8.9–15.3)
	не одружений та не мають партнера	Черкаси	132	27.8	(23.6–32.4)
Партнерський статус					
	живе сам	Черкаси	191	39.5	(34.9–44.4)
	живе з партнером	Черкаси	309	60.5	(55.6–65.1)
Освіта 3 категорії					
	незак. середня школа	Черкаси	15	2.8	(1.5–5.4)
	середня школа	Черкаси	228	47.4	(42.6–52.2)
	> середня школа	Черкаси	257	49.8	(45.0–54.6)
Поточна професія					
	учень школи	Черкаси	0	0.0	
	студент коледжу/університету	Черкаси	5	0.8	(0.3–2.0)
	постійна робота	Черкаси	103	19.7	(16.3–23.7)
	непостійна робота	Черкаси	277	57.2	(52.4–61.8)
	безробітний	Черкаси	31	5.5	(3.9–7.9)
	домогосподарка	Черкаси	21	3.9	(2.5–6.2)
	інвалідність	Черкаси	20	3.9	(2.3–6.6)
	військовий	Черкаси	3	0.7	(0.2–2.3)
	інші	Черкаси	40	8.2	(5.9–11.2)
Безхатченко					
	ніколи	Черкаси	459	92.6	(89.9–94.6)
	так, 12м+ тому	Черкаси	41	7.4	(5.4–10.1)

	Сайт	n	%	ДІ
так, за останні 12м	Черкаси	0	0.0	
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Черкаси	41	100.0	
так	Черкаси	0	0.0	
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Черкаси	156	34.7	(30.2–39.5)
3-10 тис	Черкаси	189	36.2	(31.8–40.9)
10-20 тис	Черкаси	128	24.6	(20.8–28.8)
≥20 тис	Черкаси	26	4.5	(3.0–6.7)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Черкаси	153	34.2	(29.7–39.0)
≥2684	Черкаси	346	65.8	(61.0–70.3)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Черкаси	10	1.9	(1.0–3.5)
3-5	Черкаси	18	3.4	(2.1–5.4)
6-10	Черкаси	69	13.2	(10.4–16.6)
≥11	Черкаси	403	81.6	(77.7–84.8)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Сайт	n	%	ДІ
власне житло	Черкаси	261	52.6	(47.8–57.3)
у друзів або родичів	Черкаси	171	33.9	(29.5–38.6)
оренда	Черкаси	58	12.0	(9.2–15.5)
різне	Черкаси	11	1.8	(1.0–3.4)
на вулиці (безхатько)	Черкаси	0	0.0	
у притулку для біженців	Черкаси	1	0.2	(0.0–1.2)




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

			Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього											
	Разом	500	305	58.6 (53.7–63.3)	45	8.5 (6.2–11.4)	148	32.7 (28.2–37.5)	2	0.3 (0.1–1.2)	1.0000
Стать											
	чоловік	343	214	59.3 (53.3–64.9)	27	7.9 (5.3–11.6)	101	32.7 (27.2–38.6)	1	0.2 (0.0–1.3)	0.8201

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
жінка	157	91	57.2 (48.6–65.3)	18	9.7 (5.9–15.5)	47	32.7 (25.1–41.3)	1	0.5 (0.1–3.6)	
Вікова категорія 4										
<25	8	7	84.2 (29.2–98.6)	1	15.8 (1.4–70.8)	0	0.0	0	0.0	0.1204
25-34	126	65	49.9 (40.5–59.4)	17	11.4 (7.0–18.1)	44	38.6 (29.5–48.6)	0	0.0	
35-44	227	141	57.9 (50.5–64.9)	23	9.9 (6.4–15.1)	62	31.8 (25.3–39.2)	1	0.4 (0.0–2.5)	
45+	139	92	65.2 (56.2–73.3)	4	3.3 (1.2–8.6)	42	31.1 (23.3–40.0)	1	0.4 (0.1–3.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	10	6	51.0 (18.7–82.5)	1	14.4 (1.5–64.9)	3	34.6 (9.3–73.2)	0	0.0	0.2083
3-5	18	13	68.5 (40.9–87.2)	2	11.5 (2.3–41.2)	3	20.0 (6.1–49.1)	0	0.0	
6-10	69	45	63.8 (51.0–75.0)	12	16.4 (9.3–27.5)	12	19.7 (11.2–32.3)	0	0.0	
≥11	403	241	57.5 (52.0–62.8)	30	6.9 (4.7–10.1)	130	35.2 (30.2–40.7)	2	0.4 (0.1–1.4)	
Партнерський статус										
живе сам	191	108	54.2 (46.1–62.0)	21	9.1 (5.7–14.0)	60	36.1 (28.5–44.4)	2	0.7 (0.2–2.9)	0.2240
живе з партнером	309	197	61.5 (55.4–67.2)	24	8.1 (5.3–12.1)	88	30.4 (25.1–36.3)	0	0.0	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	103	67	63.9 (53.3–73.2)	10	9.6 (5.1–17.5)	25	25.9 (17.7–36.2)	1	0.6 (0.1–4.3)	0.0093
неповний робочий день або тимчасово	277	171	59.2 (52.6–65.5)	15	5.2 (3.0–9.0)	91	35.5 (29.5–42.1)	0	0.0	
безробітний	31	20	65.0 (45.8–80.4)	7	22.1 (10.2–41.3)	4	12.9 (4.6–31.0)	0	0.0	

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
інвалідність	20	17	73.8 (34.2–93.9)	0	0.0	3	26.2 (6.1–65.8)	0	0.0	
інші	69	30	41.3 (29.6–54.2)	13	17.2 (9.6–28.8)	25	40.3 (28.4–53.4)	1	1.2 (0.2–8.4)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	156	69	44.1 (35.8–52.8)	7	4.8 (2.2–10.0)	80	51.1 (42.6–59.6)	0	0.0	0.0000
3-10 тис	189	126	64.7 (56.5–72.1)	19	8.6 (5.3–13.7)	42	25.9 (19.0–34.2)	2	0.8 (0.2–3.2)	
10-20 тис	128	92	69.4 (59.9–77.6)	12	9.5 (5.2–16.8)	24	21.1 (14.1–30.2)	0	0.0	
≥20 тис	26	17	60.5 (38.8–78.8)	7	30.4 (14.5–53.0)	2	9.0 (2.0–32.7)	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	426	253	57.3 (52.1–62.3)	37	8.2 (5.9–11.5)	134	34.2 (29.3–39.3)	2	0.3 (0.1–1.3)	0.3311
так	74	52	67.3 (53.1–78.9)	8	10.0 (4.8–19.7)	14	22.8 (12.5–38.0)	0	0.0	

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	190	110	55.2 (47.5–62.7)	28	15.0 (10.2–21.5)	52	29.8 (23.2–37.4)	0	0.0	0.0006
так	310	195	60.7 (54.4–66.6)	17	4.5 (2.7–7.3)	96	34.4 (28.6–40.7)	2	0.5 (0.1–1.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	405	233	54.9 (49.6–60.2)	42	9.8 (7.1–13.3)	130	35.2 (30.2–40.6)	0	0.0	0.0002
так	94	71	74.7 (62.8–83.8)	3	2.5 (0.8–7.8)	18	21.2 (12.7–33.4)	2	1.6 (0.4–6.4)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	87	58	66.9 (54.6–77.2)	6	5.5 (2.4–12.1)	22	26.9 (17.2–39.5)	1	0.7 (0.1–5.1)	0.2580

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
негативний	413	247	56.9 (51.6–62.0)	39	9.1 (6.5–12.5)	126	33.8 (28.9–39.1)	1	0.2 (0.0–1.4)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	433	299	66.1 (60.9–71.0)	3	0.8 (0.2–2.9)	130	32.8 (28.0–38.0)	1	0.2 (0.0–1.4)	0.0000
стимулятори	64	4	6.4 (2.0–18.2)	42	60.8 (46.8–73.3)	18	32.8 (21.2–47.0)	0	0.0	
інші	2	1	62.8 (0.0–100.0)	0	0.0	0	0.0	1	37.2 (0.0–100.0)	

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
	n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
Частота ін'єкцій: останні 24 години									
0 разів	85	28.8	20	44.6	34	26.2	2	100.0	0.2403
1 раз	186	61.4	20	43.3	103	66.0	0	0.0	
2-3 рази	32	9.3	5	12.0	11	7.8	0	0.0	
4+ рази	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
N	305		45		148		2		
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)									
1 раз	186	86.2	20	78.2	103	89.5	0	0.0	
2-3 рази	32	13.1	5	21.8	11	10.5	0	0.0	
4+ рази	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
N	220		25		114		0		
Частота ін'єкцій: останній тиждень									
0 разів	0	0.0	1	2.5	1	0.5	2	100.0	0.0000
1-6 разів	226	75.1	34	74.5	121	81.0	0	0.0	
кожен день	79	24.9	9	23.0	26	18.5	0	0.0	
N	305		44		148		2		
Частота ін'єкцій: останні 30 днів									
1-9 разів	26	8.4	3	8.0	3	1.8	0	0.0	
10-19 разів	66	20.5	19	39.7	28	19.5	0	0.0	
20-29 разів	104	35.1	12	23.3	52	36.6	0	0.0	
кожен день	109	36.0	11	29.0	65	42.1	0	0.0	
N	305		45		148		0		
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів									
0-9 разів	28	9.1	2	5.6	5	2.7	0	0.0	0.0552
10-19 разів	71	22.7	21	43.5	35	25.2	1	57.7	
20-29 разів	96	32.3	11	20.1	41	29.2	0	0.0	
кожен день	110	35.9	11	30.7	67	42.8	1	42.3	
N	305		45		148		2		

Таблиця 2.4. Ін'єкційний вид наркотику на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	149	38.2	7	12.4	0	0.0
3-10 тис	163	36.6	24	32.8	2	100.0
10-20 тис	103	22.1	24	40.7	0	0.0
≥20 тис	17	3.2	9	14.0	0	0.0
N	432		64		2	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
Разом		опіоїди		стимулятори		інші		
n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
готую сам								
14	2.7	12	2.7	2	2.9	0	0.0	0.9688
приготовлене друзями								
13	2.7	10	2.4	3	5.3	0	0.0	0.4029
від дилера								
378	78.6	342	81.3	33	59.7	2	100.0	0.0004
куплене в Інтернеті								
160	30.6	128	29.0	32	42.6	0	0.0	0.0640
з програми ЗПТ								
1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0.9212
інше								
3	0.6	1	0.3	2	2.4	0	0.0	0.1252
N								
569		494		72		2		
з аптеки								
		0	0.0	0	0.0	0	0.0	




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін’єкції використовував чистий шприц			
так	492	98.7	(97.3–99.4)
Джерело шприца для останньої ін’єкції			
купив в аптеці	199	40.4	(35.8–45.1)
отримав в аптеці	3	0.6	(0.2–2.0)
отримав від НУО	268	54.0	(49.2–58.7)
отримав від друга	23	3.6	(2.4–5.4)
отримав вживаний від друга	5	1.0	(0.4–2.5)
використовував вживаний свій	1	0.3	(0.0–1.9)
отримав заповнений	0	0.0	
інші	1	0.2	(0.0–1.2)
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	92	20.6	(16.8–24.9)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	113	25.4	(21.3–30.0)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	112	25.0	(21.0–29.6)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	113	24.6	(20.5–29.2)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	98	21.2	(17.4–25.6)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	143	31.6	(27.3–36.4)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	224	47.6	(42.8–52.4)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	0	0.0	
часто	16	21.6	(13.4–32.9)
половина	53	57.6	(46.3–68.2)
іноді	13	12.3	(6.9–21.0)
рідко	3	3.1	(1.0–9.4)
ніколи	7	5.3	(2.5–11.1)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	55	11.5	(8.8–15.0)
часто	82	18.4	(14.9–22.6)
половина	133	30.8	(26.2–35.7)
іноді	64	14.4	(11.1–18.5)
рідко	29	6.9	(4.7–9.9)
ніколи	85	18.0	(14.6–22.1)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			

	n	%	ДІ
1-9	88	91.8	(79.7–97.0)
10-29	4	3.5	(1.2–9.4)
30+	2	4.7	(1.0–20.1)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	40	40.5	(30.2–51.7)
2-3	47	49.9	(38.8–61.1)
4-9	5	5.1	(2.1–12.1)
10+	2	4.4	(0.8–20.3)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	67	61.7	(51.7–70.8)
від друзів	41	34.9	(26.1–44.8)
із закладки	5	3.5	(1.4–8.2)
Хтось використав один шприц для ін'єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	411	80.9	(76.7–84.5)
так	87	19.1	(15.5–23.3)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін'єкцій (%)




Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	500	92	20.6 (16.8–24.9)	1.0000	499	113	25.4 (21.3–30.0)	1.0000
Стать									
	чоловік	343	55	18.4 (14.0–23.7)	0.1243	343	74	24.9 (19.9–30.5)	0.7002
	жінка	157	37	25.1 (18.3–33.4)		156	39	26.7 (19.7–35.1)	
Вікова категорія 4									

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<25	8	2	35.6 (6.8–80.7)	0.1170	8	3	43.8 (10.9–83.2)	0.3988
25-34	126	26	23.6 (15.8–33.7)		125	32	26.5 (19.0–35.6)	
35-44	227	33	15.3 (10.8–21.3)		227	42	22.2 (16.4–29.3)	
45+	139	31	25.6 (18.2–34.6)		139	36	28.8 (21.1–37.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	10	0	0.0	0.0278	10	3	34.2 (9.4–72.3)	0.6704
3-5	18	0	0.0		18	3	18.0 (5.3–46.6)	
6-10	69	9	14.1 (7.1–26.0)		68	13	20.9 (12.0–33.8)	
≥11	403	83	22.9 (18.5–28.0)		403	94	26.3 (21.7–31.5)	
Партнерський статус								
живе сам	191	35	21.0 (14.9–28.7)	0.8737	191	36	21.2 (15.2–28.9)	0.1364
живе з партнером	309	57	20.3 (15.7–25.7)		308	77	28.2 (22.9–34.1)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	103	11	11.6 (6.1–20.8)	0.0013	103	18	19.3 (12.0–29.5)	0.1018
неповний робочий день або тимчасово	277	60	25.0 (19.6–31.5)		277	74	29.9 (24.2–36.3)	
безробітний	31	1	3.0 (0.4–19.8)		31	2	6.0 (1.4–22.1)	
інвалідність	20	0	0.0		20	3	28.3 (7.3–66.4)	
інші	69	20	27.7 (18.1–40.0)		68	16	22.5 (13.8–34.5)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	156	64	41.1 (33.0–49.8)	0.0000	156	60	40.3 (32.2–49.0)	0.0000
3-10 тис	189	16	10.4 (5.9–17.5)		188	32	19.7 (13.7–27.5)	
10-20 тис	128	10	8.9 (4.5–16.7)		128	18	15.4 (9.6–23.7)	
≥20 тис	26	2	8.2 (1.9–29.2)		26	3	12.3 (3.6–34.7)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	426	88	22.6 (18.4–27.4)	0.0136	425	105	26.9 (22.5–31.9)	0.1511
так	74	4	7.1 (2.4–19.0)		74	8	15.5 (6.6–32.2)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	190	19	10.2 (6.4–15.8)	0.0000	189	37	21.5 (15.7–28.6)	0.1537
так	310	73	26.9 (21.6–33.0)		310	76	27.9 (22.5–34.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	405	79	22.0 (17.7–27.0)	0.1187	404	102	28.0 (23.4–33.2)	0.0293
так	94	13	14.1 (8.0–23.7)		94	11	13.9 (6.9–26.1)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	87	14	15.7 (9.0–25.7)	0.2516	87	10	13.2 (6.2–26.1)	0.0301
негативний	413	78	21.6 (17.3–26.5)		412	103	27.9 (23.4–33.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	305	36	12.7 (9.1–17.5)	0.0000	305	47	16.5 (12.4–21.7)	0.0000
стимулятори	45	0	0.0		44	3	5.6 (1.7–17.0)	
опі+стимул	148	56	40.1 (31.6–49.3)		148	63	46.7 (37.9–55.8)	
інші	2	0	0.0		2	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	433	92	23.7 (19.4–28.6)	0.0001	433	106	27.5 (23.0–32.5)	0.0390
стимулятори	64	0	0.0		63	7	12.4 (5.6–25.2)	
інші	2	0	0.0		2	0	0.0	

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
	Разом	112	25.0 (21.0–29.6)	1.0000	500	113	24.6 (20.5–29.2)	1.0000
Стать								
	чоловік	80	25.3 (20.5–30.9)	0.8440	343	75	23.6 (18.8–29.2)	0.5266

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
жінка	32	24.4 (17.5–33.0)		157	38	26.6 (19.6–35.1)	
Вікова категорія 4							
<25	1	23.5 (2.4–79.6)	0.4894	8	1	23.5 (2.4–79.6)	0.8653
25-34	26	22.6 (15.0–32.5)		126	29	25.3 (17.4–35.4)	
35-44	44	22.8 (17.1–29.7)		227	45	22.6 (16.9–29.7)	
45+	41	30.7 (23.0–39.6)		139	38	27.2 (19.9–35.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
≤2	1	8.9 (0.9–51.7)	0.0095	10	2	23.3 (4.6–65.8)	0.8659
3-5	0	0.0		18	3	17.5 (5.0–46.1)	
6-10	9	15.3 (7.7–28.1)		69	13	22.0 (12.7–35.2)	
≥11	102	28.0 (23.3–33.3)		403	95	25.3 (20.8–30.5)	
Партнерський статус							
живе сам	46	26.9 (20.2–34.8)	0.5044	191	41	23.1 (16.7–31.2)	0.6093
живе з партнером	66	23.8 (18.9–29.5)		309	72	25.5 (20.5–31.3)	
Поточний статус зайнятості							
повний робочий день	19	20.1 (12.7–30.4)	0.0827	103	16	15.5 (9.3–24.9)	0.2874
неповний робочий день або тимчасово	69	28.1 (22.4–34.5)		277	66	26.8 (21.2–33.3)	
безробітний	4	13.4 (4.9–31.8)		31	6	20.7 (9.2–40.4)	
інвалідність	2	7.1 (1.5–27.5)		20	5	34.0 (11.2–67.7)	
інші	18	29.3 (18.8–42.6)		69	20	27.2 (17.7–39.4)	
Категорія місячного доходу							
<3 тис	63	40.9 (32.8–49.5)	0.0000	156	43	27.1 (20.2–35.3)	0.5851
3-10 тис	34	21.4 (15.1–29.3)		189	43	25.6 (18.7–33.9)	
10-20 тис	12	10.8 (6.0–18.8)		128	22	20.4 (13.5–29.5)	
≥20 тис	3	11.3 (3.4–31.5)		26	4	18.1 (6.5–41.1)	
Був позбавлений волі будь-коли							

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
	ні	106	27.5 (23.0–32.5)	0.0032	426	101	25.0 (20.7–29.9)	0.6468
	так	6	8.8 (3.6–20.0)		74	12	21.7 (11.4–37.4)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ							
ні	33	19.8 (14.2–26.9)	0.0586	190	33	18.2 (13.0–24.9)	0.0194
так	79	28.3 (22.9–34.3)		310	80	28.5 (23.0–34.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)							
ні	96	27.0 (22.3–32.2)	0.0376	405	92	25.0 (20.5–30.1)	0.7256
так	16	16.3 (10.0–25.5)		94	21	23.0 (14.3–34.7)	
Результат тесту на ВІЛ							
позитивний	15	16.5 (9.9–26.2)	0.0524	87	15	19.6 (11.0–32.4)	0.3398
негативний	97	26.8 (22.2–32.0)		413	98	25.6 (21.1–30.6)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
опіоїди	41	14.7 (10.8–19.6)	0.0000	305	50	17.6 (13.3–22.8)	0.0000
стимулятори	2	6.1 (1.2–25.4)		45	5	8.9 (3.5–20.6)	
опі+стимул	69	48.8 (39.9–57.7)		148	56	40.6 (31.9–49.9)	
інші	0	0.0		2	2	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання							
опіоїди	107	27.7 (23.2–32.8)	0.0038	433	100	25.5 (21.1–30.5)	0.4144
стимулятори	5	7.8 (2.9–19.6)		64	12	18.3 (10.1–31.0)	
інші	0	0.0		2	1	37.2 (0.0–100.0)	

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	473	93.8	(90.7–95.9)	150	96.5	(92.5–98.4)	323	92.6	(88.1–95.4)	0.0933
N	500			157			343			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	452	96.3	(94.2–97.6)	147	98.2	(94.4–99.4)	305	95.3	(92.5–97.1)	0.1154
N	473			150			323			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	320	67.0	(62.3–71.5)	111	71.7	(63.1–79.1)	209	64.7	(58.8–70.1)	0.1674
N	473			150			323			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	266	84.5	(79.7–88.3)	82	72.0	(62.0–80.3)	184	91.6	(87.1–94.6)	0.0000
N	315			111			204			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	25	6.4	(4.3–9.5)	4	2.8	(1.0–7.3)	21	8.5	(5.5–12.9)	0.0296
N	315			111			204			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	7	1.8	(0.8–3.8)	0	0.0		7	2.8	(1.3–5.9)	0.0524
N	315			111			204			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	41	13.8	(10.1–18.6)	40	37.5	(28.3–47.7)	1	0.4	(0.0–2.5)	0.0000
N	315			111			204			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										
так	320	69.1	(64.4–73.4)	98	67.1	(58.6–74.6)	222	70.1	(64.4–75.2)	0.5470
N	469			149			320			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	317	70.7	(66.0–75.0)	98	67.9	(59.4–75.4)	219	72.1	(66.4–77.2)	0.3940
N	452			147			305			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	232	73.0	(67.4–77.9)	77	69.6	(59.7–77.9)	155	74.8	(68.0–80.6)	0.3468
N	320			111			209			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	37	7.4	(5.3–10.2)	25	15.1	(10.1–22.1)	12	3.5	(1.9–6.2)	0.0000
N	473			150			323			
Надавав секс-послуги за гроші										
так	77	16.8	(13.4–20.8)	67	44.3	(36.0–53.0)	10	3.0	(1.6–5.6)	0.0000
N	473			150			323			
Платив за секс коли-небудь										
так	64	12.8	(10.0–16.3)	7	4.7	(2.2–9.8)	57	16.9	(13.0–21.6)	0.0005
N	472			150			322			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	15	24.8	(15.1–38.0)	5	68.0	(28.3–92.0)	10	18.7	(9.9–32.6)	0.0073
N	64			7			57			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	333	71.6	(67.0–75.9)	100	65.3	(56.6–73.2)	233	74.9	(69.4–79.6)	0.0000
випадковий	80	16.6	(13.3–20.5)	11	7.9	(4.2–14.4)	69	21.0	(16.7–26.2)	
ком. секс (я заплатив)	13	2.7	(1.5–4.8)	0	0.0		13	4.1	(2.3–7.2)	
ком. секс (мені заплатили)	39	9.1	(6.5–12.4)	39	26.8	(19.7–35.2)	0	0.0		
N	465			150			315			
З ким останнім був секс										
чоловік	151	33.5	(29.0–38.3)	141	93.8	(87.4–97.0)	10	3.0	(1.5–5.7)	0.0000
жінка	310	65.0	(60.1–69.6)	3	1.7	(0.5–5.3)	307	97.0	(94.3–98.5)	
men and women	5	1.5	(0.6–3.8)	5	4.5	(1.8–11.0)	0	0.0		
N	466			149			317			
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	333	70.1	(65.4–74.5)	105	68.9	(60.2–76.4)	228	70.7	(64.9–75.9)	0.7091
N	465			149			316			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	173	40.3	(35.5–45.3)	69	48.9	(40.3–57.6)	104	35.9	(30.2–42.1)	0.0150
N	465			149			316			

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	120	24.0	(20.2–28.3)	45	26.7	(20.0–34.6)	75	22.7	(18.2–27.9)	0.3630
N	465			149			316			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	266	84.5	(79.7–88.3)	82	72.0	(62.0–80.3)	184	91.6	(87.1–94.6)	0.0000
N	315			111			204			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	25	6.4	(4.3–9.5)	4	2.8	(1.0–7.3)	21	8.5	(5.5–12.9)	0.0296
N	315			111			204			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	7	1.8	(0.8–3.8)	0	0.0		7	2.8	(1.3–5.9)	0.0524
N	315			111			204			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	41	13.8	(10.1–18.6)	40	37.5	(28.3–47.7)	1	0.4	(0.0–2.5)	0.0000
N	315			111			204			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні										
1	242	95.5	(91.6–97.6)	70	89.8	(79.7–95.2)	172	98.0	(93.7–99.4)	0.0507
2-4	10	3.7	(2.0–7.0)	7	7.6	(3.5–15.8)	3	2.0	(0.6–6.3)	
5+	1	0.8	(0.1–5.5)	1	2.6	(0.4–16.3)	0	0.0		
N	253			78			175			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові										
1	11	60.4	(36.4–80.3)	2	100.0		9	55.2	(30.7–77.5)	0.4643
2-4	6	34.1	(15.7–58.8)	0	0.0		6	38.5	(17.9–64.2)	
5+	1	5.5	(0.8–30.8)	0	0.0		1	6.3	(0.9–33.9)	
N	18			2			16			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: комерційний (я платив)										
1	1	37.2	(3.5–90.5)	0	0.0		1	37.2	(3.5–90.6)	
2-4	1	62.8	(9.5–96.5)	0	0.0		1	62.8	(9.4–96.5)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	2			0			2			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: комерційний (мені платили)										
1	2	3.8	(0.9–14.3)	1	2.1	(0.3–13.8)	1	100.0		0.0000
2-4	29	82.2	(67.9–91.0)	29	83.7	(69.3–92.1)	0	0.0		
5+	7	14.0	(6.4–27.7)	7	14.2	(6.5–28.3)	0	0.0		
N	38			37			1			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього										
1	239	78.6	(73.1–83.2)	63	56.1	(45.9–65.8)	176	91.7	(87.0–94.8)	0.0000
2-4	46	15.4	(11.5–20.4)	29	28.9	(20.5–39.2)	17	7.5	(4.6–12.1)	
5+	19	6.0	(3.7–9.6)	17	15.0	(9.1–23.7)	2	0.8	(0.2–3.2)	
N	304			109			195			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	469	149	30.9 (26.6–35.6)	320	69.1 (64.4–73.4)	1.0000
Стать							
	чоловік	320	98	29.9 (24.8–35.6)	222	70.1 (64.4–75.2)	0.5470
	жінка	149	51	32.9 (25.4–41.4)	98	67.1 (58.6–74.6)	

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N		ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	8	3	32.3 (7.3–74.3)	5	67.7 (25.7–92.7)	0.5812
25-34	121	33	27.0 (19.5–36.1)	88	73.0 (63.9–80.5)	
35-44	217	74	34.0 (27.5–41.2)	143	66.0 (58.8–72.5)	
45+	123	39	28.6 (21.0–37.6)	84	71.4 (62.4–79.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	10	4	41.7 (13.5–76.6)	6	58.3 (23.4–86.5)	0.0881
3-5	16	9	59.4 (32.7–81.5)	7	40.6 (18.5–67.3)	
6-10	67	22	32.4 (21.8–45.1)	45	67.6 (54.9–78.2)	
≥11	376	114	29.3 (24.6–34.5)	262	70.7 (65.5–75.4)	
Партнерський статус						
живе сам	171	55	31.2 (24.1–39.2)	116	68.8 (60.8–75.9)	0.9363
живе з партнером	298	94	30.8 (25.5–36.6)	204	69.2 (63.4–74.5)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	98	29	29.3 (20.6–39.8)	69	70.7 (60.2–79.4)	0.2682
неповний робочий день або тимчасово	256	88	33.3 (27.4–39.8)	168	66.7 (60.2–72.6)	
безробітний	30	9	28.6 (14.9–47.9)	21	71.4 (52.1–85.1)	
інвалідність	19	9	45.1 (20.7–72.1)	10	54.9 (27.9–79.3)	
інші	66	14	20.6 (12.0–33.2)	52	79.4 (66.8–88.0)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	145	32	20.3 (14.2–28.1)	113	79.7 (71.9–85.8)	0.0023
3-10 тис	175	62	37.1 (29.7–45.2)	113	62.9 (54.8–70.3)	
10-20 тис	124	49	38.6 (29.9–48.1)	75	61.4 (51.9–70.1)	
≥20 тис	24	6	22.5 (9.7–44.0)	18	77.5 (56.0–90.3)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	397	116	29.0 (24.4–34.0)	281	71.0 (66.0–75.6)	0.0238

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
	так	72	33	43.6 (31.5–56.4)	39	56.4 (43.6–68.5)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	180	73	39.8 (32.4–47.7)	107	60.2 (52.3–67.6)	0.0021
так	289	76	25.3 (20.4–31.1)	213	74.7 (68.9–79.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	376	122	31.5 (26.7–36.7)	254	68.5 (63.3–73.3)	0.6481
так	92	27	28.8 (19.8–39.9)	65	71.2 (60.1–80.2)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	80	21	26.7 (17.3–38.9)	59	73.3 (61.1–82.7)	0.4199
негативний	389	128	31.8 (27.1–36.9)	261	68.2 (63.1–72.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	291	99	32.4 (27.0–38.3)	192	67.6 (61.7–73.0)	0.3616
стимулятори	44	15	38.1 (23.5–55.2)	29	61.9 (44.8–76.5)	
опі+стимул	132	35	26.4 (19.0–35.3)	97	73.6 (64.7–81.0)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	404	123	29.3 (24.8–34.2)	281	70.7 (65.8–75.2)	0.1361
стимулятори	63	25	40.7 (28.3–54.5)	38	59.3 (45.5–71.7)	
інші	1	0	0.0	1	100.0	

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										
так	192	73.9	(68.0–79.1)	51	61.2	(49.5–71.9)	141	79.6	(73.0–84.8)	0.0029
N	266			82			184			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	21	89.1	(64.0–97.4)	4	100.0		17	86.9	(58.7–96.9)	0.4771
N	23			4			19			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	4	65.7	(25.3–91.5)	0	0.0		4	65.7	(25.2–91.6)	
N	6			0			6			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (мені заплатили) партнер										
так	39	98.7	(91.3–99.8)	39	98.7	(91.2–99.8)	0	0.0		
N	40			40			0			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	143	55.7	(49.1–62.0)	38	45.7	(34.6–57.2)	105	60.2	(52.3–67.5)	0.0863
часто	25	8.9	(6.0–13.2)	8	8.5	(4.2–16.7)	17	9.1	(5.6–14.6)	
половина	18	6.3	(3.9–10.0)	4	4.0	(1.5–10.6)	14	7.3	(4.3–12.3)	
іноді	7	2.6	(1.2–5.8)	2	3.7	(0.9–14.6)	5	2.1	(0.9–5.1)	
рідко	7	2.1	(1.0–4.6)	2	2.1	(0.5–8.4)	5	2.1	(0.8–5.4)	
ніколи	65	24.3	(19.2–30.3)	28	35.9	(25.5–47.8)	37	19.1	(13.8–25.9)	
N	265			82			183			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	19	75.1	(52.1–89.3)	3	77.7	(26.0–97.2)	16	74.6	(48.8–90.1)	
часто	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
половина	2	8.9	(2.2–30.2)	1	22.3	(2.8–74.0)	1	6.4	(0.9–33.9)	
іноді	1	7.0	(1.0–36.0)	0	0.0		1	8.4	(1.2–40.8)	
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	2	8.9	(2.2–30.2)	0	0.0		2	10.7	(2.6–34.8)	
N	24			4			20			
Частота використання презервативів: комерційний (я заплатив) партнер										
завжди	4	62.0	(22.4–90.2)	0	0.0		4	62.0	(22.3–90.2)	
часто	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
половина	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
іноді	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	2	38.0	(9.8–77.6)	0	0.0		2	38.0	(9.8–77.7)	
N	6			0			6			
Частота використання презервативів: комерційний (мені заплатили) партнер										
завжди	25	64.2	(47.8–77.8)	24	63.6	(47.0–77.5)	1	100.0		
часто	7	17.4	(8.0–33.7)	7	17.7	(8.1–34.3)	0	0.0		
половина	9	18.4	(9.5–32.6)	9	18.7	(9.7–33.2)	0	0.0		
іноді	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
рідко	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
ніколи	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	41			40			1			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

			Результат тесту на ВІЛ				
		N	позитивний		негативний		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	87	17.0 (13.7–20.9)	413	83.0 (79.1–86.3)	1.0000
Стать							
	чоловік	343	69	20.5 (16.1–25.8)	274	79.5 (74.2–83.9)	0.0028
	жінка	157	18	9.7 (6.0–15.2)	139	90.3 (84.8–94.0)	

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	8	1	8.2 (0.7–53.3)	7	91.8 (46.7–99.3)	0.0103
25-34	126	11	8.3 (4.4–15.2)	115	91.7 (84.8–95.6)	
35-44	227	41	17.3 (12.4–23.7)	186	82.7 (76.3–87.6)	
45+	139	34	24.0 (17.3–32.3)	105	76.0 (67.7–82.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	10	0	0.0	10	100.0	0.0054
3-5	18	0	0.0	18	100.0	
6-10	69	5	6.4 (2.5–15.5)	64	93.6 (84.5–97.5)	
≥11	403	82	19.8 (15.8–24.4)	321	80.2 (75.6–84.2)	
Партнерський статус						
живе сам	191	42	21.1 (15.3–28.5)	149	78.9 (71.5–84.7)	0.0722
живе з партнером	309	45	14.3 (10.6–18.9)	264	85.7 (81.1–89.4)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	103	16	13.7 (8.1–22.0)	87	86.3 (78.0–91.9)	0.0083
неповний робочий день або тимчасово	277	50	17.5 (13.2–22.9)	227	82.5 (77.1–86.8)	
безробітний	31	8	25.3 (12.6–44.5)	23	74.7 (55.5–87.4)	
інвалідність	20	7	44.2 (19.0–72.8)	13	55.8 (27.2–81.0)	
інші	69	6	8.3 (3.6–17.9)	63	91.7 (82.1–96.4)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	156	33	18.8 (13.2–26.0)	123	81.2 (74.0–86.8)	0.3944
3-10 тис	189	37	19.1 (13.5–26.4)	152	80.9 (73.6–86.5)	
10-20 тис	128	15	12.9 (7.6–21.1)	113	87.1 (78.9–92.4)	
≥20 тис	26	2	9.1 (2.1–31.4)	24	90.9 (68.6–97.9)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	426	68	15.3 (12.0–19.3)	358	84.7 (80.7–88.0)	0.0245
так	74	19	28.1 (17.2–42.4)	55	71.9 (57.6–82.8)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	190	16	7.7 (4.5–12.9)	174	92.3 (87.1–95.5)	0.0001
так	310	71	22.7 (17.9–28.2)	239	77.3 (71.8–82.1)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	405	40	8.8 (6.3–12.0)	365	91.2 (88.0–93.7)	0.0000
так	94	47	54.5 (43.5–65.1)	47	45.5 (34.9–56.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	305	58	19.4 (15.0–24.7)	247	80.6 (75.3–85.0)	0.2580
стимулятори	45	6	11.0 (4.7–23.5)	39	89.0 (76.5–95.3)	
опі+стимул	148	22	14.0 (8.7–21.8)	126	86.0 (78.2–91.3)	
інші	2	1	42.3 (0.0–100.0)	1	57.7 (0.0–100.0)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	433	79	18.0 (14.4–22.4)	354	82.0 (77.6–85.6)	0.0014
стимулятори	64	6	7.9 (3.4–17.3)	58	92.1 (82.7–96.6)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)




Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)




Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього						
Разом	500	190	37.9 (33.4–42.6)	310	62.1 (57.4–66.6)	1.0000
Стать						
чоловік	343	129	37.1 (31.7–42.8)	214	62.9 (57.2–68.3)	0.6203
жінка	157	61	39.6 (31.6–48.1)	96	60.4 (51.9–68.4)	
Вікова категорія 4						
<25	8	7	76.5 (20.4–97.6)	1	23.5 (2.4–79.6)	0.0005
25-34	126	63	50.2 (40.7–59.7)	63	49.8 (40.3–59.3)	
35-44	227	87	39.1 (32.4–46.3)	140	60.9 (53.7–67.6)	
45+	139	33	23.8 (16.9–32.3)	106	76.2 (67.7–83.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	10	9	91.1 (48.3–99.1)	1	8.9 (0.9–51.7)	0.0000
3-5	18	14	77.0 (50.0–91.8)	4	23.0 (8.2–50.0)	
6-10	69	41	59.3 (46.5–70.9)	28	40.7 (29.1–53.5)	
≥11	403	126	31.6 (26.8–36.8)	277	68.4 (63.2–73.2)	
Партнерський статус						

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	191	80	40.4 (33.0–48.3)	111	59.6 (51.7–67.0)	0.3955
живе з партнером	309	110	36.3 (30.7–42.2)	199	63.7 (57.8–69.3)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	103	53	54.0 (43.6–64.0)	50	46.0 (36.0–56.4)	0.0006
неповний робочий день або тимчасово	277	101	35.5 (29.7–41.8)	176	64.5 (58.2–70.3)	
безробітний	31	8	28.5 (14.5–48.6)	23	71.5 (51.4–85.5)	
інвалідність	20	3	8.3 (2.2–26.5)	17	91.7 (73.5–97.8)	
інші	69	25	36.7 (25.3–49.9)	44	63.3 (50.1–74.7)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	156	51	32.9 (25.4–41.3)	105	67.1 (58.7–74.6)	0.0005
3-10 тис	189	58	30.5 (24.0–38.0)	131	69.5 (62.0–76.0)	
10-20 тис	128	67	52.3 (43.0–61.6)	61	47.7 (38.4–57.0)	
≥20 тис	26	13	55.0 (34.6–73.8)	13	45.0 (26.2–65.4)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	426	175	41.0 (36.1–46.1)	251	59.0 (53.9–63.9)	0.0001
так	74	15	17.3 (10.2–27.7)	59	82.7 (72.3–89.8)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	405	181	44.4 (39.2–49.7)	224	55.6 (50.3–60.8)	0.0000
так	94	9	8.7 (4.5–16.3)	85	91.3 (83.7–95.5)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	87	16	17.2 (10.1–27.7)	71	82.8 (72.3–89.9)	0.0001
негативний	413	174	42.1 (37.1–47.4)	239	57.9 (52.6–62.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	305	110	35.7 (30.1–41.7)	195	64.3 (58.3–69.9)	0.0006

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
стимулятори	45	28	67.2 (51.4–79.8)	17	32.8 (20.2–48.6)	
опі+стимул	148	52	34.6 (26.7–43.3)	96	65.4 (56.7–73.3)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	433	146	32.7 (28.2–37.6)	287	67.3 (62.4–71.8)	0.0000
стимулятори	64	43	73.2 (60.9–82.7)	21	26.8 (17.3–39.1)	
інші	2	1	62.8 (0.0–100.0)	1	37.2 (0.0–100.0)	




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	50.2	48.7	57.3	0.1906
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	46.9	44.7	57.5	0.0479

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
невиявлений = непередаваний	58.2	56.8	64.7	0.2160
ПКП знижує ризик	54.7	53.1	62.5	0.1417
АРТ слід починати негайно	55.3	53.8	62.9	0.1608
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	44.6	44.0	47.8	0.5548
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	46.3	46.0	47.5	0.8270
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	63.9	63.7	65.0	0.8402
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	61.1	61.1	60.8	0.9538
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	49.2	47.4	57.9	0.1088
лікування слід починати негайно	52.5	51.9	55.3	0.5966
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	30.5	29.6	35.0	0.3795
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	22.6	22.4	23.6	0.8381
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	58.4	56.9	65.9	0.1608
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	49.2	48.3	53.5	0.4222
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	44.9	42.8	54.9	0.0615
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	15.0	14.8	16.2	0.7738
лікування слід починати негайно	46.8	47.6	43.0	0.4863
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	34.7	33.8	39.4	0.3848
ВГС на 100% передається від матері до дитини	18.0	17.1	22.1	0.3626
ВГС передається через кров і статевим шляхом	66.1	64.4	74.7	0.0906
лікування ВГС не існує	47.3	46.1	53.1	0.2835
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	51.9	52.0	51.3	0.9176
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	61.2	61.6	59.0	0.6880

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	422	83.7	(79.9–87.0)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	431	86.2	(82.6–89.2)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	203	45.7	(40.6–50.9)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	128	29.3	(24.9–34.1)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	417	97.4	(95.5–98.5)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	410	98.4	(96.2–99.3)
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	81	18.1	(14.4–22.4)
негативний	342	81.9	(77.6–85.6)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	257	58.6	(53.3–63.8)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	4	0.7	(0.3–2.0)
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	233	80.3	(74.8–84.8)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	18	8.0	(4.9–12.8)
негативний	207	89.1	(84.1–92.7)
не може розкрити	8	2.9	(1.4–5.7)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	427	224	54.3 (49.1–59.4)	203	45.7 (40.6–50.9)	1.0000
Стать							
	чоловік	291	150	53.4 (47.0–59.6)	141	46.6 (40.4–53.0)	0.6139
	жінка	136	74	56.2 (47.1–64.9)	62	43.8 (35.1–52.9)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	7	5	61.3 (16.6–92.6)	2	38.7 (7.4–83.4)	0.3420
25-34	98	49	51.2 (40.3–61.9)	49	48.8 (38.1–59.7)	
35-44	193	107	59.3 (51.6–66.6)	86	40.7 (33.4–48.4)	
45+	129	63	48.7 (39.6–58.0)	66	51.3 (42.0–60.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	10	5	43.9 (14.9–77.7)	5	56.1 (22.3–85.1)	0.8338
3-5	13	8	63.9 (34.1–85.8)	5	36.1 (14.2–65.9)	
6-10	54	29	55.0 (40.8–68.4)	25	45.0 (31.6–59.2)	
≥11	350	182	54.1 (48.4–59.8)	168	45.9 (40.2–51.6)	
Партнерський статус						
живе сам	160	82	54.0 (45.3–62.4)	78	46.0 (37.6–54.7)	0.9242
живе з партнером	267	142	54.5 (48.1–60.8)	125	45.5 (39.2–51.9)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	81	44	55.1 (43.3–66.3)	37	44.9 (33.7–56.7)	0.3525
неповний робочий день або тимчасово	240	131	56.8 (49.9–63.4)	109	43.2 (36.6–50.1)	
безробітний	30	17	55.6 (36.6–73.0)	13	44.4 (27.0–63.4)	
інвалідність	20	10	58.1 (31.5–80.6)	10	41.9 (19.4–68.5)	
інші	56	22	40.8 (27.8–55.2)	34	59.2 (44.8–72.2)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	133	67	50.3 (41.0–59.5)	66	49.7 (40.5–59.0)	0.0549
3-10 тис	166	84	52.9 (44.6–61.1)	82	47.1 (38.9–55.4)	
10-20 тис	108	66	65.2 (55.2–74.0)	42	34.8 (26.0–44.8)	
≥20 тис	19	7	35.8 (16.9–60.5)	12	64.2 (39.5–83.1)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	357	190	54.7 (49.1–60.3)	167	45.3 (39.7–50.9)	0.6768
так	70	34	51.7 (38.7–64.5)	36	48.3 (35.5–61.3)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	130	86	66.1 (57.0–74.2)	44	33.9 (25.8–43.0)	0.0029
так	297	138	49.3 (43.0–55.6)	159	50.7 (44.4–57.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	337	177	54.9 (49.1–60.6)	160	45.1 (39.4–50.9)	0.7073
так	89	47	52.5 (41.1–63.6)	42	47.5 (36.4–58.9)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	84	58	69.6 (57.9–79.2)	26	30.4 (20.8–42.1)	0.0040
негативний	343	166	50.6 (44.9–56.4)	177	49.4 (43.6–55.1)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	272	142	52.7 (46.2–59.0)	130	47.3 (41.0–53.8)	0.5281
стимулятори	32	14	47.2 (29.4–65.8)	18	52.8 (34.2–70.6)	
опі+стимул	121	67	59.1 (49.2–68.2)	54	40.9 (31.8–50.8)	
інші	2	1	42.3 (0.0–100.0)	1	57.7 (0.0–100.0)	
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	377	198	54.2 (48.7–59.7)	179	45.8 (40.3–51.3)	0.8975
стимулятори	47	24	54.3 (38.9–69.0)	23	45.7 (31.0–61.1)	
інші	2	1	37.2 (0.0–100.0)	1	62.8 (0.0–100.0)	

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	87	83.0 (72.3–90.1)	1.0000	73	77.8 (66.0–86.3)	1.0000	56	41	72.8 (58.4–83.6)	1.0000
Стать											
	чоловік	69	81.3 (68.7–89.6)	0.3524	57	74.6 (60.7–84.9)	0.1501	42	31	74.5 (57.7–86.2)	0.6131
	жінка	18	90.3 (67.7–97.6)		16	90.2 (67.3–97.6)		14	10	67.0 (38.1–87.0)	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4										
<25	1	100.0	0.8024	1	0.0	0.0187	0	0	0.0	
25-34	11	89.4 (50.9–98.6)		10	46.0 (18.0–76.7)		6	4	58.4 (20.1–88.7)	
35-44	41	79.3 (60.5–90.6)		34	79.1 (61.4–90.0)		26	21	84.8 (66.2–94.1)	
45+	34	85.2 (69.8–93.4)		28	87.5 (70.1–95.4)		24	16	63.3 (41.2–80.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
3-5	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
6-10	5	100.0		5	27.8 (5.6–71.3)		2	2	100.0	
≥11	82	82.1 (70.9–89.6)		68	80.9 (69.1–89.0)		54	39	72.2 (57.5–83.2)	
Партнерський статус										
живе сам	42	83.3 (65.0–93.0)	0.9552	36	85.2 (66.3–94.4)	0.1734	31	23	76.8 (57.9–88.9)	0.4940
живе з партнером	45	82.8 (68.5–91.4)		37	70.5 (53.7–83.1)		25	18	68.0 (45.6–84.4)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	16	80.7 (43.8–95.7)	0.7683	14	58.4 (32.0–80.7)	0.1127	8	6	70.9 (32.2–92.6)	0.3639
неповний робочий день або тимчасово	50	80.1 (65.5–89.5)		40	78.5 (61.4–89.4)		32	22	66.4 (47.0–81.6)	
безробітний	8	85.4 (39.6–98.1)		7	100.0		7	5	65.9 (25.6–91.6)	
інвалідність	7	100.0		7	94.4 (60.9–99.4)		6	5	94.6 (61.2–99.5)	
інші	6	85.4 (39.3–98.1)		5	57.6 (17.4–89.7)		3	3	100.0	
Категорія місячного доходу										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	33	85.0 (64.8–94.6)	0.8898	29	65.0 (44.9–80.9)	0.0725	19	14	72.7 (47.8–88.6)	0.8632
3-10 тис	37	79.8 (63.0–90.2)		29	92.3 (76.9–97.8)		26	19	70.9 (47.8–86.6)	
10-20 тис	15	83.5 (48.3–96.5)		13	70.6 (40.8–89.3)		9	6	72.0 (36.1–92.1)	
≥20 тис	2	100.0		2	100.0		2	2	100.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	68	79.1 (66.3–87.9)	0.0190	55	70.2 (56.1–81.3)	0.0119	38	28	70.9 (53.1–84.0)	0.6803
так	19	97.1 (80.6–99.6)		18	100.0		18	13	76.6 (50.0–91.4)	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	16	79.3 (44.2–94.9)	0.7309	14	86.9 (58.7–96.8)	0.3737	12	8	67.0 (35.7–88.1)	0.6533
так	71	83.8 (72.4–91.0)		59	76.0 (62.5–85.7)		44	33	74.1 (57.6–85.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	40	73.4 (56.0–85.7)	0.0780	30	78.1 (59.2–89.8)	0.9581	23	19	85.5 (65.4–94.8)	0.0958
так	47	90.0 (74.4–96.6)		43	77.6 (61.3–88.3)		33	22	65.2 (45.5–80.7)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	87	83.0 (72.1–90.2)		73	77.8 (65.8–86.4)		56	41	72.8 (58.2–83.7)	
негативний	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
опіоїди	58	91.3 (77.6–96.9)	0.0055	54	83.1 (69.1–91.5)	0.0406	45	33	72.4 (56.4–84.2)	
стимулятори	6	100.0		6	100.0		6	4	63.0 (22.3–91.0)	
опі+стимул	22	58.6 (34.7–79.1)		12	53.0 (21.9–81.9)		5	4	81.1 (28.0–97.9)	
інші	1	100.0		1	0.0		0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	79	82.9 (71.5–90.3)	0.8223	66	76.7 (64.2–85.9)	0.4344	50	38	75.5 (60.2–86.2)	0.1701
стимулятори	6	79.8 (30.4–97.3)		5	100.0		5	3	57.5 (17.3–89.7)	
інші	2	100.0		2	62.8 (0.0–100.0)		1	0	0.0	

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	6	9.8	(4.3–20.9)
1-2 тижні тому	4	5.4	(1.9–14.0)
3-4 тижні тому	1	2.3	(0.3–14.7)
1-3 місяці тому	3	4.9	(1.6–14.4)
ніколи	47	77.6	(64.7–86.7)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	5	55.8	(26.2–81.9)
ліків не було	4	35.3	(12.9–66.9)
був під впливом	0	0.0	
не хотів, щоб інші бачили	1	8.8	(1.2–43.6)
інші	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	4	38.0	(14.1–69.6)
відсутність часу на відвідування клініки	4	36.4	(13.7–67.4)
відсутність мотивації відвідувати клініку	1	18.4	(2.6–65.2)
пропуск візиту, важко повернутися	4	39.4	(14.9–70.7)
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	4	33.6	(12.3–64.6)
вживання наркотиків	4	36.1	(13.4–67.3)
побічні ефекти або ускладнення	0	0.0	
немає розуміння як	5	45.8	(20.4–73.5)
втрачено або продано всі АРВ-препарати	4	28.9	(10.5–58.5)
Причини відмови від ДРТ			

		n	%	ДІ
	вживання алкоголю	4	38.0	(14.1–69.6)
Причини відмови від АРТ				
	довго чекав і пішов	1	9.3	(1.3–44.6)
Час на АРТ				
	≤3м	6	46.3	(22.3–72.1)
	4-24м	5	36.2	(15.6–63.5)
	25-60м	3	17.5	(5.3–44.8)
	5 років +	0	0.0	

9. Доконтактна профілактика




Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

			Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
		N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього											
	Разом	500	20	4.9 (3.1–7.7)	11	2.2 (1.1–4.2)	51	9.2 (6.9–12.2)	418	83.7 (79.8–86.9)	1.0000
Стать											
	чоловік	343	0	0.0	0	0.0	29	6.7 (4.6–9.7)	314	93.3 (90.3–95.4)	0.0000
	жінка	157	20	15.1 (9.7–22.9)	11	6.8 (3.5–12.6)	22	14.4 (9.3–21.5)	104	63.7 (55.1–71.6)	
Вікова категорія 4											
	<25	8	0	0.0	1	23.5 (2.4–79.6)	1	15.8 (1.4–70.8)	6	60.6 (17.7–91.7)	0.0031
	25-34	126	4	4.5 (1.6–11.9)	6	4.9 (2.0–11.6)	16	12.1 (7.2–19.7)	100	78.5 (69.3–85.5)	
	35-44	227	8	4.1 (1.9–8.6)	3	1.0 (0.3–3.3)	22	9.3 (6.0–14.1)	194	85.6 (79.8–89.9)	
	45+	139	8	6.8 (3.3–13.7)	1	0.6 (0.1–4.0)	12	6.3 (3.5–11.1)	118	86.3 (79.1–91.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків											
	≤2	10	0	0.0	0	0.0	1	14.4 (1.5–64.9)	9	85.6 (35.1–98.5)	
	3-5	18	0	0.0	0	0.0	5	26.5 (10.2–53.3)	13	73.5 (46.7–89.8)	

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
6-10	69	1	2.0 (0.3–13.5)	2	4.6 (1.1–17.8)	6	8.2 (3.5–18.2)	60	85.2 (72.7–92.5)	
≥11	403	19	5.7 (3.5–9.1)	9	2.0 (0.9–4.0)	39	8.5 (6.1–11.8)	336	83.9 (79.5–87.4)	
Партнерський статус										
живе сам	191	5	3.6 (1.5–8.5)	3	1.8 (0.5–6.3)	19	8.3 (5.1–13.1)	164	86.3 (80.1–90.8)	0.6703
живе з партнером	309	15	5.8 (3.4–9.8)	8	2.4 (1.1–5.1)	32	9.8 (6.8–13.9)	254	82.0 (76.8–86.2)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	103	2	1.7 (0.4–6.6)	7	7.8 (3.4–16.9)	13	12.0 (6.7–20.6)	81	78.5 (68.4–86.0)	
неповний робочий день або тимчасово	277	5	2.9 (1.1–6.9)	1	0.2 (0.0–1.5)	22	6.4 (4.1–9.7)	249	90.6 (86.2–93.7)	
безробітний	31	0	0.0	0	0.0	4	13.2 (4.6–32.4)	27	86.8 (67.6–95.4)	
інвалідність	20	0	0.0	0	0.0	4	17.3 (5.7–42.1)	16	82.7 (57.9–94.3)	
інші	69	13	21.6 (12.5–34.7)	3	3.9 (1.2–11.9)	8	12.9 (6.0–25.6)	45	61.6 (48.2–73.4)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	156	13	9.8 (5.6–16.5)	10	6.0 (3.0–11.5)	10	6.2 (3.2–11.6)	123	78.0 (70.1–84.4)	0.0000
3-10 тис	189	1	0.5 (0.1–3.2)	1	0.3 (0.0–2.4)	20	10.5 (6.6–16.3)	167	88.7 (82.8–92.8)	
10-20 тис	128	6	5.6 (2.2–13.1)	0	0.0	18	11.6 (7.2–18.3)	104	82.8 (74.7–88.7)	
≥20 тис	26	0	0.0	0	0.0	2	5.5 (1.2–21.1)	24	94.5 (78.9–98.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	426	20	5.7 (3.6–8.9)	9	2.2 (1.0–4.4)	34	7.7 (5.4–10.9)	363	84.5 (80.3–88.0)	0.0108
так	74	0	0.0	2	2.5 (0.6–10.1)	17	19.1 (11.6–29.7)	55	78.5 (67.5–86.5)	

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	190	1	1.1 (0.1–7.2)	1	1.1 (0.1–7.2)	12	7.4 (4.0–13.2)	176	90.5 (83.9–94.5)	0.0429
так	310	19	7.3 (4.5–11.5)	10	2.9 (1.5–5.6)	39	10.3 (7.4–14.0)	242	79.6 (74.4–83.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	405	18	5.5 (3.3–8.8)	11	2.7 (1.4–5.1)	43	9.7 (7.1–13.2)	333	82.1 (77.6–85.9)	0.1915
так	94	2	2.4 (0.6–9.6)	0	0.0	8	6.8 (3.3–13.5)	84	90.8 (83.1–95.2)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	87	1	1.6 (0.2–10.6)	2	1.6 (0.4–6.5)	10	10.1 (5.3–18.5)	74	86.6 (77.6–92.4)	0.4577
негативний	413	19	5.6 (3.5–8.9)	9	2.3 (1.1–4.7)	41	9.0 (6.5–12.3)	344	83.1 (78.7–86.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	305	7	2.3 (1.0–5.1)	6	2.3 (0.9–5.6)	35	9.8 (7.0–13.6)	257	85.6 (80.9–89.2)	
стимулятори	45	0	0.0	0	0.0	10	21.0 (10.6–37.4)	35	79.0 (62.6–89.4)	
опі+стимул	148	13	10.9 (6.3–18.4)	5	2.6 (1.0–6.2)	6	5.0 (2.2–11.2)	124	81.5 (73.2–87.6)	
інші	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	433	20	5.7 (3.6–8.9)	11	2.5 (1.3–4.8)	41	8.6 (6.2–11.7)	361	83.3 (79.0–86.8)	
стимулятори	64	0	0.0	0	0.0	10	13.9 (6.9–26.0)	54	86.1 (74.0–93.1)	
інші	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	20	4.9	(3.1–7.7)
приймав в минулому	11	2.2	(1.1–4.2)
ніколи не приймав	51	9.2	(6.9–12.2)
не знає що це	418	83.7	(79.8–86.9)
Обізнаність про ДКП			
ні	418	83.7	(79.8–86.9)
так	82	16.3	(13.1–20.2)
Використання ДКП зараз			
ні	480	95.1	(92.3–96.9)
так	20	4.9	(3.1–7.7)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	62	69.9	(57.3–80.0)
так	20	30.1	(20.0–42.7)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)




Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)




Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	3	8.1	(2.5–23.1)
клініка закрита після лютого 2022 року	0	0.0	
слабкий або відсутній ефект	6	14.6	(6.3–30.2)
побічні ефекти	2	5.7	(1.4–20.7)
не хочу відвідувати клініку	11	30.9	(17.0–49.5)
не хочу кидати наркотики	5	12.8	(5.3–27.8)
важко дістатися до клініки	5	12.9	(5.2–28.6)
не потребує	7	27.4	(13.6–47.4)
не подобається ставлення лікаря	6	18.0	(7.5–37.3)
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	5	16.7	(6.5–36.7)
не змінилось	15	48.0	(31.0–65.4)
зменшилося	15	35.3	(21.3–52.5)
Чи купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	117	21.4	(17.9–25.4)
так, бупренорфін	1	0.1	(0.0–1.0)
не купував	382	78.4	(74.5–81.9)
Де купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	382	78.4	(74.5–81.9)
купляв на чорн. ринку	111	20.4	(17.0–24.3)
купляв в приватній клініці	7	1.2	(0.6–2.5)
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорн.ринку			
ін'єкційно	112	95.1	(89.1–97.8)
ін'єкційно у суміші	1	0.8	(0.1–5.3)
ковтав або розсмоктував	5	4.2	(1.7–10.0)
нюхав	0	0.0	

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього										
Разом	499	94	18.0 (14.7–22.0)	28	4.9 (3.3–7.2)	62	11.9 (9.1–15.5)	315	65.1 (60.4–69.5)	1.0000
Стать										
чоловік	342	77	22.2 (17.8–27.5)	22	5.7 (3.6–8.9)	44	12.0 (8.7–16.4)	199	60.0 (54.2–65.6)	0.0023
жінка	157	17	9.4 (5.7–14.9)	6	3.1 (1.4–7.0)	18	11.8 (7.3–18.7)	116	75.7 (67.9–82.0)	
Вікова категорія 4										
<25	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0	0.0014
25-34	126	10	8.1 (4.2–15.1)	6	3.7 (1.6–8.2)	14	11.6 (6.7–19.2)	96	76.7 (67.8–83.7)	
35-44	227	52	20.6 (15.5–27.0)	15	6.1 (3.5–10.5)	37	16.6 (11.7–23.0)	123	56.7 (49.4–63.6)	
45+	138	32	23.0 (16.5–31.2)	7	4.2 (1.9–8.8)	11	5.5 (3.0–9.9)	88	67.3 (58.7–74.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	10	0	0.0	0	0.0	2	23.3 (4.6–65.8)	8	76.7 (34.2–95.4)	0.0107
3-5	18	1	6.0 (0.7–36.1)	0	0.0	3	16.9 (5.0–44.0)	14	77.0 (50.0–91.8)	
6-10	69	7	8.7 (4.0–17.9)	1	0.7 (0.1–5.3)	15	22.1 (13.3–34.4)	46	68.5 (55.9–78.8)	
≥11	402	86	20.5 (16.5–25.1)	27	5.9 (3.9–8.7)	42	9.8 (7.0–13.7)	247	63.8 (58.5–68.8)	
Партнерський статус										
живе сам	190	45	22.5 (16.5–29.8)	11	4.1 (2.2–7.5)	23	12.2 (7.7–18.9)	111	61.2 (53.2–68.7)	0.2452
живе з партнером	309	49	15.2 (11.5–19.7)	17	5.4 (3.2–8.9)	39	11.8 (8.5–16.1)	204	67.7 (61.9–72.9)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	103	9	8.4 (4.3–15.7)	8	7.6 (3.6–15.5)	12	10.3 (5.8–17.8)	74	73.7 (63.9–81.6)	0.0000
неповний робочий день або тимчасово	276	55	18.2 (13.9–23.4)	9	2.7 (1.3–5.5)	35	13.1 (9.2–18.5)	177	66.1 (59.7–71.9)	

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	31	14	42.0 (25.4–60.7)	2	8.5 (2.0–29.7)	4	12.2 (4.4–29.6)	11	37.2 (21.3–56.6)	
інвалідність	20	9	59.3 (33.1–81.1)	6	23.0 (8.8–48.2)	5	17.6 (6.3–40.7)	0	0.0	
інші	69	7	10.1 (4.7–20.2)	3	3.6 (1.1–11.1)	6	7.6 (3.0–18.1)	53	78.7 (66.8–87.2)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	156	31	17.2 (12.0–24.1)	5	3.2 (1.2–8.1)	8	5.5 (2.2–12.9)	112	74.1 (65.9–80.9)	0.0159
3-10 тис	189	44	23.5 (17.3–31.0)	14	5.9 (3.4–10.1)	25	13.6 (9.0–19.9)	106	57.1 (49.1–64.6)	
10-20 тис	127	15	11.8 (7.1–19.0)	9	6.7 (3.2–13.2)	24	17.7 (11.7–25.8)	79	63.8 (54.5–72.2)	
≥20 тис	26	4	15.2 (5.4–36.1)	0	0.0	5	18.2 (7.2–38.8)	17	66.6 (45.4–82.7)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	425	67	14.7 (11.6–18.6)	20	4.2 (2.6–6.7)	49	11.4 (8.4–15.3)	289	69.7 (64.8–74.2)	0.0000
так	74	27	40.0 (27.9–53.5)	8	9.5 (4.5–18.9)	13	15.4 (8.8–25.6)	26	35.0 (24.1–47.8)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	190	9	4.2 (2.1–7.9)	4	1.3 (0.5–3.5)	24	11.7 (7.7–17.4)	153	82.9 (76.7–87.7)	0.0000
так	309	85	26.6 (21.5–32.3)	24	7.1 (4.6–10.7)	38	12.1 (8.5–16.9)	162	54.2 (48.1–60.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	405	0	0.0	28	6.0 (4.0–8.8)	62	14.6 (11.2–18.8)	315	79.5 (74.9–83.4)	0.0000
так	94	94	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										

	N	Отримував ЗПТ (з усіх)								
		приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	87	47	57.8 (46.1–68.7)	10	9.5 (4.7–18.3)	9	9.0 (4.5–17.0)	21	23.7 (15.3–34.8)	0.0000
негативний	412	47	9.9 (7.4–13.1)	18	3.9 (2.4–6.4)	53	12.6 (9.4–16.6)	294	73.6 (68.8–77.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	304	71	23.0 (18.4–28.4)	24	7.3 (4.8–11.1)	41	12.6 (9.0–17.4)	168	57.0 (51.0–62.9)	0.0001
стимулятори	45	3	5.3 (1.6–16.3)	1	1.4 (0.2–10.1)	5	9.2 (3.7–21.4)	36	84.1 (70.8–92.0)	
опі+стимул	148	18	11.7 (6.8–19.5)	3	1.5 (0.4–4.7)	16	11.6 (7.0–18.7)	111	75.2 (66.5–82.3)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	432	91	20.3 (16.5–24.7)	25	5.1 (3.3–7.7)	52	11.2 (8.3–14.9)	264	63.4 (58.3–68.2)	0.0155
стимулятори	64	2	2.6 (0.6–10.4)	2	2.0 (0.5–8.1)	10	17.4 (9.1–30.9)	50	78.0 (64.6–87.3)	
інші	2	1	37.2 (0.0–100.0)	0	0.0	0	0.0	1	62.8 (0.0–100.0)	




Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)



Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

		n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь				
	так	129	25.4	(21.4–29.9)
Кількість передозувань протягом життя				
	1	32	25.2	(17.5–34.8)
	2-4	76	61.3	(51.5–70.3)
	5+	19	13.5	(8.4–20.9)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	так	16	3.2	(1.8–5.4)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)				
	так	16	12.5	(7.3–20.4)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців				
	1	10	48.5	(24.0–73.8)

		n	%	ДІ
	2-4	6	51.5	(26.2–76.0)
	5+	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)				
	метадон	5	34.9	(12.7–66.4)
	інші опіоїди	3	41.0	(14.0–74.8)
	стимулятор	1	7.0	(0.9–38.1)
	інші	1	17.0	(2.5–62.5)
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)				
	метадон+стимулятор	3	82.1	(31.7–97.8)
	метадон+барбіт. або димедр.	0	0.0	
	метадон+інше	1	17.9	(2.2–68.3)
	інші	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)				
	метадон	2	100.0	
	інші опіоїди	0	0.0	
	стимулятор	0	0.0	
	інші	0	0.0	
Знання та досвід налоксону				
	ніколи не чув	151	32.5	(28.1–37.2)
	знає, але не користувався	241	46.7	(42.0–51.5)
	користувався	56	11.1	(8.2–14.8)
	користувались друзі	35	7.0	(4.9–9.8)
	користувався сам та друзі	17	2.8	(1.7–4.5)

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	484	96.8 (94.6–98.2)	16	3.2 (1.8–5.4)	1.0000
Стать							
	чоловік	343	333	97.3 (94.8–98.6)	10	2.7 (1.4–5.2)	0.4245
	жінка	157	151	95.8 (90.0–98.3)	6	4.2 (1.7–10.0)	
Вікова категорія 4							
	<25	8	8	100.0	0	0.0	0.4906
	25-34	126	124	97.8 (89.8–99.6)	2	2.2 (0.4–10.2)	
	35-44	227	216	95.4 (91.2–97.6)	11	4.6 (2.4–8.8)	
	45+	139	136	98.1 (94.3–99.4)	3	1.9 (0.6–5.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	10	10	100.0	0	0.0	0.8713

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	18	17	95.1 (68.9–99.4)	1	4.9 (0.6–31.1)	
6-10	69	67	97.7 (90.3–99.5)	2	2.3 (0.5–9.7)	
≥11	403	390	96.7 (94.0–98.2)	13	3.3 (1.8–6.0)	
Партнерський статус						
живе сам	191	183	95.9 (91.2–98.2)	8	4.1 (1.8–8.8)	0.4110
живе з партнером	309	301	97.4 (94.6–98.8)	8	2.6 (1.2–5.4)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	103	96	92.0 (82.9–96.5)	7	8.0 (3.5–17.1)	0.0480
неповний робочий день або тимчасово	277	270	97.7 (94.8–99.0)	7	2.3 (1.0–5.2)	
безробітний	31	29	95.3 (81.9–98.9)	2	4.7 (1.1–18.1)	
інвалідність	20	20	100.0	0	0.0	
інші	69	69	100.0	0	0.0	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	156	153	97.1 (91.0–99.1)	3	2.9 (0.9–9.0)	0.7870
3-10 тис	189	181	96.9 (93.6–98.5)	8	3.1 (1.5–6.4)	
10-20 тис	128	123	95.8 (89.3–98.4)	5	4.2 (1.6–10.7)	
≥20 тис	26	26	100.0	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	426	414	97.0 (94.5–98.4)	12	3.0 (1.6–5.5)	0.4976
так	74	70	95.5 (88.1–98.4)	4	4.5 (1.6–11.9)	

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	190	187	97.4 (91.8–99.2)	3	2.6 (0.8–8.2)	0.6746
так	310	297	96.5 (93.8–98.1)	13	3.5 (1.9–6.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						

	N	Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
		ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	405	397	97.6 (94.9–98.9)	8	2.4 (1.1–5.1)	0.0380
так	94	86	93.2 (86.4–96.7)	8	6.8 (3.3–13.6)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	87	83	95.5 (86.4–98.6)	4	4.5 (1.4–13.6)	0.4979
негативний	413	401	97.1 (94.7–98.4)	12	2.9 (1.6–5.3)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	305	294	96.2 (92.9–98.0)	11	3.8 (2.0–7.1)	0.7553
стимулятори	45	44	98.6 (89.9–99.8)	1	1.4 (0.2–10.1)	
опі+стимул	148	144	97.4 (92.4–99.2)	4	2.6 (0.8–7.6)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	433	417	96.3 (93.8–97.9)	16	3.7 (2.1–6.2)	0.3055
стимулятори	64	64	100.0	0	0.0	
інші	2	2	100.0	0	0.0	

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	500	151	32.5 (28.1–37.2)	276	53.7 (48.9–58.4)	73	13.8 (10.8–17.6)	1.0000
Стать								
чоловік	343	83	25.7 (20.8–31.2)	200	57.1 (51.2–62.8)	60	17.2 (13.0–22.4)	0.0000
жінка	157	68	46.6 (38.3–55.1)	76	46.6 (38.3–55.0)	13	6.9 (3.9–11.9)	
Вікова категорія 4								
<25	8	6	79.8 (34.9–96.7)	2	20.2 (3.3–65.1)	0	0.0	0.0111

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
25-34	126	38	33.4 (24.6–43.5)	74	58.1 (48.3–67.3)	14	8.5 (4.9–14.3)	
35-44	227	56	26.5 (20.6–33.4)	132	56.4 (49.0–63.4)	39	17.1 (12.0–23.9)	
45+	139	51	38.4 (30.1–47.5)	68	47.8 (39.1–56.8)	20	13.7 (8.8–20.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	10	4	33.0 (9.8–69.1)	6	67.0 (30.9–90.2)	0	0.0	0.3975
3-5	18	5	28.9 (11.5–56.0)	12	66.2 (39.8–85.3)	1	4.9 (0.6–31.1)	
6-10	69	19	31.1 (20.4–44.3)	43	60.5 (47.5–72.1)	7	8.4 (3.8–17.6)	
≥11	403	123	32.8 (27.9–38.1)	215	51.8 (46.4–57.1)	65	15.4 (11.8–19.9)	
Партнерський статус								
живе сам	191	66	37.0 (29.6–45.0)	93	45.4 (37.8–53.3)	32	17.6 (11.8–25.4)	0.0221
живе з партнером	309	85	29.5 (24.3–35.4)	183	59.1 (53.1–64.8)	41	11.4 (8.3–15.4)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	103	27	30.4 (21.4–41.1)	57	52.9 (42.5–63.1)	19	16.7 (10.5–25.6)	0.0000
неповний робочий день або тимчасово	277	90	34.0 (28.0–40.4)	149	53.1 (46.6–59.5)	38	12.9 (9.1–18.1)	
безробітний	31	4	15.2 (5.6–35.3)	23	73.9 (54.4–87.0)	4	10.9 (3.8–27.2)	
інвалідність	20	1	4.2 (0.5–28.1)	10	41.8 (19.3–68.5)	9	53.9 (27.6–78.2)	
інші	69	29	44.3 (32.1–57.2)	37	52.6 (39.8–65.0)	3	3.2 (0.9–10.1)	
Категорія місячного доходу								

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	156	66	42.5 (34.3–51.1)	74	46.9 (38.5–55.5)	16	10.6 (6.0–18.1)	0.0247
3-10 тис	189	43	24.0 (17.7–31.6)	119	62.2 (54.1–69.6)	27	13.8 (8.9–20.8)	
10-20 тис	128	35	32.4 (23.8–42.3)	68	50.0 (40.7–59.3)	25	17.6 (11.8–25.5)	
≥20 тис	26	7	24.9 (11.5–45.9)	14	56.1 (35.5–74.8)	5	19.0 (7.5–40.4)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	426	145	35.8 (30.9–41.0)	228	52.6 (47.4–57.7)	53	11.7 (8.7–15.5)	0.0001
так	74	6	10.4 (4.4–22.5)	48	61.2 (47.5–73.3)	20	28.4 (17.5–42.5)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	190	70	38.4 (31.3–46.2)	107	55.8 (48.1–63.3)	13	5.7 (3.2–10.2)	0.0004
так	310	81	28.8 (23.4–34.9)	169	52.4 (46.2–58.5)	60	18.8 (14.3–24.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	405	147	38.8 (33.7–44.1)	213	51.4 (46.1–56.7)	45	9.8 (7.1–13.5)	0.0000
так	94	4	4.1 (1.4–11.1)	62	63.7 (51.9–74.1)	28	32.2 (22.2–44.2)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	87	4	3.7 (1.4–9.8)	56	61.5 (49.0–72.5)	27	34.8 (24.0–47.5)	0.0000
негативний	413	147	38.3 (33.3–43.6)	220	52.1 (46.8–57.3)	46	9.6 (6.9–13.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	305	76	27.5 (22.3–33.4)	173	54.8 (48.7–60.7)	56	17.7 (13.5–23.0)	0.0434
стимулятори	45	14	34.5 (20.8–51.3)	26	57.4 (41.1–72.1)	5	8.2 (3.2–19.4)	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
опі+стимул	148	61	41.1 (32.6–50.2)	75	50.4 (41.5–59.3)	12	8.5 (4.2–16.3)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	433	134	33.1 (28.4–38.2)	231	51.8 (46.7–57.0)	68	15.1 (11.6–19.3)	0.1990
стимулятори	64	17	29.5 (18.5–43.7)	42	64.4 (50.5–76.2)	5	6.1 (2.4–14.6)	
інші	2	0	0.0	2	100.0	0	0.0	

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	181	37.4	(32.8–42.1)
	гепатит C	205	43.1	(38.3–47.9)
	сифіліс	2	0.3	(0.1–1.4)
	гонорея	26	4.2	(2.8–6.2)
	хламідіоз	27	5.1	(3.4–7.4)
	герпес	124	23.9	(20.1–28.1)
	папіломавірус	20	3.7	(2.3–5.8)
	туберкульоз	145	29.6	(25.4–34.1)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	160	89.2	(83.6–93.1)
	пролікувався неуспішно	10	5.4	(2.8–10.2)
	не завершив	4	1.9	(0.7–5.4)
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	7	3.5	(1.6–7.3)
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	102	51.3	(43.7–58.8)
	пролікувався неуспішно	57	29.5	(22.9–37.0)
	не завершив	8	3.4	(1.6–6.7)
	зараз лікується	10	3.8	(2.0–7.2)
	ніколи не лікувався	27	12.0	(8.2–17.4)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	1	100.0	
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	0	0.0	
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	132	91.1	(84.7–95.0)
	пролікувався неуспішно	9	6.7	(3.4–12.9)
	не завершив	3	1.3	(0.4–4.0)

	n	%	ДІ
зараз лікується	0	0.0	
ніколи не лікувався	1	0.9	(0.1–6.2)

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

	n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців			
так	125	25.9	(21.9–30.4)
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	138	26.5	(22.6–30.8)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	102	74.3	(65.9–81.2)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	42	30.8	(23.2–39.6)
приватна клініка	4	3.1	(1.1–8.1)
приватна лабораторія	2	1.2	(0.3–4.9)
протитуберкульозного диспансеру	4	2.7	(1.0–7.2)
наркологічний диспансер	0	0.0	
ІПСШ	2	1.1	(0.3–4.5)
швидкої допомоги	2	1.4	(0.3–5.5)
мобільна амбулаторія	0	0.0	
інше	7	4.5	(2.1–9.3)
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	97	70.2	(61.6–77.7)
лікарня, ВІЛ-клініка	29	21.8	(15.3–30.1)
приватна клініка	3	2.3	(0.7–7.2)
приватна лабораторія	0	0.0	
протитуберкульозний диспансер	4	2.7	(1.0–7.2)
наркологічна клініка	0	0.0	
ІПСШ клініка	1	0.5	(0.1–3.7)
швидка допомога	1	0.8	(0.1–5.3)
мобільна клініка	0	0.0	
інші	3	1.7	(0.5–5.1)
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	126	91.5	(85.2–95.2)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	446	89.9	(86.8–92.3)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	84	20.7	(16.7–25.3)
раз на місяць	95	22.2	(18.2–26.8)
3-4 рази в 12 місяців	118	26.5	(22.2–31.3)
тільки один раз	148	30.6	(26.3–35.3)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	464	93.8 (91.4–95.6)	36	6.2 (4.4–8.6)	1.0000
Стать							
	чоловік	343	313	92.4 (89.0–94.8)	30	7.6 (5.2–11.0)	0.0526
	жінка	157	151	96.8 (92.7–98.6)	6	3.2 (1.4–7.3)	
Вікова категорія 4							
	<25	8	8	100.0	0	0.0	0.5111
	25-34	126	118	95.0 (90.2–97.5)	8	5.0 (2.5–9.8)	
	35-44	227	208	92.2 (87.7–95.2)	19	7.8 (4.8–12.3)	
	45+	139	130	95.0 (90.4–97.4)	9	5.0 (2.6–9.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	10	9	94.2 (59.8–99.4)	1	5.8 (0.6–40.2)	0.9863
	3-5	18	17	95.1 (68.9–99.4)	1	4.9 (0.6–31.1)	
	6-10	69	64	93.2 (83.9–97.3)	5	6.8 (2.7–16.1)	
	≥11	403	374	93.8 (91.1–95.8)	29	6.2 (4.2–8.9)	
Партнерський статус							

	N	Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
		ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	191	176	93.6 (89.2–96.3)	15	6.4 (3.7–10.8)	0.8675
живе з партнером	309	288	93.9 (90.7–96.1)	21	6.1 (3.9–9.3)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	103	94	91.6 (83.7–95.9)	9	8.4 (4.1–16.3)	0.5007
неповний робочий день або тимчасово	277	258	94.2 (91.0–96.4)	19	5.8 (3.6–9.0)	
безробітний	31	29	93.8 (76.8–98.6)	2	6.2 (1.4–23.2)	
інвалідність	20	17	88.0 (64.3–96.8)	3	12.0 (3.2–35.7)	
інші	69	66	96.8 (90.1–99.0)	3	3.2 (1.0–9.9)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	156	156	100.0	0	0.0	0.0000
3-10 тис	189	175	93.4 (88.8–96.1)	14	6.6 (3.9–11.2)	
10-20 тис	128	110	87.4 (80.2–92.3)	18	12.6 (7.7–19.8)	
≥20 тис	26	22	84.2 (63.0–94.3)	4	15.8 (5.7–37.0)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	426	401	94.8 (92.2–96.6)	25	5.2 (3.4–7.8)	0.0120
так	74	63	87.2 (77.6–93.1)	11	12.8 (6.9–22.4)	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

	N	Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
		ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	190	175	92.9 (88.1–95.9)	15	7.1 (4.1–11.9)	0.5202
так	310	289	94.3 (91.3–96.4)	21	5.7 (3.6–8.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	405	374	93.6 (90.8–95.6)	31	6.4 (4.4–9.2)	0.6632
так	94	89	94.8 (87.6–97.9)	5	5.2 (2.1–12.4)	
Результат тесту на ВІЛ						

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	87	82	92.6 (82.4–97.1)	5	7.4 (2.9–17.6)	0.6510
негативний	413	382	94.1 (91.6–95.8)	31	5.9 (4.2–8.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	305	279	92.1 (88.4–94.7)	26	7.9 (5.3–11.6)	0.2557
стимулятори	45	43	95.6 (83.4–99.0)	2	4.4 (1.0–16.6)	
опі+стимул	148	140	96.3 (92.5–98.2)	8	3.7 (1.8–7.5)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	433	401	93.6 (90.9–95.6)	32	6.4 (4.4–9.1)	0.8832
стимулятори	64	60	94.7 (86.3–98.1)	4	5.3 (1.9–13.7)	
інші	2	2	100.0	0	0.0	

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	120	23.0 (19.3–27.1)	150	32.2 (27.8–37.0)	139	27.6 (23.6–32.1)	91	17.2 (14.0–20.9)	1.0000
Стать										
чоловік	343	79	21.9 (17.7–26.9)	99	31.2 (25.8–37.1)	92	26.1 (21.4–31.5)	73	20.7 (16.5–25.7)	0.0433
жінка	157	41	25.1 (18.6–33.0)	51	34.3 (26.7–42.9)	47	30.7 (23.5–39.1)	18	9.8 (6.1–15.4)	
Вікова категорія 4										
<25	8	2	16.3 (2.7–58.1)	3	32.3 (7.3–74.3)	3	51.4 (15.1–86.3)	0	0.0	0.1936
25-34	126	37	28.9 (21.3–38.0)	42	37.1 (28.0–47.2)	29	20.6 (14.3–28.8)	18	13.3 (8.2–20.9)	
35-44	227	58	23.9 (18.6–30.3)	60	29.8 (23.3–37.3)	67	29.2 (23.2–36.0)	42	17.0 (12.5–22.7)	

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
45+	139	23	17.0 (11.2–25.0)	45	32.1 (24.3–40.9)	40	29.4 (21.9–38.3)	31	21.5 (15.2–29.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	10	2	14.9 (2.8–51.5)	7	74.2 (36.5–93.5)	1	11.0 (1.1–57.6)	0	0.0	0.0001
3-5	18	7	36.7 (16.9–62.2)	9	51.3 (27.5–74.6)	2	12.0 (2.5–41.7)	0	0.0	
6-10	69	28	41.8 (30.0–54.5)	21	30.2 (20.0–42.8)	10	15.4 (8.1–27.5)	10	12.7 (6.7–22.7)	
≥11	403	83	19.5 (15.8–23.9)	113	30.8 (25.8–36.2)	126	30.6 (26.0–35.7)	81	19.0 (15.3–23.4)	
Партнерський статус										
живе сам	191	44	19.8 (14.6–26.2)	53	32.1 (24.6–40.5)	50	26.2 (19.9–33.6)	44	22.0 (16.4–28.9)	0.1579
живе з партнером	309	76	25.1 (20.3–30.6)	97	32.3 (26.9–38.2)	89	28.6 (23.5–34.3)	47	14.0 (10.5–18.5)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	103	29	29.6 (20.9–40.0)	33	30.8 (22.1–41.0)	26	27.9 (19.3–38.6)	15	11.7 (7.0–19.0)	0.4744
неповний робочий день або тимчасово	277	62	20.7 (16.1–26.1)	87	34.0 (28.0–40.6)	73	26.3 (21.0–32.4)	55	19.0 (14.5–24.4)	
безробітний	31	10	32.0 (17.4–51.1)	3	9.2 (2.8–26.3)	11	35.3 (19.8–54.6)	7	23.6 (11.1–43.3)	
інвалідність	20	5	22.5 (8.3–48.4)	5	33.1 (10.6–67.3)	8	30.6 (13.1–56.4)	2	13.8 (3.1–44.3)	
інші	69	14	19.5 (11.4–31.5)	22	35.7 (24.2–49.2)	21	28.8 (19.0–41.2)	12	15.9 (8.9–26.9)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	156	16	10.1 (6.1–16.4)	44	29.6 (22.2–38.3)	65	40.9 (32.8–49.6)	31	19.3 (13.5–26.8)	0.0000
3-10 тис	189	54	28.4 (22.0–35.9)	53	30.4 (23.3–38.5)	51	25.9 (19.8–33.0)	31	15.3 (10.7–21.4)	
10-20 тис	128	45	33.5 (25.5–42.7)	45	39.5 (30.5–49.3)	17	12.3 (7.5–19.7)	21	14.6 (9.4–21.9)	
≥20 тис	26	5	21.2 (8.5–43.7)	7	25.1 (11.4–46.4)	6	23.5 (10.1–45.6)	8	30.2 (14.8–52.0)	
Був позбавлений волі будь-коли										

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	426	105	23.2 (19.3–27.7)	125	31.8 (27.0–37.0)	122	28.7 (24.3–33.6)	74	16.2 (12.9–20.2)	0.3719
так	74	15	21.4 (12.7–33.6)	25	34.8 (23.2–48.6)	17	20.5 (12.6–31.5)	17	23.3 (14.5–35.4)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	120	23.0 (19.3–27.1)	150	32.2 (27.8–37.0)	139	27.6 (23.6–32.1)	91	17.2 (14.0–20.9)	1.0000
Стать										
чоловік	343	79	21.9 (17.7–26.9)	99	31.2 (25.8–37.1)	92	26.1 (21.4–31.5)	73	20.7 (16.5–25.7)	0.0433
жінка	157	41	25.1 (18.6–33.0)	51	34.3 (26.7–42.9)	47	30.7 (23.5–39.1)	18	9.8 (6.1–15.4)	
Вікова категорія 4										
<25	8	2	16.3 (2.7–58.1)	3	32.3 (7.3–74.3)	3	51.4 (15.1–86.3)	0	0.0	0.1936
25-34	126	37	28.9 (21.3–38.0)	42	37.1 (28.0–47.2)	29	20.6 (14.3–28.8)	18	13.3 (8.2–20.9)	
35-44	227	58	23.9 (18.6–30.3)	60	29.8 (23.3–37.3)	67	29.2 (23.2–36.0)	42	17.0 (12.5–22.7)	
45+	139	23	17.0 (11.2–25.0)	45	32.1 (24.3–40.9)	40	29.4 (21.9–38.3)	31	21.5 (15.2–29.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	10	2	14.9 (2.8–51.5)	7	74.2 (36.5–93.5)	1	11.0 (1.1–57.6)	0	0.0	0.0001
3-5	18	7	36.7 (16.9–62.2)	9	51.3 (27.5–74.6)	2	12.0 (2.5–41.7)	0	0.0	
6-10	69	28	41.8 (30.0–54.5)	21	30.2 (20.0–42.8)	10	15.4 (8.1–27.5)	10	12.7 (6.7–22.7)	
≥11	403	83	19.5 (15.8–23.9)	113	30.8 (25.8–36.2)	126	30.6 (26.0–35.7)	81	19.0 (15.3–23.4)	
Партнерський статус										

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	191	44	19.8 (14.6–26.2)	53	32.1 (24.6–40.5)	50	26.2 (19.9–33.6)	44	22.0 (16.4–28.9)	0.1579
живе з партнером	309	76	25.1 (20.3–30.6)	97	32.3 (26.9–38.2)	89	28.6 (23.5–34.3)	47	14.0 (10.5–18.5)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	103	29	29.6 (20.9–40.0)	33	30.8 (22.1–41.0)	26	27.9 (19.3–38.6)	15	11.7 (7.0–19.0)	0.4744
неповний робочий день або тимчасово	277	62	20.7 (16.1–26.1)	87	34.0 (28.0–40.6)	73	26.3 (21.0–32.4)	55	19.0 (14.5–24.4)	
безробітний	31	10	32.0 (17.4–51.1)	3	9.2 (2.8–26.3)	11	35.3 (19.8–54.6)	7	23.6 (11.1–43.3)	
інвалідність	20	5	22.5 (8.3–48.4)	5	33.1 (10.6–67.3)	8	30.6 (13.1–56.4)	2	13.8 (3.1–44.3)	
інші	69	14	19.5 (11.4–31.5)	22	35.7 (24.2–49.2)	21	28.8 (19.0–41.2)	12	15.9 (8.9–26.9)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	156	16	10.1 (6.1–16.4)	44	29.6 (22.2–38.3)	65	40.9 (32.8–49.6)	31	19.3 (13.5–26.8)	0.0000
3-10 тис	189	54	28.4 (22.0–35.9)	53	30.4 (23.3–38.5)	51	25.9 (19.8–33.0)	31	15.3 (10.7–21.4)	
10-20 тис	128	45	33.5 (25.5–42.7)	45	39.5 (30.5–49.3)	17	12.3 (7.5–19.7)	21	14.6 (9.4–21.9)	
≥20 тис	26	5	21.2 (8.5–43.7)	7	25.1 (11.4–46.4)	6	23.5 (10.1–45.6)	8	30.2 (14.8–52.0)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	426	105	23.2 (19.3–27.7)	125	31.8 (27.0–37.0)	122	28.7 (24.3–33.6)	74	16.2 (12.9–20.2)	0.3719
так	74	15	21.4 (12.7–33.6)	25	34.8 (23.2–48.6)	17	20.5 (12.6–31.5)	17	23.3 (14.5–35.4)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

	Результат скринінгу тривоги GAD-7									
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Разом	500	185	37.5 (33.0–42.3)	166	35.0 (30.5–39.7)	126	23.5 (19.9–27.7)	23	4.0 (2.6–6.0)	1.0000
Стать										
чоловік	343	121	35.3 (29.9–41.1)	111	34.2 (28.8–40.0)	93	25.8 (21.2–31.0)	18	4.7 (2.9–7.5)	0.1763
жінка	157	64	42.2 (34.1–50.7)	55	36.6 (28.8–45.2)	33	18.9 (13.3–26.0)	5	2.4 (0.9–5.9)	
Вікова категорія 4										
<25	8	3	28.4 (6.2–70.4)	5	71.6 (29.6–93.8)	0	0.0	0	0.0	0.0214
25-34	126	50	41.1 (32.1–50.7)	40	33.1 (24.5–43.1)	30	22.1 (15.5–30.4)	6	3.7 (1.6–8.3)	
35-44	227	92	41.6 (34.7–48.9)	70	32.4 (26.0–39.5)	51	20.2 (15.2–26.3)	14	5.8 (3.4–9.7)	
45+	139	40	28.7 (21.3–37.4)	51	38.3 (30.0–47.5)	45	31.5 (24.0–40.1)	3	1.5 (0.5–4.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	10	5	51.1 (18.9–82.4)	5	48.9 (17.6–81.1)	0	0.0	0	0.0	0.0189
3-5	18	11	63.4 (37.7–83.2)	6	32.5 (13.9–58.9)	1	4.1 (0.5–27.3)	0	0.0	
6-10	69	34	51.9 (39.4–64.1)	21	29.5 (19.4–42.0)	11	14.8 (8.1–25.4)	3	3.9 (1.2–11.7)	
≥11	403	135	33.8 (28.9–39.1)	134	35.6 (30.6–41.0)	114	26.3 (22.0–31.1)	20	4.2 (2.7–6.6)	
Партнерський статус										
живе сам	191	66	35.8 (28.5–44.0)	59	32.5 (25.4–40.6)	53	26.1 (20.0–33.3)	13	5.5 (3.1–9.6)	0.3462
живе з партнером	309	119	38.7 (33.0–44.6)	107	36.5 (30.9–42.6)	73	21.9 (17.5–27.0)	10	2.9 (1.5–5.5)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	103	52	51.1 (40.8–61.4)	30	30.6 (21.7–41.3)	16	14.4 (8.7–22.7)	5	3.9 (1.6–9.3)	0.0483

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
неповний робочий день або тимчасово	277	99	35.6 (29.7–42.0)	100	38.1 (32.0–44.6)	66	22.5 (17.7–28.2)	12	3.8 (2.1–6.7)	
безробітний	31	9	28.3 (14.7–47.3)	7	23.2 (10.9–42.7)	14	46.3 (28.8–64.8)	1	2.2 (0.3–15.2)	
інвалідність	20	6	42.0 (17.2–71.6)	7	27.1 (11.0–53.0)	6	25.6 (9.8–52.1)	1	5.2 (0.6–32.8)	
інші	69	19	28.5 (18.2–41.6)	22	35.1 (23.8–48.4)	24	31.4 (21.2–43.6)	4	5.1 (1.7–13.9)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	156	33	22.4 (15.8–30.7)	69	45.9 (37.5–54.5)	52	30.7 (23.6–38.8)	2	1.1 (0.3–4.3)	0.0000
3-10 тис	189	78	42.2 (34.6–50.1)	57	32.1 (25.1–40.0)	44	21.1 (15.7–27.7)	10	4.7 (2.4–8.8)	
10-20 тис	128	63	50.9 (41.6–60.2)	35	27.2 (19.7–36.4)	23	16.8 (11.1–24.8)	7	5.0 (2.3–10.5)	
≥20 тис	26	10	42.2 (23.5–63.4)	5	17.3 (6.8–37.5)	7	25.6 (11.8–47.2)	4	14.9 (5.2–35.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	426	154	36.5 (31.7–41.6)	152	37.5 (32.6–42.7)	102	22.3 (18.5–26.7)	18	3.7 (2.3–5.9)	0.0199
так	74	31	44.4 (32.0–57.6)	14	18.2 (10.7–29.3)	24	31.6 (21.3–44.2)	5	5.7 (2.3–13.6)	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	190	77	40.7 (33.5–48.4)	71	38.8 (31.6–46.6)	34	17.4 (12.4–23.8)	8	3.1 (1.5–6.3)	0.0685
так	310	108	35.6 (29.9–41.8)	95	32.6 (27.0–38.8)	92	27.3 (22.4–32.8)	15	4.5 (2.6–7.4)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	405	155	38.8 (33.8–44.1)	135	35.2 (30.2–40.5)	97	22.4 (18.4–27.0)	18	3.6 (2.2–5.7)	0.5346

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
так	94	30	32.1 (22.3–43.7)	31	34.4 (24.6–45.6)	29	28.8 (20.2–39.3)	4	4.8 (1.7–12.6)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	87	31	35.6 (25.1–47.8)	33	40.2 (29.2–52.2)	17	18.4 (11.2–28.8)	6	5.7 (2.4–13.0)	0.4580
негативний	413	154	37.9 (33.0–43.2)	133	33.9 (29.0–39.1)	109	24.6 (20.5–29.2)	17	3.6 (2.2–5.8)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	305	133	44.2 (38.3–50.3)	97	32.3 (26.9–38.2)	63	19.9 (15.6–24.9)	12	3.7 (2.0–6.5)	0.0002
стимулятори	45	14	33.7 (20.3–50.5)	9	22.1 (11.2–38.9)	14	29.5 (17.2–45.9)	8	14.7 (6.9–28.3)	
опі+стимул	148	37	26.5 (19.1–35.4)	59	43.0 (34.3–52.1)	49	28.8 (21.8–37.0)	3	1.8 (0.6–5.4)	
інші	2	1	42.3 (0.0–100.0)	1	57.7 (0.0–100.0)	0	0.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання										
опіоїди	433	157	36.0 (31.2–41.1)	153	37.4 (32.5–42.6)	107	23.3 (19.4–27.8)	16	3.3 (2.0–5.4)	0.0441
стимулятори	64	26	46.9 (33.8–60.4)	13	19.8 (11.2–32.6)	18	24.5 (15.1–37.1)	7	8.8 (4.0–18.4)	
інші	2	1	37.2 (0.0–100.0)	0	0.0	1	62.8 (0.0–100.0)	0	0.0	

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	31	6.4	(4.4–9.2)
збут наркотиків	7	2.3	(1.0–5.3)
зберігання наркотиків	24	4.6	(3.1–7.0)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	29	5.8	(3.9–8.4)
збут наркотиків	4	0.9	(0.3–2.7)
зберігання наркотиків	20	3.9	(2.5–6.1)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	144	26.7	(22.8–31.1)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	74	13.1	(10.3–16.6)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	12	16.8	(9.6–27.8)
6м-2р	25	34.7	(23.1–48.3)
2-4р	24	30.7	(20.7–42.7)
4 роки +	13	17.9	(10.3–29.3)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	16	21.5	(13.1–33.3)

	n	%	ДІ
1-3р	12	15.4	(8.6–26.1)
3-5р	18	22.9	(14.4–34.4)
5-10р	12	20.1	(10.6–35.0)
10 років +	16	20.1	(12.2–31.2)
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	39	54.7	(42.2–66.7)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	372	75.2	(70.9–79.1)
так, за останні 6м	67	13.4	(10.5–17.0)
так, але 6+ місяців тому	61	11.4	(8.7–14.8)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	235	44.5	(39.8–49.2)
так, за останні 6м	175	37.3	(32.7–42.1)
так, але 6+ місяців тому	90	18.2	(14.7–22.3)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	316	60.9	(56.0–65.6)
так, за останні 6м	128	27.4	(23.2–32.0)
так, але 6+ місяців тому	56	11.7	(8.8–15.3)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	281	54.3	(49.5–59.0)
так	219	45.7	(41.0–50.5)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	280	55.7	(50.9–60.4)
так	220	44.3	(39.6–49.1)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			

	n	%	ДІ
ні	146	66.2	(59.2–72.6)
так	74	33.8	(27.4–40.8)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців			
ні	346	67.5	(62.8–72.0)
так	152	32.5	(28.0–37.2)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

		Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	500	219	45.7 (41.0–50.5)	1.0000	220	74	33.8 (27.4–40.8)	1.0000
Стать									
	чоловік	343	137	42.3 (36.6–48.2)	0.0428	141	39	29.3 (21.8–38.1)	0.0849
	жінка	157	82	52.9 (44.4–61.2)		79	35	41.6 (30.6–53.4)	
Вікова категорія 4									
	<25	8	4	51.9 (15.3–86.6)	0.0292	5	3	44.4 (7.8–88.3)	0.0125
	25-34	126	69	58.5 (49.1–67.4)		66	29	46.5 (34.1–59.4)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
35-44	227	89	42.5 (35.5–49.8)		88	31	35.4 (25.4–46.9)	
45+	139	57	40.2 (31.8–49.1)		61	11	17.0 (9.4–28.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	10	5	50.9 (18.8–82.3)	0.4708	9	2	24.0 (4.5–68.0)	0.1916
3-5	18	11	62.8 (37.0–82.9)		11	3	27.3 (8.1–61.8)	
6-10	69	31	48.8 (36.5–61.3)		35	19	49.5 (32.5–66.8)	
≥11	403	172	44.4 (39.1–49.8)		165	50	31.2 (24.0–39.4)	
Партнерський статус								
живе сам	191	85	49.6 (41.6–57.5)	0.2086	88	30	34.8 (24.8–46.4)	0.7982
живе з партнером	309	134	43.2 (37.4–49.2)		132	44	33.0 (25.1–42.0)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	103	52	51.3 (41.0–61.5)	0.0002	47	19	44.7 (30.1–60.2)	0.1138
неповний робочий день або тимчасово	277	123	47.6 (41.2–54.1)		121	36	30.0 (22.1–39.4)	
безробітний	31	6	17.7 (7.7–35.5)		10	2	19.4 (4.4–55.5)	
інвалідність	20	3	9.6 (2.6–29.6)		7	0	0.0	
інші	69	35	51.5 (38.9–64.0)		35	17	44.1 (27.7–62.0)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	156	101	66.7 (58.4–74.1)	0.0000	72	24	34.0 (23.2–46.6)	0.1945
3-10 тис	189	63	34.2 (27.1–42.0)		77	22	28.4 (18.9–40.3)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
10-20 тис	128	50	38.7 (30.1–48.1)		64	24	37.1 (25.5–50.4)	
≥20 тис	26	5	16.7 (6.5–36.5)		6	4	72.1 (28.9–94.2)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	426	201	49.4 (44.3–54.6)	0.0000	196	71	36.3 (29.4–43.7)	0.0138
так	74	18	21.3 (13.4–32.3)		24	3	11.1 (3.3–31.2)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	190	82	45.7 (38.2–53.4)	0.9967	101	35	37.3 (27.8–48.0)	0.3418
так	310	137	45.7 (39.7–51.9)		119	39	30.8 (22.7–40.3)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	405	186	48.5 (43.2–53.8)	0.0148	192	66	35.2 (28.3–42.8)	0.2067
так	94	33	33.6 (24.1–44.5)		28	8	23.1 (11.0–42.2)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	87	33	36.9 (26.6–48.6)	0.0960	28	3	8.4 (2.5–24.5)	0.0013
негативний	413	186	47.5 (42.3–52.8)		192	71	37.6 (30.6–45.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	305	110	36.4 (30.7–42.4)	0.0000	120	38	31.6 (23.5–40.9)	0.8475
стимулятори	45	9	25.9 (13.5–43.9)		18	6	35.9 (15.7–62.7)	
опі+стимул	148	99	67.7 (58.7–75.5)		80	29	35.7 (25.2–47.8)	
інші	2	1	42.3 (0.0–100.0)		2	1	57.7 (0.0–100.0)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	433	198	47.0 (41.9–52.2)	0.1278	187	65	34.9 (27.9–42.5)	0.5856

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
стимулятори	64	19	36.4 (24.2–50.7)		30	9	30.2 (15.5–50.5)	
інші	2	2	100.0		2	0	0.0	

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	20	3.6	(2.3–5.6)
так, з інших причин	21	3.6	(2.3–5.5)
ні	459	92.8	(90.3–94.8)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	0	0.0	
інша країна	6	27.5	(12.5–50.3)
інша область	3	20.6	(7.0–47.4)
інше місто	8	38.4	(19.9–61.0)
інший район	2	7.7	(1.9–26.7)
інший будинок	1	5.7	(0.8–31.3)
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			
та сама область	36	89.3	(74.0–96.1)
інша область	4	10.7	(3.9–26.0)
інша країна	0	0.0	



Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)



Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)

Результати для міста: Чернігів




Рис. A. Мережа рекрутингу RDS у місті Чернігів

1. Соціально-демографічна інформація

Таблиця 1.1. Соціально-демографічні характеристики

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Вік, років	500	40.4	(39.4–41.4)	40	(35–45)
Вік першого неін'єкційного вживання наркотиків	478	17.1	(16.5–17.7)	16	(14–17)
Років з початку неін'єкційного вживання наркотиків	478	23.0	(21.9–24.2)	24	(17–29)
Вік першого ін'єкційного вживання наркотиків	500	20.5	(19.8–21.3)	19	(16–23)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків	500	19.9	(18.6–21.1)	21	(12–26)
Особистий місячний дохід, грн	462	7,801.6	(6504.6–9098.6)	5,000	(3000–9000)

Таблиця 1.2. Описова статистика для соціодемографії

	Сайт	n	%	ДІ
Стать				
чоловік	Чернігів	398	76.4	(70.7–81.2)
жінка	Чернігів	102	23.6	(18.8–29.3)
Вікова категорія 4				
<25	Чернігів	9	3.1	(1.2–7.4)
25-34	Чернігів	92	20.4	(16.3–25.2)
35-44	Чернігів	246	47.9	(42.2–53.6)
45+	Чернігів	153	28.7	(23.7–34.2)
Сімейний стан				
одружений або проживають разом	Чернігів	181	35.6	(30.1–41.4)
одружений, але має іншого партнера	Чернігів	3	1.6	(0.3–7.3)
не одружений, але є партнер	Чернігів	115	26.2	(21.5–31.4)
одружений, але не живуть разом	Чернігів	6	1.0	(0.4–2.6)
не одружений та не мають партнера	Чернігів	195	35.6	(30.4–41.2)
Партнерський статус				
живе сам	Чернігів	201	36.7	(31.5–42.2)
живе з партнером	Чернігів	299	63.3	(57.8–68.5)
Освіта 3 категорії				
незак. середня школа	Чернігів	34	6.5	(4.4–9.7)
середня школа	Чернігів	255	50.6	(44.9–56.3)
> середня школа	Чернігів	211	42.9	(37.3–48.6)
Поточна професія				
учень школи	Чернігів	0	0.0	
студент коледжу/університету	Чернігів	2	0.4	(0.1–2.7)
постійна робота	Чернігів	151	24.0	(19.7–28.8)
непостійна робота	Чернігів	225	51.6	(45.8–57.3)
безробітний	Чернігів	68	13.7	(10.0–18.5)
домогосподарка	Чернігів	7	0.8	(0.3–2.0)
інвалідність	Чернігів	39	7.9	(5.0–12.2)
військовий	Чернігів	5	1.2	(0.5–3.0)
інші	Чернігів	3	0.4	(0.1–2.0)
Безхатченко				
ніколи	Чернігів	454	90.5	(86.8–93.2)
так, 12м+ тому	Чернігів	45	9.3	(6.6–12.9)
так, за останні 12м	Чернігів	1	0.2	(0.0–1.5)

	Сайт	n	%	ДІ
Безхатченко за 12 місяців (з тих, що були колись)				
ні	Чернігів	45	97.7	(85.3–99.7)
так	Чернігів	1	2.3	(0.3–14.7)
Категорія місячного доходу				
<3 тис	Чернігів	97	21.8	(17.2–27.3)
3-10 тис	Чернігів	237	54.0	(48.0–59.8)
10-20 тис	Чернігів	94	18.0	(14.1–22.7)
≥20 тис	Чернігів	34	6.2	(4.1–9.3)
Місячний дохід до прожиткового мінімуму на 2023 рік				
<2684	Чернігів	96	21.8	(17.1–27.2)
≥2684	Чернігів	366	78.2	(72.8–82.9)
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків				
≤2	Чернігів	29	7.9	(5.3–11.7)
3-5	Чернігів	17	5.3	(2.8–9.6)
6-10	Чернігів	38	8.0	(5.5–11.4)
≥11	Чернігів	416	78.8	(73.6–83.3)

Таблиця 1.3. Проживання за останні 12 місяців

	Сайт	n	%	ДІ
власне житло	Чернігів	337	67.8	(62.3–72.8)
у друзів або родичів	Чернігів	132	25.1	(20.6–30.3)
оренда	Чернігів	39	9.0	(6.2–12.7)
різне	Чернігів	7	1.6	(0.7–3.5)
на вулиці (безхатько)	Чернігів	1	0.2	(0.0–1.5)
у притулку для біженців	Чернігів	0	0.0	




Рис 1.1. Розподіл віку за статтю (%)




Рис 1.2. Тенденція в статевому розподілі за раундами дослідження (%)




Рис 1.3. Тенденція у вікових групах за раундами дослідження (%)

2. Вживання наркотиків




Рис 2.1. Вживання ін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 2.2. Вживання неін'єкційних наркотиків за останні 12 місяців (%)




Рис 2.3. Тенденції щодо типів ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.4. Тенденції вживання ін'єкційних опіоїдів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.5. Тенденції вживання ін'єкційних стимуляторів за останні 30 днів за раундами дослідження (%)



Рис 2.6. Тенденції вживання ін'єкційних наркотиків за останні 30 днів за раундами дослідження (%)




Рис 2.7. Надання переваги ін'єкційним наркотикам (%)

Таблиця 2.1. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за соціально-демографічними характеристиками

			Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
		N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього											
	Разом	500	388	65.9 (60.0–71.3)	90	29.6 (24.3–35.5)	21	4.2 (2.6–6.9)	1	0.3 (0.0–2.2)	1.0000
Стать											
	чоловік	398	307	65.4 (58.8–71.4)	70	29.0 (23.2–35.5)	20	5.3 (3.2–8.6)	1	0.4 (0.1–2.9)	0.3996

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
жінка	102	81	67.5 (53.4–79.0)	20	31.6 (20.2–45.7)	1	0.9 (0.1–6.4)	0	0.0	
Вікова категорія 4										
<25	9	3	8.4 (1.1–42.9)	6	91.6 (57.1–98.9)	0	0.0	0	0.0	0.0000
25-34	92	51	39.5 (28.6–51.6)	34	53.9 (41.8–65.6)	7	6.6 (2.9–14.2)	0	0.0	
35-44	246	199	72.7 (65.0–79.3)	38	23.2 (17.1–30.7)	9	4.0 (1.9–8.3)	0	0.0	
45+	153	135	79.3 (66.7–88.0)	12	16.2 (8.3–29.3)	5	3.4 (1.1–9.7)	1	1.1 (0.2–7.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	29	13	36.3 (18.8–58.3)	14	58.6 (37.2–77.2)	2	5.1 (1.2–19.8)	0	0.0	0.0080
3-5	17	11	51.3 (20.8–80.8)	5	44.6 (16.0–77.3)	1	4.1 (0.5–28.8)	0	0.0	
6-10	38	22	40.5 (24.1–59.3)	12	48.2 (30.0–66.9)	4	11.4 (4.0–28.2)	0	0.0	
≥11	416	342	72.4 (66.0–78.0)	59	23.8 (18.4–30.1)	14	3.4 (1.8–6.4)	1	0.4 (0.1–2.8)	
Партнерський статус										
живе сам	201	158	70.2 (61.4–77.8)	32	24.7 (17.7–33.3)	11	5.1 (2.5–10.2)	0	0.0	0.4000
живе з партнером	299	230	63.4 (55.5–70.5)	58	32.4 (25.4–40.3)	10	3.7 (1.9–7.2)	1	0.5 (0.1–3.5)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	151	116	61.7 (50.9–71.5)	30	35.0 (25.4–45.9)	5	3.3 (1.3–8.3)	0	0.0	0.3008
неповний робочий день або тимчасово	225	169	66.6 (58.2–74.1)	42	27.9 (20.7–36.3)	14	5.5 (3.0–9.9)	0	0.0	
безробітний	68	54	65.7 (48.8–79.5)	13	31.2 (18.2–48.1)	1	3.0 (0.4–19.1)	0	0.0	

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
інвалідність	39	35	71.7 (40.0–90.6)	3	24.3 (6.8–58.7)	0	0.0	1	4.0 (0.5–25.1)	
інші	17	14	71.9 (36.1–92.0)	2	21.5 (4.5–61.0)	1	6.7 (0.8–39.8)	0	0.0	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	97	78	76.4 (64.2–85.4)	12	16.1 (8.8–27.5)	6	5.9 (2.2–14.9)	1	1.6 (0.2–10.5)	0.0614
3-10 тис	237	177	59.5 (50.6–67.8)	53	37.6 (29.4–46.6)	7	2.9 (1.2–6.8)	0	0.0	
10-20 тис	94	75	68.4 (54.9–79.4)	14	26.4 (16.1–40.2)	5	5.2 (2.0–12.9)	0	0.0	
≥20 тис	34	26	64.2 (42.1–81.6)	6	27.1 (12.3–49.8)	2	8.6 (2.0–30.9)	0	0.0	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	330	243	61.0 (53.8–67.8)	77	36.1 (29.4–43.4)	10	2.9 (1.4–5.8)	0	0.0	0.0001
так	170	145	78.6 (69.2–85.7)	13	12.6 (7.2–21.1)	11	7.7 (3.9–14.7)	1	1.1 (0.2–7.7)	

Таблиця 2.2. Види наркотиків ін'єкційного вживання за останні 30 днів за обраними підгрупами

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	294	196	60.2 (53.4–66.7)	80	34.4 (28.1–41.3)	17	4.9 (2.9–8.3)	1	0.4 (0.1–2.9)	0.0117
так	205	191	82.8 (69.2–91.2)	10	15.0 (7.1–29.2)	4	2.2 (0.6–7.2)	0	0.0	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	294	190	63.2 (56.8–69.1)	87	32.1 (26.3–38.4)	16	4.4 (2.7–7.3)	1	0.3 (0.0–2.4)	0.0004
так	205	197	96.7 (93.4–98.4)	3	1.2 (0.4–3.8)	5	2.1 (0.9–5.1)	0	0.0	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	118	102	73.0 (56.8–84.7)	12	23.3 (12.1–40.0)	4	3.8 (1.0–13.4)	0	0.0	0.6738

		Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії							
	N	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
негативний	382	286	64.3 (57.8–70.3)	78	31.0 (25.2–37.4)	17	4.3 (2.6–7.3)	1	0.4 (0.1–2.7)	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	403	386	94.8 (91.0–97.0)	2	1.0 (0.2–4.0)	14	3.8 (2.0–7.1)	1	0.5 (0.1–3.2)	
стимулятори	95	1	1.0 (0.1–7.1)	87	93.7 (87.4–97.0)	7	5.3 (2.4–11.1)	0	0.0	
інші	0	0		0		0		0		

Таблиця 2.3. Частота введення

	Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
	опіоїди		стимулятори		опі+стимул		інші		
	n	%	n	%	n	%	n	%	p-значення
Частота ін'єкцій: останні 24 години									
0 разів	61	24.1	27	28.7	5	31.2	1	100.0	0.3771
1 раз	257	60.8	51	55.8	11	51.2	0	0.0	
2-3 рази	60	13.2	8	7.9	4	11.6	0	0.0	
4+ рази	10	1.9	4	7.5	1	6.0	0	0.0	
N	388		90		21		1		
Частота ін'єкцій: останні 24 години (серед тих хто вживав)									
1 раз	257	80.1	51	78.3	11	74.3	0	0.0	
2-3 рази	60	17.4	8	11.2	4	16.9	0	0.0	
4+ рази	10	2.5	4	10.6	1	8.8	0	0.0	
N	327		63		16		0		
Частота ін'єкцій: останній тиждень									
0 разів	15	4.9	6	6.1	1	5.1	1	100.0	0.0010
1-6 разів	138	54.5	59	66.5	10	44.7	0	0.0	
кожен день	235	40.6	25	27.4	10	50.2	0	0.0	
N	388		90		21		1		
Частота ін'єкцій: останні 30 днів									
1-9 разів	62	24.7	22	24.7	1	5.1	1	100.0	0.1229
10-19 разів	62	25.0	34	39.1	6	33.3	0	0.0	
20-29 разів	41	12.9	13	13.1	5	18.8	0	0.0	
кожен день	222	37.4	21	23.0	9	42.8	0	0.0	
N	387		90		21		1		
Частота ін'єкцій: основний наркотик протягом 30 днів									
0-9 разів	60	24.0	22	24.7	1	5.1	1	100.0	0.1393
10-19 разів	61	25.4	34	39.1	6	33.3	0	0.0	
20-29 разів	40	12.6	12	12.3	5	18.8	0	0.0	
кожен день	227	38.0	22	23.9	9	42.8	0	0.0	
N	388		90		21		1		

Таблиця 2.4. Ін'єкційний вид наркотику на вибір за рівнем доходу

	Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
	опіоїди		стимулятори		інші	
	n	%	n	%	n	%
Категорія місячного доходу						
<3 тис	82	25.6	13	12.1	0	
3-10 тис	184	49.5	53	64.8	0	
10-20 тис	78	18.6	16	17.0	0	
≥20 тис	27	6.4	7	6.1	0	
N	371		89		0	

Таблиця 2.5. Джерела наркотиків за типом основного наркотику

Всього		Тип основного наркотику ін'єкційного вживання					
Разом		опіоїди		стимулятори		інші	
n	%	n	%	n	%	n	%
готую сам							
161	26.3	146	32.4	15	13.0	0	
приготовлене друзями							
56	15.8	43	17.3	12	11.8	0	
від дилера							
241	56.4	189	55.7	50	57.3	0	
куплене в Інтернеті							
109	25.7	60	14.6	49	51.2	0	
з аптеки							
1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	
з програми ЗПТ							
42	2.3	42	3.3	0	0.0	0	
інше							
4	1.2	3	1.2	1	1.0	0	
N							
614		484		127		0	




Рис 2.8. Зміна ціни, якості та доступності ліків за типом основного наркотику (%)

3. Ін'єкційна ризикована поведінка

Таблиця 3.1. Поширеність ін'єкційних практик ризику

	n	%	ДІ
Для останньої ін'єкції використовував чистий шприц			
так	486	97.2	(94.8–98.6)
Джерело шприца для останньої ін'єкції			
купив в аптеці	295	74.0	(68.8–78.5)
отримав в аптеці	3	0.1	(0.0–0.3)
отримав від НУО	197	24.6	(20.2–29.7)
отримав від друга	4	1.0	(0.4–2.7)
отримав вживаний від друга	0	0.0	
використовував вживаний свій	0	0.0	
отримав заповнений	0	0.0	
інші	1	0.3	(0.0–2.2)
Використовував спільний шприц за останні 30 днів			
так	16	3.2	(1.8–5.7)
Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
так	21	5.1	(3.2–8.0)
Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів			
так	19	4.4	(2.2–8.4)
Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
так	11	2.7	(1.3–5.2)
Використовував власний раніше використаний шприц за останні 30 днів			
так	156	30.2	(25.0–35.9)
Давав комусь використаний шприц за останні 30 днів			
так	17	4.7	(2.7–7.9)
Будь-який ін. ризик (спільний шприц, попередньо заповнений, переднє/заднє заповн., контейнер) за останні 30 днів			
так	47	11.1	(7.8–15.6)

Таблиця 3.2. Частота ризикованих практик ін'єкцій

	n	%	ДІ
Частота ін'єкцій за допомогою шприца, яким користувалися інші за останні 30 днів			
завжди	0	0.0	
часто	0	0.0	
половина	0	0.0	
іноді	2	8.8	(1.4–39.2)
рідко	10	78.3	(50.6–92.7)
ніколи	4	12.9	(3.4–38.3)
Частота ін'єкцій разом з іншими в одному місці за останні 30 днів			
завжди	82	18.1	(14.2–22.8)
часто	32	6.6	(4.3–10.2)
половина	42	10.5	(7.5–14.4)
іноді	21	4.9	(3.0–8.1)
рідко	41	8.5	(5.9–12.1)
ніколи	275	51.3	(45.6–57.0)
Кількість шприців, використаних повторно за останні 30 днів			

	n	%	ДІ
1-9	127	89.7	(83.0–93.9)
10-29	23	8.3	(4.7–14.3)
30+	3	2.0	(0.5–7.3)
Кількість повторних використань одного шприца за останні 30 днів			
1	11	9.9	(3.9–23.0)
2-3	126	76.0	(62.9–85.6)
4-9	15	11.6	(5.3–23.6)
10+	3	2.5	(0.7–8.7)
Як отримано попередньо заповнений шприц			
від дилера	7	36.0	(17.3–60.1)
від друзів	10	42.5	(22.5–65.3)
із закладки	4	21.5	(8.2–45.8)
Хтось використав один шприц для ін'єкції перед переднім/заднім заповненням			
ні	492	98.4	(96.2–99.3)
так	6	1.6	(0.7–3.8)




Рис 3.1. Поширеність ключових практик ризику ін'єкцій (%)




Рис 3.2. Тенденції в ключових практиках ризику ін'єкцій за раундами дослідження (%)




Рис 3.3. З ким вводив наркотики в одному місці (серед усіх) (%)




Рис 3.4. З ким вводив наркотики в одному місці (за статтю) (%)




Рис 3.5. З ким вводив наркотики в одному місці (за віком) (%)

Таблиця 3.3. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього									
	Разом	499	16	3.2 (1.8–5.7)	1.0000	500	21	5.1 (3.2–8.0)	1.0000
Стать									
	чоловік	397	14	3.8 (2.1–7.0)	0.1941	398	16	5.1 (3.0–8.7)	0.9864
	жінка	102	2	1.2 (0.2–7.1)		102	5	5.1 (2.1–12.0)	
Вікова категорія 4									

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<25	9	0	0.0	0.4995	9	0	0.0	0.6255
25-34	92	6	6.3 (2.6–14.6)		92	6	8.2 (3.6–17.7)	
35-44	245	7	2.7 (1.0–6.7)		246	11	4.6 (2.3–8.7)	
45+	153	3	2.3 (0.6–8.9)		153	4	4.4 (1.6–11.5)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	29	0	0.0	0.5990	29	3	10.0 (3.0–28.5)	0.5822
3-5	17	0	0.0		17	1	4.1 (0.5–28.8)	
6-10	38	2	5.9 (1.3–23.0)		38	2	7.2 (1.7–25.6)	
≥11	415	14	3.5 (1.8–6.5)		416	15	4.5 (2.6–7.8)	
Партнерський статус								
живе сам	201	4	1.4 (0.4–5.0)	0.1126	201	5	3.0 (1.1–7.7)	0.1646
живе з партнером	298	12	4.2 (2.2–8.1)		299	16	6.3 (3.7–10.6)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	151	2	0.7 (0.1–4.1)	0.4615	151	0	0.0	0.0573
неповний робочий день або тимчасово	224	12	4.7 (2.4–9.0)		225	18	8.2 (5.0–13.3)	
безробітний	68	1	3.0 (0.4–19.1)		68	3	6.4 (2.0–18.8)	
інвалідність	39	1	2.8 (0.4–18.6)		39	0	0.0	
інші	17	0	0.0		17	0	0.0	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	96	3	3.5 (0.9–12.9)	0.5309	97	5	7.0 (2.9–16.1)	0.7661
3-10 тис	237	6	2.3 (0.8–6.1)		237	9	4.0 (1.9–8.4)	
10-20 тис	94	6	6.2 (2.4–15.0)		94	5	6.6 (2.5–16.3)	
≥20 тис	34	1	5.4 (0.7–31.5)		34	1	5.4 (0.7–31.5)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	329	9	2.0 (0.9–4.7)	0.0434	330	14	4.8 (2.7–8.4)	0.7030
так	170	7	6.3 (2.8–13.5)		170	7	5.8 (2.7–12.4)	

Таблиця 3.4. Поширеність спільного використання шприця та попередньо-заповненого шприця за обраними підгрупами

	Використовував спільний шприц за останні 30 днів				Використовував попередньо наповнений шприц за останні 30 днів			
	N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	293	12	3.8 (2.0–7.1)	0.1885	294	16	5.6 (3.4–9.2)	0.4765
так	205	4	1.4 (0.3–6.0)		205	5	3.6 (1.2–10.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	293	10	3.2 (1.7–5.9)	0.8248	294	18	5.5 (3.4–8.6)	0.0092
так	205	6	3.7 (1.2–10.7)		205	3	1.2 (0.4–3.9)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	118	3	3.8 (0.9–13.9)	0.7863	118	4	2.7 (0.8–9.0)	0.2571
негативний	381	13	3.1 (1.6–5.8)		382	17	5.7 (3.5–9.1)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	388	12	3.3 (1.7–6.5)	0.0000	388	15	5.1 (2.9–8.7)	0.6081
стимулятори	89	0	0.0		90	4	4.2 (1.5–11.1)	
опі+стимул	21	4	24.0 (7.7–54.3)		21	2	12.6 (2.8–41.6)	
інші	1	0	0.0		1	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	403	16	4.6 (2.6–8.2)		403	17	5.6 (3.4–9.3)	
стимулятори	94	0	0.0		95	4	4.1 (1.5–10.7)	
інші	0	0			0	0		

Таблиця 3.5. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**	**N**	**n**	**% (ДІ)**	**p-значення**
Всього									
	Разом	500	19	4.4 (2.2–8.4)	1.0000	499	11	2.7 (1.3–5.2)	1.0000
Стать									
	чоловік	398	14	3.3 (1.8–6.2)	0.2513	397	9	2.7 (1.2–5.9)	0.8731
	жінка	102	5	7.7 (2.0–26.0)		102	2	2.4 (0.6–9.4)	

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4								
<25	9	1	1.0 (0.1–11.8)	0.1205	9	0	0.0	0.6681
25-34	92	2	1.7 (0.3–9.6)		92	4	4.8 (1.6–14.0)	
35-44	246	14	7.0 (3.1–15.1)		246	6	2.6 (1.0–6.8)	
45+	153	2	2.2 (0.5–9.0)		152	1	1.5 (0.2–9.8)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	29	2	3.6 (0.6–20.0)	0.7070	29	0	0.0	0.1124
3-5	17	0	0.0		17	1	4.1 (0.5–28.8)	
6-10	38	2	7.9 (1.9–27.5)		38	3	9.6 (2.5–30.9)	
≥11	416	15	4.4 (1.9–9.6)		415	7	2.1 (0.9–5.0)	
Партнерський статус								
живе сам	201	3	0.7 (0.2–3.1)	0.0011	200	3	2.9 (0.9–8.9)	0.8687
живе з партнером	299	16	6.5 (3.2–12.8)		299	8	2.5 (1.1–5.8)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	151	1	0.1 (0.0–0.8)	0.1941	151	1	0.2 (0.0–1.2)	0.2030
неповний робочий день або тимчасово	225	13	5.3 (2.9–9.7)		224	9	4.5 (2.1–9.2)	
безробітний	68	2	9.2 (1.4–42.6)		68	1	2.3 (0.3–15.1)	
інвалідність	39	0	0.0		39	0	0.0	
інші	17	3	11.6 (2.1–45.1)		17	0	0.0	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	97	2	7.4 (1.4–30.4)	0.6936	96	0	0.0	0.2994
3-10 тис	237	11	3.3 (1.6–7.0)		237	8	4.1 (1.8–8.9)	
10-20 тис	94	5	5.2 (1.8–14.5)		94	2	1.7 (0.3–9.6)	
≥20 тис	34	1	5.4 (0.7–31.5)		34	1	5.4 (0.7–31.5)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	330	11	4.1 (1.6–9.9)	0.7048	330	8	2.9 (1.3–6.3)	0.6729

		Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
		N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
	так	170	8	5.1 (2.2–11.4)		169	3	2.1 (0.6–7.6)	

Таблиця 3.6. Поширеність прямого/ зворотнього заповнення та спільного контейнера за обраними підгрупами

	Використовував шприц із переднім/заднім заповненням за останні 30 днів				Використовував спільний контейнер за останні 30 днів			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	294	12	5.3 (2.5–10.7)	0.0629	293	8	2.9 (1.4–6.1)	0.6452
так	205	7	1.6 (0.5–4.9)		205	3	1.9 (0.3–10.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	294	12	4.5 (2.2–9.0)	0.3501	293	8	2.8 (1.4–5.6)	0.2225
так	205	7	2.8 (1.3–5.8)		205	3	1.2 (0.4–3.9)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	118	4	3.1 (0.9–10.5)	0.5890	118	1	0.1 (0.0–1.1)	0.0000
негативний	382	15	4.6 (2.2–9.7)		381	10	3.2 (1.6–6.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	388	17	5.9 (2.8–11.9)	0.1713	387	6	1.5 (0.5–4.3)	0.3067
стимулятори	90	1	0.6 (0.1–4.5)		90	4	4.6 (1.7–12.1)	
опі+стимул	21	1	7.4 (0.9–41.0)		21	1	7.4 (0.9–41.0)	
інші	1	0	0.0		1	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	403	17	5.6 (2.7–11.4)		402	7	1.9 (0.7–4.8)	
стимулятори	95	2	1.6 (0.4–6.8)		95	4	4.5 (1.6–11.8)	
інші	0	0			0	0		

4. Сексуальна поведінка

Таблиця 4.1. Поширеність сексуальної практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав статевий контакт: будь-коли										
так	470	93.9	(89.4–96.5)	94	86.4	(70.2–94.5)	376	96.2	(92.9–98.0)	0.0141
N	500			102			398			
Мав статевий контакт: протягом останніх 12 місяців										
так	381	83.4	(78.7–87.2)	81	89.7	(80.8–94.7)	300	81.6	(76.0–86.2)	0.0925
N	467			94			373			
Мав статевий контакт: за останні 30 днів										
так	286	63.8	(58.1–69.1)	70	76.3	(64.2–85.2)	216	60.2	(53.7–66.4)	0.0188
N	463			94			369			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	257	88.9	(83.6–92.7)	68	99.5	(98.1–99.9)	189	85.2	(78.4–90.2)	0.0000
N	292			70			222			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	40	13.2	(9.1–18.8)	3	1.8	(0.4–8.3)	37	17.2	(11.8–24.4)	0.0004
N	292			70			222			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	3	1.0	(0.3–3.7)	0	0.0		3	1.4	(0.4–4.9)	0.3781
N	292			70			222			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	1	0.1	(0.0–0.5)	0	0.0		1	0.1	(0.0–0.6)	0.5618
N	292			70			222			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс										
так	142	31.0	(25.6–36.9)	19	28.3	(16.3–44.4)	123	31.7	(26.0–38.1)	0.6641
N	463			93			370			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо мав секс за 12м										
так	120	32.4	(26.5–39.0)	18	31.3	(18.2–48.3)	102	32.8	(26.5–39.8)	0.8596
N	379			81			298			
Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо був секс протягом 30 днів										
так	85	31.0	(24.2–38.8)	16	33.9	(19.3–52.4)	69	30.0	(22.8–38.3)	0.6729
N	285			70			215			




Рис 4.1. Частота сексу за останній тиждень за обраними підгрупами (%)

Таблиця 4.2. Сексуальні практики за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав гомосексуальний досвід										
так	13	1.9	(0.9–4.1)	9	8.1	(3.5–17.6)	4	0.2	(0.1–0.7)	0.0000
N	470			94			376			
Надавав секс-послуги за гроші										
так	12	1.9	(0.9–4.1)	7	4.2	(1.3–12.5)	5	1.3	(0.4–3.7)	0.1150
N	470			94			376			
Платив за секс коли-небудь										
так	30	7.3	(4.9–10.9)	0	0.0		30	9.4	(6.3–13.8)	0.0091
N	470			94			376			
Мав секс з секс-працівником протягом останніх 6 місяців										
так	4	11.5	(3.8–30.1)	0	0.0		4	11.5	(3.8–30.1)	
N	30			0			30			
Тип партнера, з яким був останній секс										
регулярний	379	80.8	(76.0–84.9)	87	93.8	(86.0–97.4)	292	77.1	(71.3–82.1)	0.0211
випадковий	86	18.5	(14.5–23.3)	7	6.2	(2.6–14.0)	79	22.0	(17.1–27.7)	
ком. секс (я заплатив)	1	0.3	(0.0–2.4)	0	0.0		1	0.4	(0.1–3.0)	
ком. секс (мені заплатили)	1	0.3	(0.0–2.4)	0	0.0		1	0.4	(0.1–3.0)	
N	467			94			373			
З ким останнім був секс										
чоловік	95	22.0	(17.4–27.5)	92	99.7	(98.7–99.9)	3	0.4	(0.1–2.1)	
жінка	375	78.0	(72.5–82.6)	2	0.3	(0.1–1.3)	373	99.6	(97.9–99.9)	
men and women	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	470			94			376			
Тип останнього статевого контакту: вагінальний										
так	462	99.4	(98.1–99.8)	91	99.5	(98.5–99.9)	371	99.4	(97.5–99.9)	0.7907
N	469			94			375			
Тип останнього статевого контакту: анальний										
так	4	0.8	(0.3–2.5)	0	0.0		4	1.1	(0.4–3.2)	0.3537
N	469			94			375			

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Тип останнього статевого контакту: оральний										
так	34	8.0	(5.4–11.7)	7	7.8	(2.7–20.2)	27	8.0	(5.3–12.1)	0.9483
N	469			94			375			

Таблиця 4.3. Сексуальні партнери за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: регулярний										
так	257	88.9	(83.6–92.7)	68	99.5	(98.1–99.9)	189	85.2	(78.4–90.2)	0.0000
N	292			70			222			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: випадковий										
так	40	13.2	(9.1–18.8)	3	1.8	(0.4–8.3)	37	17.2	(11.8–24.4)	0.0004
N	292			70			222			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (я заплатив)										
так	3	1.0	(0.3–3.7)	0	0.0		3	1.4	(0.4–4.9)	0.3781
N	292			70			222			
Мав сексуального партнера за останні 30 днів: комерційний (мені заплатили)										
так	1	0.1	(0.0–0.5)	0	0.0		1	0.1	(0.0–0.6)	0.5618
N	292			70			222			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: регулярні										
1	252	99.4	(95.9–99.9)	68	100.0		184	99.2	(94.3–99.9)	
2-4	1	0.6	(0.1–4.1)	0	0.0		1	0.8	(0.1–5.7)	
5+	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	253			68			185			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: випадкові										
1	31	83.1	(65.9–92.6)	2	100.0		29	82.5	(64.8–92.3)	0.7077
2-4	7	16.5	(7.1–33.9)	0	0.0		7	17.1	(7.4–34.9)	
5+	1	0.4	(0.1–2.9)	0	0.0		1	0.4	(0.1–3.0)	
N	39			2			37			
Кількість статевих партнерів за останні 30 днів: всього										
1	270	94.0	(89.9–96.5)	68	98.6	(90.4–99.8)	202	92.4	(87.0–95.7)	0.0710
2-4	16	5.9	(3.4–10.1)	1	1.4	(0.2–9.6)	15	7.5	(4.2–13.0)	
5+	1	0.1	(0.0–0.4)	0	0.0		1	0.1	(0.0–0.5)	
N	287			69			218			




Рис 4.2. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за типом партнера (%)




Рис 4.3. Тенденції використання презервативів під час останнього статевого контакту за раундами дослідження (%)

Таблиця 4.4. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за соціально-демографічними характеристиками

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	463	321	69.0 (63.1–74.4)	142	31.0 (25.6–36.9)	1.0000
Стать							
	чоловік	370	247	68.3 (61.9–74.0)	123	31.7 (26.0–38.1)	0.6641
	жінка	93	74	71.7 (55.6–83.7)	19	28.3 (16.3–44.4)	

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N		ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	9	7	81.3 (35.1–97.2)	2	18.7 (2.8–64.9)	0.2203
25-34	85	67	75.3 (61.8–85.1)	18	24.7 (14.9–38.2)	
35-44	230	149	63.1 (54.4–71.1)	81	36.9 (28.9–45.6)	
45+	139	98	73.7 (62.9–82.2)	41	26.3 (17.8–37.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	27	17	56.9 (34.4–76.8)	10	43.1 (23.2–65.6)	0.3073
3-5	17	14	83.5 (46.6–96.7)	3	16.5 (3.3–53.4)	
6-10	35	25	78.4 (59.1–90.1)	10	21.6 (9.9–40.9)	
≥11	384	265	68.2 (61.6–74.2)	119	31.8 (25.8–38.4)	
Партнерський статус						
живе сам	179	103	57.5 (48.0–66.5)	76	42.5 (33.5–52.0)	0.0026
живе з партнером	284	218	75.4 (67.8–81.7)	66	24.6 (18.3–32.2)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	142	106	75.2 (64.6–83.4)	36	24.8 (16.6–35.4)	0.1178
неповний робочий день або тимчасово	208	149	71.1 (62.9–78.2)	59	28.9 (21.8–37.1)	
безробітний	64	37	54.4 (36.9–70.9)	27	45.6 (29.1–63.1)	
інвалідність	35	19	57.1 (35.1–76.7)	16	42.9 (23.3–64.9)	
інші	14	10	77.5 (42.0–94.2)	4	22.5 (5.8–58.0)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	91	59	66.8 (51.6–79.2)	32	33.2 (20.8–48.4)	0.1618
3-10 тис	214	161	71.9 (63.1–79.2)	53	28.1 (20.8–36.9)	
10-20 тис	91	55	58.7 (45.6–70.6)	36	41.3 (29.4–54.4)	
≥20 тис	32	23	83.7 (64.3–93.6)	9	16.3 (6.4–35.7)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	304	223	69.9 (62.5–76.4)	81	30.1 (23.6–37.5)	0.5991

		Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
	так	159	98	66.8 (57.0–75.4)	61	33.2 (24.6–43.0)	

Таблиця 4.5. Використання презерватива під час останнього статевого контакту за обраними підгрупами

	Використовував презерватив під час останнього сексу: якщо коли-небудь був секс					
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	272	192	69.1 (62.0–75.3)	80	30.9 (24.7–38.0)	0.9994
так	190	129	69.0 (58.2–78.2)	61	31.0 (21.8–41.8)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	276	196	69.1 (62.7–74.8)	80	30.9 (25.2–37.3)	0.7438
так	186	124	67.5 (59.9–74.2)	62	32.5 (25.8–40.1)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	103	49	49.4 (36.7–62.3)	54	50.6 (37.7–63.3)	0.0010
негативний	360	272	72.6 (66.0–78.3)	88	27.4 (21.7–34.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	359	250	69.1 (61.9–75.5)	109	30.9 (24.5–38.1)	0.7908
стимулятори	83	58	70.0 (58.2–79.6)	25	30.0 (20.4–41.8)	
опі+стимул	20	12	59.3 (32.6–81.5)	8	40.7 (18.5–67.4)	
інші	1	1	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	374	259	68.8 (61.8–75.1)	115	31.2 (24.9–38.2)	
стимулятори	87	61	69.8 (58.3–79.3)	26	30.2 (20.7–41.7)	
інші	0	0		0		

Таблиця 4.6. Використання презерватива за типом партнера за статтю

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
Використовував презерватив під час останнього сексу: регулярний партнер										

	Всього			Стать						
	Разом			жінка			чоловік			
	n	%	ДІ	n	%	ДІ	n	%	ДІ	p-значення
так	73	27.6	(20.8–35.7)	15	31.4	(17.1–50.4)	58	26.1	(19.1–34.6)	0.5676
N	257			68			189			
Використовував презерватив під час останнього сексу: випадковий партнер										
так	21	54.9	(35.2–73.2)	1	75.6	(21.3–97.3)	20	54.1	(33.9–73.0)	0.4413
N	38			3			35			
Використовував презерватив під час останнього сексу: комерційний (я заплатив) партнер										
так	2	48.4	(6.4–92.8)	0	0.0		2	48.4	(6.4–92.8)	
N	3			0			3			
Частота використання презервативів: регулярний партнер										
завжди	55	20.1	(14.5–27.2)	9	14.2	(6.0–30.3)	46	22.5	(15.9–31.0)	0.0027
часто	6	3.9	(1.1–12.8)	4	13.0	(3.7–36.9)	2	0.2	(0.0–0.8)	
половина	5	1.9	(0.5–6.9)	2	4.2	(0.7–22.6)	3	1.0	(0.2–5.0)	
іноді	5	2.1	(0.8–5.6)	1	2.7	(0.4–17.1)	4	1.8	(0.6–5.4)	
рідко	6	2.7	(1.1–6.5)	1	1.7	(0.2–11.2)	5	3.2	(1.2–8.3)	
ніколи	178	69.2	(61.0–76.4)	51	64.3	(46.1–79.1)	127	71.2	(62.5–78.7)	
N	255			68			187			
Частота використання презервативів: випадковий партнер										
завжди	15	39.5	(22.2–59.9)	1	75.6	(21.3–97.3)	14	38.1	(20.6–59.2)	
часто	2	3.7	(0.6–19.1)	0	0.0		2	3.8	(0.6–19.7)	
половина	4	11.4	(3.8–29.6)	0	0.0		4	11.9	(3.9–30.6)	
іноді	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
рідко	1	3.3	(0.5–20.3)	0	0.0		1	3.4	(0.5–21.0)	
ніколи	16	42.1	(24.6–61.8)	2	24.4	(2.7–78.7)	14	42.8	(24.7–63.0)	
N	38			3			35			
Частота використання презервативів: комерційний (я заплатив) партнер										
завжди	1	86.9	(29.1–99.1)	0	0.0		1	86.9	(29.0–99.1)	
часто	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
половина	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
іноді	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
рідко	1	13.1	(0.9–70.9)	0	0.0		1	13.1	(0.9–71.0)	
ніколи	0	0.0		0	0.0		0	0.0		
N	2			0			2			




Рис 4.4. Частота використання презерватива за типом партнера за статтю (%)




Рис 4.5. Частота використання презерватива серед чоловіків під час останнього акта за найризикованішим типом партнера за останні 30 днів (%)

5. Результати тестування на ВІЛ, ВГС та сифіліс

Таблиця 5.1. Поширеність ВІЛ за соціально-демографічними характеристиками

			Результат тесту на ВІЛ				
		N	позитивний		негативний		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	500	118	18.4 (14.4–23.3)	382	81.6 (76.7–85.6)	1.0000
Стать							
	чоловік	398	88	16.7 (12.7–21.6)	310	83.3 (78.4–87.3)	0.2211
	жінка	102	30	23.9 (14.0–37.7)	72	76.1 (62.3–86.0)	

		Результат тесту на ВІЛ				
	N	позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	9	1	1.3 (0.1–14.2)	8	98.7 (85.8–99.9)	0.0001
25-34	92	2	2.3 (0.6–9.1)	90	97.7 (90.9–99.4)	
35-44	246	66	21.5 (15.9–28.3)	180	78.5 (71.7–84.1)	
45+	153	49	26.6 (17.4–38.2)	104	73.4 (61.8–82.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	29	3	6.0 (1.5–20.8)	26	94.0 (79.2–98.5)	0.0072
3-5	17	1	4.1 (0.5–28.8)	16	95.9 (71.2–99.5)	
6-10	38	3	6.9 (1.8–23.1)	35	93.1 (76.9–98.2)	
≥11	416	111	21.8 (16.9–27.6)	305	78.2 (72.4–83.1)	
Партнерський статус						
живе сам	201	64	24.7 (18.1–32.7)	137	75.3 (67.3–81.9)	0.0346
живе з партнером	299	54	14.8 (10.0–21.3)	245	85.2 (78.7–90.0)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	151	37	17.5 (11.2–26.2)	114	82.5 (73.8–88.8)	0.0000
неповний робочий день або тимчасово	225	39	13.4 (9.1–19.4)	186	86.6 (80.6–90.9)	
безробітний	68	19	18.9 (10.0–32.6)	49	81.1 (67.4–90.0)	
інвалідність	39	21	56.2 (33.3–76.7)	18	43.8 (23.3–66.7)	
інші	17	2	10.5 (1.6–46.1)	15	89.5 (53.9–98.4)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	97	33	25.2 (16.0–37.2)	64	74.8 (62.8–84.0)	0.0703
3-10 тис	237	41	13.8 (8.6–21.5)	196	86.2 (78.5–91.4)	
10-20 тис	94	29	26.9 (17.1–39.6)	65	73.1 (60.4–82.9)	
≥20 тис	34	7	14.7 (5.3–34.6)	27	85.3 (65.4–94.7)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	330	55	13.1 (8.9–19.0)	275	86.9 (81.0–91.1)	0.0001
так	170	63	32.2 (23.9–41.8)	107	67.8 (58.2–76.1)	

Таблиця 5.2. Поширеність ВІЛ за обраними підгрупами

	N	Результат тесту на ВІЛ				
		позитивний		негативний		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	294	47	14.6 (10.6–19.8)	247	85.4 (80.2–89.4)	0.0034
так	205	70	29.8 (20.4–41.3)	135	70.2 (58.7–79.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	294	53	17.4 (13.1–22.8)	241	82.6 (77.2–86.9)	0.0017
так	205	65	30.4 (24.1–37.4)	140	69.6 (62.6–75.9)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	388	102	20.4 (15.8–25.9)	286	79.6 (74.1–84.2)	0.6738
стимулятори	90	12	14.5 (7.2–27.1)	78	85.5 (72.9–92.8)	
опі+стимул	21	4	16.5 (4.1–47.3)	17	83.5 (52.7–95.9)	
інші	1	0	0.0	1	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	403	106	20.5 (15.9–25.9)	297	79.5 (74.1–84.1)	
стимулятори	95	11	13.2 (6.3–25.6)	84	86.8 (74.4–93.7)	
інші	0	0		0		




Рис 5.1. Результат тесту на ВІЛ (%)




Рис 5.2. Тенденції поширеності ВІЛ за раундами дослідження (%)




Рис 5.3. Охоплення тестуванням на ВГС в дослідженні (%)



Рис 5.4. Результати тестування на anti-HCV (%)




Рис 5.5. Результати тестування на anti-HCV за статтю (%)




Рис 5.6. Тенденції поширеності anti-HCV за раундами дослідження (%)




Рис 5.7. Результати тесту на сифіліс (%)

6. Профілактика ВІЛ

Таблиця 6.1. Клієнт НУО за соціально-демографічними характеристиками

			Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ			
		N	ні	так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	499	294	75.1 (70.0–79.5)	205	24.9 (20.5–30.0)	1.0000
Стать							
	чоловік	398	243	77.5 (72.3–82.0)	155	22.5 (18.0–27.7)	0.1006
	жінка	101	51	67.1 (53.5–78.3)	50	32.9 (21.7–46.5)	

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4						
<25	9	7	97.7 (85.4–99.7)	2	2.3 (0.3–14.6)	0.0034
25-34	92	71	85.6 (75.1–92.1)	21	14.4 (7.9–24.9)	
35-44	245	134	75.1 (68.3–80.9)	111	24.9 (19.1–31.7)	
45+	153	82	65.1 (53.8–75.0)	71	34.9 (25.0–46.2)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	29	24	97.4 (92.6–99.1)	5	2.6 (0.9–7.4)	0.0109
3-5	17	12	71.7 (38.0–91.3)	5	28.3 (8.7–62.0)	
6-10	38	31	88.5 (72.4–95.8)	7	11.5 (4.2–27.6)	
≥11	415	227	71.7 (65.8–76.9)	188	28.3 (23.1–34.2)	
Партнерський статус						
живе сам	201	103	73.0 (65.2–79.6)	98	27.0 (20.4–34.8)	0.5063
живе з партнером	298	191	76.3 (69.4–82.0)	107	23.7 (18.0–30.6)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	151	80	72.4 (63.0–80.1)	71	27.6 (19.9–37.0)	0.0053
неповний робочий день або тимчасово	225	155	78.7 (71.7–84.3)	70	21.3 (15.7–28.3)	
безробітний	68	37	84.3 (72.7–91.5)	31	15.7 (8.5–27.3)	
інвалідність	38	13	47.4 (25.5–70.3)	25	52.6 (29.7–74.5)	
інші	17	9	63.8 (31.9–86.9)	8	36.2 (13.1–68.1)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	96	57	80.2 (70.0–87.5)	39	19.8 (12.5–30.0)	0.4164
3-10 тис	237	159	75.8 (67.7–82.5)	78	24.2 (17.5–32.3)	
10-20 тис	94	46	69.3 (57.1–79.3)	48	30.7 (20.7–42.9)	
≥20 тис	34	15	67.9 (47.1–83.5)	19	32.1 (16.5–52.9)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	330	218	78.1 (71.9–83.3)	112	21.9 (16.7–28.1)	0.0297
так	169	76	67.0 (57.8–75.0)	93	33.0 (25.0–42.2)	

Таблиця 6.2. Клієнт НУО за обраними підгрупами

		Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	294	229	78.9 (73.3–83.5)	65	21.1 (16.5–26.7)	0.0000
так	204	65	32.6 (25.9–40.2)	139	67.4 (59.8–74.1)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	117	47	59.5 (45.7–72.0)	70	40.5 (28.0–54.3)	0.0034
негативний	382	247	78.6 (73.3–83.0)	135	21.4 (17.0–26.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	387	196	68.7 (62.5–74.2)	191	31.3 (25.8–37.5)	0.0117
стимулятори	90	80	87.3 (74.5–94.2)	10	12.7 (5.8–25.5)	
опі+стимул	21	17	87.3 (62.1–96.6)	4	12.7 (3.4–37.9)	
інші	1	1	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	402	207	69.3 (63.3–74.7)	195	30.7 (25.3–36.7)	
стимулятори	95	85	87.7 (75.2–94.4)	10	12.3 (5.6–24.8)	
інші	0	0		0		




Рис 6.1. Сприйняття ін'єкційного та сексуального ризику серед ВІЛ-негативних учасників (%)




Рис 6.2. Отримання послуг з профілактики ВІЛ за останні 12 місяців і 30 днів (%)




Рис 6.3. Отримання пакету профілактичних послуг за останні 12 місяців (%)




Рис 6.4. Тенденції отримання профілактичних послуг ВІЛ за останні 12 місяців (%)




Рис 6.5. Помітні зміни в доступі до профілактики ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 6.3. Відсоток правильних відповідей на питання щодо знань за ВІЛ-статусом

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом %	негативний %	позитивний %	p-значення
Знання про ВІЛ				
ВІЛ можна уникнути	94.9	95.3	93.1	0.4363
правильне використання презервативів може запобігти ВІЛ	82.3	80.9	88.5	0.1261

	Всього	Результат тесту на ВІЛ		
	Разом	негативний	позитивний	
	%	%	%	p-значення
невиявлений = непередаваний	81.3	80.5	84.8	0.4239
ПКП знижує ризик	73.6	71.9	81.2	0.1316
АРТ слід починати негайно	89.6	89.2	91.6	0.5668
АРТ можна відкласти, якщо почуваєшся здоровим	87.4	87.4	87.4	0.9913
АРТ можна припинити, якщо людина почувається здоровою	91.6	90.5	96.7	0.0691
ВІЛ передається через кров і статевим шляхом	98.7	98.4	99.9	0.0036
ВІЛ передається через повітря, їжу або шкіру	96.8	96.8	96.8	0.9810
Знання про ВГВ				
правильне використання презерватива може запобігти ВГВ	94.6	94.7	94.1	0.8166
лікування слід починати негайно	88.4	87.3	93.1	0.1918
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	87.1	87.3	86.1	0.8104
ВГВ на 100% передається від матері до дитини	32.5	31.5	36.8	0.4267
ВГВ передається через кров і статевим шляхом	96.8	96.6	97.9	0.5854
ВГВ передається через повітря, їжу або шкіру	93.1	93.2	92.7	0.8773
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	89.2	88.0	94.1	0.1367
Знання про ВГС				
правильне використання презервативів може запобігти ВГС	1.4	1.3	1.7	0.7321
лікування слід починати негайно	88.7	88.3	90.5	0.6094
лікування можна відкласти, якщо людина почувається здоровою	86.9	87.0	86.3	0.8791
ВГС на 100% передається від матері до дитини	30.0	28.8	35.5	0.3038
ВГС передається через кров і статевим шляхом	97.7	97.7	97.7	0.9849
лікування ВГС не існує	86.4	84.7	93.8	0.0545
ВГС передається через повітря, їжу або шкіру	89.7	88.7	94.0	0.2111
лікування можна припинити, якщо людина почувається здоровою	93.0	92.4	95.8	0.3136

7. Тестування на ВІЛ

Таблиця 7.1. Знання та сприйняття тестування на ВІЛ

		n	%	ДІ
Знає, де пройти тест на ВІЛ				
	так	454	85.5	(80.5–89.4)
Коли-небудь тестувався на ВІЛ				
	так	458	87.4	(82.7–91.0)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	так	197	38.9	(33.0–45.2)
Пройшов тест на ВІЛ за останні 6 місяців				
	так	135	27.1	(21.8–33.2)
Отримали результат тесту на ВІЛ (серед протестованих)				
	так	454	98.8	(96.9–99.6)

	n	%	ДІ
Згоден розкрити результати тесту на ВІЛ (серед тих, хто отримав результат)			
так	448	99.9	(99.6–99.9)
ВІЛ-статус за самозвітом (з усіх протестованих)			
позитивний	101	17.6	(13.3–22.9)
негативний	349	82.4	(77.1–86.7)
Тестування на ВІЛ та визначення статусу (GAM)			
так	247	49.7	(43.4–56.0)
Коли-небудь проходив самотестування на ВІЛ			
так	2	0.6	(0.1–2.3)
Постійний статевий партнер протестований на ВІЛ			
так	147	50.2	(42.5–57.9)
Результат тесту на ВІЛ у постійного статевого партнера			
позитивний	29	15.8	(9.5–24.9)
негативний	114	78.7	(66.6–87.2)
не може розкрити	2	5.6	(1.1–23.1)




Рис 7.1. Охоплення тестуванням на ВІЛ (%)




Рис 7.2. Тестування на ВІЛ, ВГС, сифіліс з лютого 2022 року (%)




Рис 7.3. Тестування на ВІЛ з лютого 2022 року (%)

Таблиця 7.2. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за соціально-демографічними характеристиками

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	422	225	61.1 (54.8–67.0)	197	38.9 (33.0–45.2)	1.0000
Стать							
	чоловік	333	177	59.3 (52.1–66.1)	156	40.7 (33.9–47.9)	0.3191
	жінка	89	48	66.6 (53.4–77.7)	41	33.4 (22.3–46.6)	
Вікова категорія 4							

		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<25	5	1	13.6 (0.8–74.8)	4	86.4 (25.2–99.2)	0.0824
25-34	73	39	56.2 (42.1–69.4)	34	43.8 (30.6–57.9)	
35-44	212	109	62.2 (53.6–70.1)	103	37.8 (29.9–46.4)	
45+	132	76	66.2 (54.7–76.0)	56	33.8 (24.0–45.3)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків						
≤2	23	12	57.3 (32.5–78.9)	11	42.7 (21.1–67.5)	0.0874
3-5	11	2	22.0 (3.8–66.8)	9	78.0 (33.2–96.2)	
6-10	30	14	59.1 (37.7–77.5)	16	40.9 (22.5–62.3)	
≥11	358	197	63.8 (57.1–70.0)	161	36.2 (30.0–42.9)	
Партнерський статус						
живе сам	166	89	59.2 (49.3–68.3)	77	40.8 (31.7–50.7)	0.6376
живе з партнером	256	136	62.2 (53.9–69.8)	120	37.8 (30.2–46.1)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	121	55	54.8 (42.9–66.2)	66	45.2 (33.8–57.1)	0.5795
неповний робочий день або тимчасово	199	114	61.7 (52.8–70.0)	85	38.3 (30.0–47.2)	
безробітний	57	32	68.6 (51.6–81.8)	25	31.4 (18.2–48.4)	
інвалідність	32	18	57.9 (32.0–80.1)	14	42.1 (19.9–68.0)	
інші	13	6	78.4 (44.8–94.2)	7	21.6 (5.8–55.2)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	82	47	58.0 (44.4–70.4)	35	42.0 (29.6–55.6)	0.5468
3-10 тис	211	109	59.8 (50.6–68.4)	102	40.2 (31.6–49.4)	
10-20 тис	74	41	68.2 (53.9–79.8)	33	31.8 (20.2–46.1)	
≥20 тис	24	14	72.4 (46.7–88.7)	10	27.6 (11.3–53.3)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	274	155	63.9 (56.1–71.1)	119	36.1 (28.9–43.9)	0.1176
так	148	70	53.8 (43.4–63.9)	78	46.2 (36.1–56.6)	

Таблиця 7.3. Тестування на ВІЛ за останні 12 місяців (серед усіх) за обраними підгрупами

	N	Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців: ні		Пройшов тест на ВІЛ за останні 12 місяців: так		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	245	147	62.5 (54.9–69.5)	98	37.5 (30.5–45.1)	0.4236
так	176	77	57.0 (45.4–67.9)	99	43.0 (32.1–54.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	242	156	63.4 (56.5–69.8)	86	36.6 (30.2–43.5)	0.0000
так	180	69	35.0 (28.0–42.6)	111	65.0 (57.4–72.0)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	107	62	62.4 (48.5–74.5)	45	37.6 (25.5–51.5)	0.8260
негативний	315	163	60.7 (53.6–67.4)	152	39.3 (32.6–46.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	328	165	61.2 (54.0–68.0)	163	38.8 (32.0–46.0)	0.6783
стимулятори	76	48	58.6 (45.2–70.8)	28	41.4 (29.2–54.8)	
опі+стимул	17	11	72.7 (44.2–90.0)	6	27.3 (10.0–55.8)	
інші	1	1	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання						
опіоїди	340	175	63.2 (56.2–69.7)	165	36.8 (30.3–43.8)	
стимулятори	80	49	56.8 (43.8–68.9)	31	43.2 (31.1–56.2)	
інші	0	0		0		

8. Лікування ВІЛ




Рис 8.1. Поінформованість про ВІЛ-статус серед ВІЛ-позитивних (%)




Рис 8.2. Каскад лікування ВІЛ (чотири етапи) (%)




Рис 8.3. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) (%)




Рис 8.4. Каскад лікування ВІЛ (послідовний) (%)




Рис 8.5. Тенденції в каскаді лікування ВІЛ (95-95-95) за раундами дослідження (%)

Таблиця 8.1. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за соціально-демографічними характеристиками

		Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
		N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	118	77.5 (66.0–85.9)	1.0000	97	91.9 (81.6–96.7)	1.0000	89	55	60.1 (42.5–75.4)	1.0000
Стать											
	чоловік	88	75.0 (61.1–85.2)	0.4592	73	90.6 (77.2–96.5)	0.6149	66	42	68.7 (51.4–82.1)	0.1664
	жінка	30	83.1 (60.6–94.0)		24	94.6 (67.9–99.3)		23	13	43.2 (16.4–74.7)	

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Вікова категорія 4										
<25	1	100.0	0.7889	1	100.0	0.8699	1	1	100.0	0.0658
25-34	2	100.0		2	100.0		2	0	0.0	
35-44	66	76.4 (61.0–87.0)		53	93.0 (77.3–98.1)		50	33	74.5 (55.8–87.2)	
45+	49	77.5 (57.3–89.8)		41	89.7 (69.3–97.1)		36	21	45.2 (19.4–73.9)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	3	8.2 (0.7–52.3)	0.0442	1	100.0	0.0970	1	1	100.0	0.3079
3-5	1	100.0		1	100.0		1	1	100.0	
6-10	3	100.0		3	53.5 (7.2–94.5)		2	0	0.0	
≥11	111	78.4 (66.5–86.9)		92	93.3 (83.1–97.5)		85	53	60.7 (42.4–76.4)	
Партнерський статус										
живе сам	64	64.1 (47.3–78.0)	0.0078	49	88.9 (70.3–96.4)	0.4844	43	25	71.5 (50.3–86.1)	0.2217
живе з партнером	54	90.5 (75.7–96.7)		48	94.0 (78.2–98.5)		46	30	52.7 (30.1–74.3)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	37	83.1 (56.1–95.0)	0.9027	33	97.9 (90.5–99.6)	0.7286	31	18	47.2 (24.7–70.9)	0.5067
неповний робочий день або тимчасово	39	76.7 (58.1–88.6)		30	90.3 (67.9–97.6)		28	19	74.6 (50.4–89.4)	
безробітний	19	68.9 (36.9–89.3)		15	83.5 (42.1–97.2)		13	7	59.8 (20.9–89.4)	
інвалідність	21	77.1 (46.1–93.0)		17	91.9 (57.7–98.9)		15	10	49.5 (12.5–87.1)	
інші	2	100.0		2	100.0		2	1	86.9 (24.7–99.3)	
Категорія місячного доходу										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	33	75.4 (52.0–89.7)	0.6555	27	92.4 (65.8–98.7)	0.6100	25	15	61.1 (32.9–83.4)	0.9117
3-10 тис	41	74.1 (52.6–88.0)		31	89.7 (65.8–97.5)		28	18	57.2 (23.5–85.3)	
10-20 тис	29	82.5 (56.6–94.5)		26	98.0 (90.8–99.6)		24	15	64.3 (36.6–84.9)	
≥20 тис	7	95.5 (68.0–99.5)		6	100.0		6	4	42.1 (8.1–85.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	55	88.4 (74.6–95.1)	0.0188	46	92.9 (78.2–98.0)	0.7267	41	24	56.9 (32.8–78.1)	0.6283
так	63	65.9 (48.6–79.8)		51	90.4 (70.8–97.3)		48	31	64.8 (42.4–82.1)	

Таблиця 8.2. Каскад лікування ВІЛ (95-95-95) за обраними підгрупами

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	47	75.5 (59.7–86.5)	0.6275	35	93.8 (78.0–98.5)	0.5319	33	19	65.1 (44.9–81.1)	0.4669
так	70	80.4 (62.3–91.1)		61	89.2 (70.1–96.7)		55	35	52.5 (25.7–77.9)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	53	75.4 (62.2–85.1)	0.0147	37	91.5 (78.9–96.9)	0.6487	33	20	59.2 (38.8–76.9)	0.6397
так	65	92.0 (81.7–96.7)		60	93.9 (83.8–97.9)		56	35	64.8 (51.1–76.4)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	118	77.5 (65.9–86.0)		97	91.9 (81.5–96.7)		89	55	60.1 (42.4–75.5)	
негативний	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										

	Каскад: знає про ВІЛ-статус (з усіх ВІЛ+)			Каскад: на АРТ (серед обізнаних)			Каскад: VL<1000 ср/ml (серед тих хто на АРТ)			
	N	% (ДІ)	p-значення	N	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
опіоїди	102	75.2 (62.1–84.9)		85	88.5 (75.1–95.2)		77	51	72.4 (56.6–84.1)	
стимулятори	12	81.1 (50.5–94.7)		8	100.0		8	3	34.1 (8.6–73.9)	
опі+стимул	4	100.0		4	100.0		4	1	31.2 (2.8–87.8)	
інші	0	0.0		0	0.0		0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	106	74.6 (61.8–84.3)		88	89.0 (76.0–95.4)		80	52	71.3 (55.3–83.4)	
стимулятори	11	86.2 (55.0–97.0)		8	100.0		8	3	34.1 (8.6–73.9)	
інші	0			0			0	0		

Таблиця 8.3. Прихильність АРТ

	n	%	ДІ
Коли ви востаннє пропускали дозу АРТ			
минулого тижня	1	0.2	(0.0–1.7)
1-2 тижні тому	2	2.7	(0.5–14.3)
3-4 тижні тому	2	3.5	(0.6–18.4)
1-3 місяці тому	4	2.7	(0.6–11.1)
ніколи	80	90.9	(78.1–96.6)
Що стало причиною пропуску останньої дози АРТ			
забув	7	61.8	(16.3–93.1)
ліків не було	1	34.9	(5.4–83.3)
був під впливом	1	3.3	(0.4–23.4)
не хотів, щоб інші бачили	0	0.0	
інші	0	0.0	
Причини відмови від АРТ			
не впевнений, що це потрібно	4	63.6	(22.2–91.5)
відсутність часу на відвідування клініки	3	6.4	(1.5–22.9)
відсутність мотивації відвідувати клініку	2	30.5	(5.1–78.2)
пропуск візиту, важко повернутися	2	6.1	(1.1–27.0)
занадто хворий, щоб відвідувати клініку	1	2.6	(0.3–19.0)
вживання наркотиків	2	5.9	(1.1–26.0)
побічні ефекти або ускладнення	2	6.1	(1.1–27.0)
немає розуміння як	2	5.9	(1.1–26.0)
втрачено або продано всі АРВ-препарати	2	5.2	(1.0–23.1)
Причини відмови від ДРТ			
вживання алкоголю	2	27.3	(4.6–74.7)
Причини відмови від АРТ			
довго чекав і пішов	1	2.2	(0.3–16.5)

	n	%	ДІ
Час на АРТ			
≤3м	1	3.3	(0.4–23.8)
4-24м	4	87.4	(62.3–96.7)
25-60м	2	3.9	(0.7–18.7)
5 років +	2	5.4	(1.0–24.3)

9. Доконтактна профілактика




Рис 9.1. Застосування ДКП за останні 12 місяців (%)




Рис 9.2. Тенденції в обізнаності та застосуванні ДКП (%)




Рис 9.3. Тенденції в застосуванні ДКП (%)

Таблиця 9.1. Обізнаність щодо ДКП за соціально-демографічними характеристиками

			Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
		N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього											
	Разом	498	10	2.2 (0.7–7.0)	2	0.5 (0.1–1.9)	86	15.7 (11.7–20.8)	400	81.6 (76.1–86.1)	1.0000
Стать											
	чоловік	396	8	0.9 (0.3–3.0)	1	0.3 (0.0–2.4)	70	14.6 (10.3–20.3)	317	84.2 (78.4–88.6)	0.0522
	жінка	102	2	6.3 (1.2–27.1)	1	0.9 (0.1–6.4)	16	19.4 (11.0–32.0)	83	73.3 (58.6–84.2)	
Вікова категорія 4											
	<25	9	0	0.0	0	0.0	1	40.7 (5.4–89.2)	8	59.3 (10.8–94.6)	0.4664
	25-34	91	1	1.3 (0.2–8.6)	0	0.0	15	14.2 (7.1–26.3)	75	84.5 (72.5–91.9)	
	35-44	246	4	1.1 (0.2–5.1)	1	0.5 (0.1–3.2)	40	12.4 (8.1–18.4)	201	86.0 (79.7–90.6)	
	45+	152	5	4.9 (0.9–23.5)	1	0.9 (0.1–6.2)	30	19.8 (12.4–30.1)	116	74.4 (62.1–83.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків											
	≤2	29	0	0.0	0	0.0	1	4.0 (0.5–25.2)	28	96.0 (74.8–99.5)	
	3-5	16	0	0.0	0	0.0	4	40.2 (12.4–76.2)	12	59.8 (23.8–87.6)	

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
6-10	38	1	3.2 (0.4–20.7)	0	0.0	6	12.1 (4.1–30.9)	31	84.7 (65.8–94.1)	
≥11	415	9	2.5 (0.7–8.8)	2	0.6 (0.1–2.4)	75	15.7 (11.6–20.9)	329	81.3 (75.3–86.1)	
Партнерський статус										
живе сам	200	5	0.6 (0.2–1.5)	1	0.7 (0.1–4.9)	23	9.5 (5.2–16.8)	171	89.2 (81.9–93.8)	0.0189
живе з партнером	298	5	3.1 (0.8–11.0)	1	0.3 (0.0–2.4)	63	19.3 (13.8–26.3)	229	77.2 (69.5–83.4)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	149	4	0.6 (0.2–1.5)	0	0.0	29	15.5 (9.0–25.4)	116	84.0 (74.1–90.6)	0.0088
неповний робочий день або тимчасово	225	2	0.6 (0.1–3.1)	0	0.0	38	16.2 (10.6–24.1)	185	83.1 (75.2–88.9)	
безробітний	68	3	3.5 (0.6–17.5)	1	1.6 (0.2–10.9)	10	17.2 (8.1–32.9)	54	77.7 (61.5–88.3)	
інвалідність	39	1	15.8 (2.3–59.9)	1	3.3 (0.4–21.3)	9	16.3 (5.4–39.9)	28	64.6 (36.4–85.3)	
інші	17	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	100.0	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	96	3	3.5 (0.9–12.8)	2	2.3 (0.6–9.1)	20	18.0 (9.9–30.4)	71	76.2 (63.4–85.5)	0.3548
3-10 тис	236	5	2.8 (0.5–14.3)	0	0.0	48	18.6 (12.4–26.9)	183	78.6 (69.4–85.6)	
10-20 тис	94	2	0.4 (0.1–1.6)	0	0.0	13	15.4 (8.3–26.9)	79	84.2 (72.8–91.4)	
≥20 тис	34	0	0.0	0	0.0	5	3.4 (1.2–9.1)	29	96.6 (90.9–98.8)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	328	6	2.3 (0.5–9.7)	1	0.3 (0.0–2.1)	60	15.7 (10.8–22.1)	261	81.7 (74.7–87.2)	0.9014
так	170	4	1.9 (0.4–8.7)	1	0.9 (0.1–6.4)	26	16.0 (9.9–24.7)	139	81.2 (72.1–87.9)	

Таблиця 9.2. Застосування ДКП за соціально-демографічними характеристиками

		Використання ДКП протягом останніх 12 місяців								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав		не знає що це		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	292	4	0.7 (0.1–3.4)	2	0.6 (0.2–2.5)	54	16.6 (11.7–22.9)	232	82.1 (75.8–87.1)	0.0220
так	205	6	6.8 (1.6–24.6)	0	0.0	32	13.3 (7.7–22.0)	167	80.0 (67.2–88.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	293	3	2.1 (0.5–7.8)	2	0.5 (0.1–2.1)	40	15.2 (10.9–20.8)	248	82.2 (76.1–87.0)	0.4254
так	204	7	3.6 (1.6–7.7)	0	0.0	46	22.7 (17.1–29.5)	151	73.8 (66.7–79.8)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	118	10	11.9 (3.8–31.8)	1	1.4 (0.2–9.4)	24	18.2 (10.3–30.1)	83	68.5 (53.3–80.6)	0.0001
негативний	380	0	0.0	1	0.3 (0.0–1.9)	62	15.2 (10.8–21.0)	317	84.5 (78.7–89.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	387	7	0.8 (0.2–2.2)	2	0.7 (0.2–2.9)	69	14.5 (10.3–20.0)	309	84.1 (78.5–88.4)	0.4074
стимулятори	89	1	4.3 (0.6–24.8)	0	0.0	15	20.1 (11.5–32.7)	73	75.7 (61.7–85.7)	
опі+стимул	21	2	10.7 (1.6–46.8)	0	0.0	2	6.8 (1.0–33.9)	17	82.5 (51.5–95.5)	
інші	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	402	9	1.4 (0.5–3.8)	1	0.3 (0.0–2.2)	71	14.2 (10.2–19.6)	321	84.1 (78.6–88.4)	
стимулятори	94	1	4.1 (0.6–24.1)	0	0.0	14	18.6 (10.4–31.0)	79	77.3 (63.5–87.0)	
інші	0	0		0		0		0		

Таблиця 9.3. Обізнаність і сприйняття ДКП

	n	%	ДІ
Використання ДКП протягом останніх 12 місяців			
приймає зараз	10	2.2	(0.7–7.0)
приймав в минулому	2	0.5	(0.1–1.9)
ніколи не приймав	86	15.7	(11.7–20.8)
не знає що це	400	81.6	(76.1–86.1)
Обізнаність про ДКП			
ні	400	81.3	(75.8–85.8)
так	100	18.7	(14.2–24.2)
Використання ДКП зараз			
ні	488	97.8	(93.0–99.3)
так	10	2.2	(0.7–7.0)
Використання ДКП зараз (з тих, хто обізнаний)			
ні	88	88.1	(68.0–96.2)
так	10	11.9	(3.8–32.0)

10. Замісна підтримувальна терапія




Рис 10.1. Обізнаність про ЗПТ (%)




Рис 10.2. Отримання ЗПТ на даний час (%)




Рис 10.3. Тенденції щодо охоплення ЗПТ за раундами дослідження (%)

Таблиця 10.1. Досвід ЗПТ

	n	%	ДІ
Причина припинення ЗПТ			
переїзд в інше місто	1	12.6	(1.7–54.5)
клініка закрита після лютого 2022 року	2	18.9	(4.4–54.4)
слабкий або відсутній ефект	0	0.0	
побічні ефекти	1	15.5	(2.2–60.3)
не хочу відвідувати клініку	1	9.2	(1.2–45.6)
не хочу кидати наркотики	2	19.9	(4.7–55.8)
важко дістатися до клініки	1	12.6	(1.7–54.5)
не потребує	1	20.4	(3.0–67.9)
не подобається ставлення лікаря	1	15.5	(2.2–60.3)
Як змінювалася частота ін'єкційного вживання під час ЗПТ			
підсилилось	0	0.0	
не змінилось	7	66.9	(36.0–87.9)
зменшилося	4	33.1	(12.1–64.0)
Чи купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
так, метадон	306	58.3	(52.5–63.9)
так, бупренорфін	9	1.3	(0.5–3.2)
не купував	184	40.4	(34.9–46.2)
Де купував бупр. або метадон, не будучи пацієнтом протягом останніх 12 місяців			
не купував	184	40.5	(34.9–46.3)
купляв на чорн. ринку	311	59.0	(53.2–64.5)
купляв в приватній клініці	3	0.5	(0.1–2.0)
Спосіб використання бупренорфіну або метадону купленого на чорн.ринку			
ін'єкційно	308	99.0	(97.3–99.6)
ін'єкційно у суміші	1	0.1	(0.0–0.4)
ковтав або розсмоктував	6	0.9	(0.3–2.7)
нюхав	0	0.0	

Таблиця 10.2. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за соціально-демографічними характеристиками

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього										
Разом	499	205	7.8 (6.5–9.3)	13	3.4 (1.9–5.8)	33	9.9 (7.0–13.8)	248	78.9 (74.6–82.6)	1.0000
Стать										
чоловік	397	168	8.5 (7.0–10.3)	10	3.4 (1.8–6.3)	29	11.2 (7.8–15.9)	190	76.9 (71.9–81.3)	0.2834
жінка	102	37	5.6 (3.7–8.5)	3	3.3 (1.0–10.2)	4	5.8 (2.1–15.0)	58	85.3 (76.4–91.2)	
Вікова категорія 4										
<25	9	2	2.3 (0.3–14.6)	0	0.0	0	0.0	7	97.7 (85.4–99.7)	0.3006
25-34	92	27	5.2 (3.2–8.5)	1	1.5 (0.2–10.4)	7	8.8 (4.1–17.7)	57	84.4 (75.5–90.5)	
35-44	246	106	8.7 (6.8–11.2)	4	2.1 (0.7–6.0)	17	10.8 (6.7–17.1)	119	78.3 (71.9–83.6)	
45+	152	70	8.7 (6.3–11.9)	8	7.1 (3.5–13.9)	9	10.3 (5.3–19.0)	65	73.9 (64.7–81.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	29	5	2.6 (0.9–7.4)	0	0.0	3	9.5 (2.8–27.5)	21	87.9 (71.2–95.5)	0.3829
3-5	17	3	2.1 (0.5–8.0)	0	0.0	2	12.0 (2.3–43.8)	12	85.9 (56.3–96.7)	
6-10	38	12	6.8 (3.1–14.4)	0	0.0	1	2.7 (0.4–18.1)	25	90.5 (79.7–95.8)	
≥11	415	185	8.8 (7.3–10.7)	13	4.3 (2.4–7.4)	27	10.6 (7.2–15.2)	190	76.3 (71.3–80.7)	
Партнерський статус										
живе сам	201	87	9.1 (6.9–11.9)	7	4.2 (2.0–8.6)	15	12.6 (7.5–20.4)	92	74.1 (66.4–80.6)	0.3012
живе з партнером	298	118	7.1 (5.6–9.0)	6	2.9 (1.3–6.4)	18	8.4 (5.2–13.1)	156	81.7 (76.4–85.9)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	151	77	13.1 (9.6–17.6)	4	4.2 (1.5–10.9)	12	13.5 (7.7–22.5)	58	69.2 (59.9–77.2)	0.0226

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
неповний робочий день або тимчасово	224	72	5.2 (3.9–6.9)	3	1.1 (0.3–3.3)	15	9.5 (5.6–15.5)	134	84.3 (78.4–88.8)	
безробітний	68	31	8.5 (5.2–13.5)	2	4.2 (1.0–15.8)	2	5.3 (1.3–19.6)	33	82.1 (69.7–90.1)	
інвалідність	39	18	7.6 (3.8–14.5)	3	12.5 (3.7–34.6)	3	9.6 (2.8–28.2)	15	70.3 (48.8–85.4)	
інші	17	7	7.9 (2.9–20.0)	1	9.1 (1.1–48.2)	1	11.2 (1.3–53.9)	8	71.8 (39.5–90.8)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	97	37	6.3 (4.2–9.5)	3	4.1 (1.3–12.2)	5	7.1 (2.9–16.8)	52	82.5 (72.7–89.2)	0.4583
3-10 тис	237	97	7.5 (5.7–9.7)	3	1.2 (0.4–3.8)	15	10.2 (6.1–16.5)	122	81.1 (74.9–86.1)	
10-20 тис	93	39	9.3 (6.1–13.9)	3	3.7 (1.1–11.3)	8	11.6 (5.8–22.0)	43	75.4 (64.7–83.7)	
≥20 тис	34	15	10.0 (5.1–18.5)	1	5.4 (0.7–31.5)	4	19.0 (7.0–42.1)	14	65.6 (44.4–82.0)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	329	124	6.6 (5.2–8.2)	4	1.2 (0.4–3.4)	23	10.1 (6.7–15.1)	178	82.1 (77.1–86.2)	0.0003
так	170	81	11.1 (8.3–14.7)	9	8.9 (4.6–16.6)	10	9.4 (5.1–16.8)	70	70.5 (61.9–77.9)	

Таблиця 10.3. Обізнаність і сприйняття ЗПТ за обраними підгрупами

		Отримував ЗПТ (з усіх)								
	N	приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	294	65	3.4 (2.5–4.5)	11	3.9 (2.1–7.1)	17	6.9 (4.2–11.1)	201	85.8 (81.1–89.4)	0.0000
так	204	139	21.2 (16.3–27.2)	2	1.6 (0.4–6.4)	16	19.1 (11.9–29.3)	47	58.0 (47.7–67.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	294	0	0.0	13	3.7 (2.1–6.3)	33	10.8 (7.6–15.0)	248	85.6 (81.0–89.2)	0.0000
так	205	205	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

	N	Отримував ЗПТ (з усіх) приймає зараз		приймав в минулому		ніколи не приймав, але планує		не знає або не планує		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Результат тесту на ВІЛ										
позитивний	118	65	12.9 (9.0–18.1)	5	6.7 (2.8–15.5)	5	7.2 (2.9–16.5)	43	73.2 (62.6–81.7)	0.0526
негативний	381	140	6.7 (5.4–8.3)	8	2.6 (1.3–5.3)	28	10.5 (7.2–15.1)	205	80.2 (75.4–84.2)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	387	197	11.5 (9.5–13.9)	13	5.1 (2.9–8.8)	27	12.8 (8.8–18.3)	150	70.6 (64.7–75.9)	0.0001
стимулятори	90	3	0.3 (0.1–1.0)	0	0.0	4	3.6 (1.3–9.6)	83	96.1 (90.3–98.5)	
опі+стимул	21	5	3.9 (1.4–10.9)	0	0.0	2	10.3 (2.3–35.7)	14	85.8 (63.5–95.4)	
інші	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання										
опіоїди	402	202	11.2 (9.3–13.5)	12	4.5 (2.5–8.0)	28	12.5 (8.7–17.8)	160	71.7 (66.1–76.8)	
стимулятори	95	3	0.3 (0.1–1.0)	0	0.0	5	4.2 (1.7–10.0)	87	95.5 (89.8–98.1)	
інші	0	0		0		0		0		




Рис 10.4. Купівля препаратів ЗПТ не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.5. Джерело придбання препаратів ЗПТ, не будучи пацієнтом (%)




Рис 10.6. Спосіб використання препаратів ЗПТ, куплених у інших (%)

11. Передозування і Налоксон




Рис 11.1. Досвід передозування будь-коли та протягом останніх 12 місяців (%)




Рис 11.2. Тенденції передозування за останні 12 місяців за раундами дослідження (%)




Рис 11.3. Препарати, що викликають передозування (при застосуванні тільки одного препарату) (%)



Рис 11.4. Застосування налоксону (%)

Таблиця 11.1. Досвід передозування

		n	%	ДІ
Мав передозування коли-небудь				
	так	169	28.7	(24.1–33.9)
Кількість передозувань протягом життя				
	1	66	42.3	(32.9–52.2)
	2-4	71	35.2	(26.5–44.9)
	5+	30	22.6	(15.3–32.0)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	так	18	4.8	(2.8–8.0)
Мав передозування протягом останніх 12 місяців (з тих, що мав колись)				
	так	18	16.6	(10.1–26.2)
Кількість випадків передозування за останні 12 місяців				
	1	10	45.5	(22.2–70.9)

	n	%	ДІ
2-4	7	54.5	(29.1–77.8)
5+	0	0.0	
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо вживав лише один)			
метадон	4	55.1	(20.2–85.6)
інші опіоїди	1	1.8	(0.2–13.3)
стимулятор	3	43.1	(13.4–78.8)
інші	0	0.0	
Наркотики які вживав при пердозуванні (якщо вживав декілька)			
метадон+стимулятор	1	30.2	(4.1–81.4)
метадон+барбіт. або димедр.	1	2.8	(0.3–21.3)
метадон+інше	2	60.4	(16.2–92.3)
інші	2	6.5	(1.2–29.4)
Наркотик який вживав при пердозуванні (якщо поєднував з алкоголем)			
метадон	3	75.1	(23.4–96.7)
інші опіоїди	0	0.0	
стимулятор	1	24.9	(3.3–76.6)
інші	0	0.0	
Знання та досвід налоксону			
ніколи не чув	142	39.4	(33.8–45.2)
знає, але не користувався	324	54.2	(48.4–59.9)
користувався	20	4.5	(2.6–7.6)
користувались друзі	13	1.8	(0.9–3.7)
користувався сам та друзі	1	0.2	(0.0–1.3)

Таблиця 11.2. Досвід передозування за останні 12 місяців за соціально-демографічними характеристиками

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців					
	N	ні		так			
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)		p-значення
Всього							
Разом	500	482	95.2 (92.0–97.2)	18	4.8 (2.8–8.0)		1.0000
Стать							
чоловік	398	382	94.2 (90.1–96.7)	16	5.8 (3.3–9.9)		0.1137
жінка	102	100	98.5 (91.6–99.8)	2	1.5 (0.2–8.4)		
Вікова категорія 4							
<25	9	9	100.0	0	0.0		0.5122
25-34	92	90	98.6 (92.1–99.7)	2	1.4 (0.3–7.9)		
35-44	246	236	94.3 (89.0–97.1)	10	5.7 (2.9–11.0)		
45+	153	147	93.9 (85.4–97.6)	6	6.1 (2.4–14.6)		
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
≤2	29	28	96.8 (78.6–99.6)	1	3.2 (0.4–21.4)		0.7271

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
3-5	17	17	100.0	0	0.0	
6-10	38	36	96.3 (80.8–99.4)	2	3.7 (0.6–19.2)	
≥11	416	401	94.6 (90.7–97.0)	15	5.4 (3.0–9.3)	
Партнерський статус						
живе сам	201	197	97.5 (91.5–99.3)	4	2.5 (0.7–8.5)	0.1838
живе з партнером	299	285	93.9 (89.3–96.6)	14	6.1 (3.4–10.7)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	151	149	99.6 (98.5–99.9)	2	0.4 (0.1–1.5)	0.1976
неповний робочий день або тимчасово	225	215	93.9 (88.5–96.8)	10	6.1 (3.2–11.5)	
безробітний	68	64	92.1 (78.2–97.4)	4	7.9 (2.6–21.8)	
інвалідність	39	37	94.2 (70.4–99.1)	2	5.8 (0.9–29.6)	
інші	17	17	100.0	0	0.0	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	97	93	94.5 (84.2–98.2)	4	5.5 (1.8–15.8)	0.8784
3-10 тис	237	226	94.3 (89.0–97.1)	11	5.7 (2.9–11.0)	
10-20 тис	94	92	97.2 (85.2–99.5)	2	2.8 (0.5–14.8)	
≥20 тис	34	33	94.6 (68.5–99.3)	1	5.4 (0.7–31.5)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	330	322	96.0 (92.0–98.0)	8	4.0 (2.0–8.0)	0.3311
так	170	160	93.3 (85.7–97.0)	10	6.7 (3.0–14.3)	

Таблиця 11.3. Досвід передозування за останні 12 місяців за обраними підгрупами

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	294	282	94.8 (90.7–97.2)	12	5.2 (2.8–9.3)	0.5634
так	205	199	96.3 (90.4–98.7)	6	3.7 (1.3–9.6)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						

		Мав передозування протягом останніх 12 місяців				
	N	ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
ні	294	281	95.0 (91.5–97.1)	13	5.0 (2.9–8.5)	0.2167
так	205	200	97.4 (93.7–98.9)	5	2.6 (1.1–6.3)	
Результат тесту на ВІЛ						
позитивний	118	112	91.9 (80.8–96.8)	6	8.1 (3.2–19.2)	0.2123
негативний	382	370	96.0 (92.5–97.9)	12	4.0 (2.1–7.5)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	388	374	94.9 (90.6–97.2)	14	5.1 (2.8–9.4)	0.7647
стимулятори	90	87	96.7 (89.8–99.0)	3	3.3 (1.0–10.2)	
опі+стимул	21	20	90.2 (51.6–98.8)	1	9.8 (1.2–48.4)	
інші	1	1	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	403	388	94.5 (90.2–97.0)	15	5.5 (3.0–9.8)	
стимулятори	95	92	96.8 (90.1–99.0)	3	3.2 (1.0–9.9)	
інші	0	0		0		

Таблиця 11.4. Досвід налоксону за соціально-демографічними характеристиками

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	500	142	39.4 (33.8–45.2)	337	56.0 (50.1–61.6)	21	4.7 (2.8–7.8)	1.0000
Стать								
чоловік	398	112	38.7 (32.7–45.2)	273	57.7 (51.3–63.9)	13	3.6 (1.8–6.8)	0.2519
жінка	102	30	41.4 (29.0–54.9)	64	50.4 (37.3–63.4)	8	8.3 (3.4–18.8)	
Вікова категорія 4								
<25	9	7	97.7 (85.4–99.7)	2	2.3 (0.3–14.6)	0	0.0	0.0057

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
25-34	92	32	41.9 (30.5–54.3)	58	56.3 (44.0–68.0)	2	1.7 (0.3–9.6)	
35-44	246	64	38.9 (31.1–47.3)	169	54.2 (45.9–62.2)	13	6.9 (3.6–12.7)	
45+	153	39	32.0 (22.9–42.8)	108	64.4 (53.5–73.9)	6	3.6 (1.2–10.0)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	29	17	61.7 (39.1–80.2)	11	30.5 (14.5–53.3)	1	7.7 (1.0–40.5)	0.0007
3-5	17	12	82.5 (53.0–95.2)	5	17.5 (4.8–47.0)	0	0.0	
6-10	38	16	58.8 (39.9–75.4)	21	37.2 (21.6–56.1)	1	3.9 (0.5–24.5)	
≥11	416	97	32.3 (26.5–38.6)	300	63.0 (56.5–69.0)	19	4.8 (2.7–8.2)	
Партнерський статус								
живе сам	201	57	37.0 (28.9–45.9)	135	58.9 (50.0–67.3)	9	4.1 (1.8–9.1)	0.7125
живе з партнером	299	85	40.7 (33.5–48.4)	202	54.2 (46.6–61.7)	12	5.0 (2.5–9.6)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	151	34	30.7 (21.9–41.2)	111	65.7 (55.2–74.9)	6	3.6 (1.3–9.6)	0.0465
неповний робочий день або тимчасово	225	74	42.4 (34.6–50.7)	143	53.5 (45.3–61.5)	8	4.1 (1.7–9.3)	
безробітний	68	23	52.1 (35.7–68.0)	43	41.9 (27.2–58.2)	2	6.0 (1.5–21.6)	
інвалідність	39	4	16.5 (5.8–38.8)	32	76.7 (54.3–90.1)	3	6.8 (1.6–24.3)	
інші	17	7	58.4 (28.2–83.4)	8	29.0 (10.0–59.9)	2	12.6 (1.9–52.1)	
Категорія місячного доходу								

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
<3 тис	97	32	47.6 (34.6–60.8)	60	46.2 (33.7–59.3)	5	6.2 (2.3–15.8)	0.0917
3-10 тис	237	61	34.9 (27.2–43.5)	170	61.4 (52.8–69.4)	6	3.6 (1.4–9.2)	
10-20 тис	94	31	47.0 (34.6–59.8)	56	48.8 (36.4–61.4)	7	4.1 (1.4–11.4)	
≥20 тис	34	5	25.1 (10.6–48.5)	26	59.7 (37.7–78.4)	3	15.2 (4.8–39.0)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	330	109	43.8 (36.9–50.9)	213	53.3 (46.2–60.2)	8	3.0 (1.3–6.8)	0.0072
так	170	33	27.9 (20.0–37.4)	124	63.0 (53.2–71.9)	13	9.1 (4.7–16.8)	

Таблиця 11.5. Досвід налоксону за обраними підгрупами

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								
ні	294	123	46.6 (39.9–53.5)	162	49.6 (42.8–56.3)	9	3.8 (1.9–7.7)	0.0000
так	205	19	17.6 (10.4–28.1)	174	75.2 (64.3–83.5)	12	7.3 (3.4–15.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	294	122	41.7 (35.7–48.0)	159	53.6 (47.3–59.7)	13	4.7 (2.7–8.2)	0.0000
так	205	19	9.9 (6.1–15.5)	178	86.0 (80.0–90.5)	8	4.1 (2.0–8.1)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	118	20	24.0 (14.9–36.3)	90	68.8 (55.9–79.3)	8	7.2 (2.9–16.9)	0.0239
негативний	382	122	42.8 (36.6–49.3)	247	53.1 (46.6–59.4)	13	4.1 (2.1–7.7)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	388	90	35.8 (29.4–42.8)	285	60.6 (53.6–67.2)	13	3.5 (1.7–7.4)	0.0000
стимулятори	90	45	48.8 (37.2–60.5)	43	49.0 (37.3–60.7)	2	2.3 (0.5–9.1)	

		Знання та досвід налоксону (3 категорії)						
	N	не знає		знає, але не користувався		користувався		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
опі+стимул	21	7	31.4 (13.0–58.2)	9	36.8 (17.1–62.1)	5	31.9 (12.2–61.2)	
інші	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	403	94	34.9 (28.7–41.7)	291	59.5 (52.7–66.0)	18	5.6 (3.1–9.8)	
стимулятори	95	48	50.0 (38.7–61.4)	44	47.2 (36.0–58.7)	3	2.7 (0.8–8.9)	
інші	0	0		0		0		

12. Фізичне та психічне здоров'я

Таблиця 12.1. Історія захворювання та лікування

		n	%	ДІ
Хворів на				
	гепатит B	59	6.1	(4.2–8.9)
	гепатит C	215	34.2	(29.0–39.8)
	сифіліс	7	1.4	(0.5–3.6)
	гонорея	13	1.8	(0.8–4.2)
	хламідіоз	1	0.3	(0.0–1.8)
	герпес	20	2.2	(1.2–3.9)
	папіломавірус	2	0.4	(0.1–2.8)
	туберкульоз	26	3.1	(1.8–5.3)
Лікувався від: гепатиту B				
	пролікував успішно	33	45.6	(28.2–64.1)
	пролікувався неуспішно	5	22.2	(9.0–45.1)
	не завершив	2	1.1	(0.3–4.3)
	зараз лікується	2	1.2	(0.3–4.8)
	ніколи не лікувався	17	30.0	(16.0–49.1)
Лікувався від: гепатиту C				
	пролікував успішно	91	48.1	(38.7–57.7)
	пролікувався неуспішно	7	4.0	(1.6–9.8)
	не завершив	2	0.3	(0.1–1.5)
	зараз лікується	7	2.0	(0.6–5.9)
	ніколи не лікувався	108	45.5	(36.4–55.0)
Лікувався від: сифілісу				
	пролікував успішно	6	98.4	(87.1–99.8)
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	0	0.0	
	ніколи не лікувався	1	1.6	(0.2–12.9)
Лікувався від: туберкульоз				
	пролікував успішно	25	99.0	(92.6–99.9)
	пролікувався неуспішно	0	0.0	
	не завершив	0	0.0	
	зараз лікується	1	1.0	(0.1–7.4)

	n	%	ДІ
ніколи не лікувався	0	0.0	

Таблиця 12.2. Показники скринінгу психічного здоров'я

	n	Середнє	ДІ	Медіана	IQR
Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5	4,874	1.2	(1.2–1.2)	1	(1–1)
Результат скринінгу депресії PHQ-9	5,002	2.2	(2.2–2.3)	2	(1–3)
Результат скринінгу тривоги GAD-7	5,002	1.9	(1.9–1.9)	2	(1–2)

Таблиця 12.3. Використання послуг з охорони здоров'я

	n	%	ДІ
Мав проблеми зі здоров'ям, окрім наркотиків, які вимагали медичної допомоги протягом останніх 12 місяців			
так	137	26.1	(21.3–31.5)
Звертався до лікувального закладу на лікування протягом останніх 12 місяців			
так	111	22.2	(17.5–27.7)
Звертався до закладу охорони здоров'я			
первинна медична допомога	88	76.6	(64.6–85.5)
лікарні, ВІЛ-диспансеру	38	42.9	(30.1–56.7)
приватна клініка	1	1.5	(0.2–9.7)
приватна лабораторія	1	0.1	(0.0–1.0)
протитуберкульозного диспансеру	0	0.0	
наркологічний диспансер	0	0.0	
ІПСШ	0	0.0	
швидкої допомоги	4	1.7	(0.4–6.8)
мобільна амбулаторія	1	1.2	(0.2–8.0)
інше	2	0.3	(0.1–1.3)
Останній заклад охорони здоров'я у який звертався			
первинна допомога	77	66.5	(53.5–77.5)
лікарня, ВІЛ-клініка	27	29.3	(19.0–42.2)
приватна клініка	1	1.5	(0.2–9.7)
приватна лабораторія	0	0.0	
протитуберкульозний диспансер	0	0.0	
наркологічна клініка	0	0.0	
ІПСШ клініка	0	0.0	
швидка допомога	2	1.4	(0.3–7.2)
мобільна клініка	1	1.2	(0.2–8.0)
інші	1	0.1	(0.0–1.0)
Отримав необхідну допомогу в закладі охорони здоров'я			
так	103	92.9	(83.0–97.2)
Уклав декларацію з лікарем первинної ланки			
так	439	85.1	(80.7–88.6)
Як часто відвідував лікаря первинної ланки			
двічі на місяць або частіше	22	2.9	(1.6–5.2)
раз на місяць	46	9.1	(6.2–13.3)
3-4 рази в 12 місяців	141	31.6	(25.8–38.0)
тільки один раз	224	56.3	(49.9–62.6)




Рис 12.1. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) (%)




Рис 12.2. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) (%)




Рис 12.3. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) (%)

Таблиця 12.4. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за соціально-демографічними характеристиками

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5					
		N	ні		так		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього							
	Разом	497	441	87.7 (83.8–90.9)	56	12.3 (9.1–16.2)	1.0000
Стать							
	чоловік	395	346	86.1 (81.3–89.8)	49	13.9 (10.2–18.7)	0.1156
	жінка	102	95	93.1 (84.1–97.2)	7	6.9 (2.8–15.9)	
Вікова категорія 4							
	<25	9	6	80.3 (34.8–96.9)	3	19.7 (3.1–65.2)	0.3363
	25-34	92	76	82.3 (70.8–89.8)	16	17.7 (10.2–29.2)	
	35-44	244	219	88.4 (82.5–92.5)	25	11.6 (7.5–17.5)	
	45+	152	140	91.3 (83.9–95.5)	12	8.7 (4.5–16.1)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків							
	≤2	29	22	75.6 (52.6–89.6)	7	24.4 (10.4–47.4)	0.1101
	3-5	17	16	95.9 (71.2–99.5)	1	4.1 (0.5–28.8)	
	6-10	38	32	82.1 (63.0–92.5)	6	17.9 (7.5–37.0)	
	≥11	413	371	89.0 (84.7–92.2)	42	11.0 (7.8–15.3)	
Партнерський статус							

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе сам	198	176	88.6 (81.6–93.2)	22	11.4 (6.8–18.4)	0.7118
живе з партнером	299	265	87.2 (82.0–91.1)	34	12.8 (8.9–18.0)	
Поточний статус зайнятості						
повний робочий день	148	131	87.3 (79.0–92.7)	17	12.7 (7.3–21.0)	0.8299
неповний робочий день або тимчасово	225	200	87.9 (81.9–92.1)	25	12.1 (7.9–18.1)	
безробітний	68	60	85.1 (70.0–93.3)	8	14.9 (6.7–30.0)	
інвалідність	39	36	93.7 (77.4–98.5)	3	6.3 (1.5–22.6)	
інші	17	14	84.4 (52.9–96.3)	3	15.6 (3.7–47.1)	
Категорія місячного доходу						
<3 тис	97	87	89.5 (80.0–94.7)	10	10.5 (5.3–20.0)	0.4853
3-10 тис	237	211	88.2 (82.0–92.5)	26	11.8 (7.5–18.0)	
10-20 тис	91	80	86.9 (76.2–93.2)	11	13.1 (6.8–23.8)	
≥20 тис	34	27	77.3 (55.6–90.2)	7	22.7 (9.8–44.4)	
Був позбавлений волі будь-коли						
ні	328	291	87.3 (82.2–91.0)	37	12.7 (9.0–17.8)	0.6413
так	169	150	89.0 (81.8–93.6)	19	11.0 (6.4–18.2)	

Таблиця 12.5. Ризиковане вживання алкоголю (бал AUDIT-C > 5) за обраними підгрупами

		Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5			
	N	ні		так	
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ						
ні	293	253	86.9 (82.0–90.6)	40	13.1 (9.4–18.0)	0.3746
так	203	187	90.4 (82.3–95.1)	16	9.6 (4.9–17.7)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)						
ні	294	253	87.5 (83.2–90.9)	41	12.5 (9.1–16.8)	0.0391
так	202	188	93.3 (88.8–96.1)	14	6.7 (3.9–11.2)	
Результат тесту на ВІЛ						

	N	Оцінка алкогольного ризику AUDIT-C ≥5				
		ні		так		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	116	110	96.7 (90.2–98.9)	6	3.3 (1.1–9.8)	0.0045
негативний	381	331	85.7 (81.0–89.5)	50	14.3 (10.5–19.0)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії						
опіоїди	385	348	88.9 (84.1–92.3)	37	11.1 (7.7–15.9)	0.6817
стимулятори	90	77	86.2 (76.9–92.2)	13	13.8 (7.8–23.1)	
опі+стимул	21	15	80.0 (56.0–92.6)	6	20.0 (7.4–44.0)	
інші	1	1	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання						
опіоїди	400	360	89.0 (84.4–92.3)	40	11.0 (7.7–15.6)	
стимулятори	95	79	84.8 (75.6–90.9)	16	15.2 (9.1–24.4)	
інші	0	0		0		

Таблиця 12.6. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за соціально-демографічними характеристиками

		N	Результат скринінгу депресії PHQ-9								
			мінімальна		легка		помірна		тяжка		
			n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього											
	Разом	500	213	41.9 (36.4–47.6)	186	33.6 (28.5–39.1)	49	12.7 (8.8–17.9)	52	11.9 (8.7–16.0)	1.0000
Стать											
	чоловік	398	168	41.7 (35.7–48.0)	151	34.9 (29.1–41.2)	37	10.8 (7.0–16.1)	42	12.6 (9.0–17.6)	0.3846
	жінка	102	45	42.6 (30.2–55.9)	35	29.3 (19.5–41.6)	12	18.7 (9.3–34.3)	10	9.3 (4.3–19.1)	
Вікова категорія 4											
	<25	9	5	36.1 (7.4–79.9)	3	23.2 (3.6–70.7)	1	40.7 (5.4–89.2)	0	0.0	0.4292
	25-34	92	42	47.0 (35.2–59.2)	34	35.0 (24.3–47.5)	10	9.1 (4.3–18.0)	6	8.9 (3.7–19.9)	
	35-44	246	97	39.2 (31.7–47.2)	95	33.5 (26.4–41.4)	27	14.9 (9.2–23.2)	27	12.4 (8.0–18.8)	
	45+	153	69	43.4 (32.9–54.6)	54	33.8 (24.4–44.7)	11	8.5 (4.0–17.1)	19	14.2 (8.3–23.4)	

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	29	15	53.1 (32.2–73.0)	8	21.9 (9.7–42.2)	3	14.5 (4.1–40.0)	3	10.5 (2.2–37.7)	0.6186
3-5	17	8	43.6 (17.2–74.2)	5	14.4 (4.1–39.9)	3	30.3 (6.6–73.0)	1	11.6 (1.4–55.3)	
6-10	38	17	44.2 (26.7–63.2)	13	33.6 (18.1–53.7)	5	11.9 (4.3–28.7)	3	10.4 (3.2–28.6)	
≥11	416	173	40.4 (34.4–46.8)	160	36.0 (30.2–42.3)	38	11.4 (7.5–16.9)	45	12.2 (8.7–16.8)	
Партнерський статус										
живе сам	201	85	40.9 (32.6–49.8)	71	32.1 (24.5–40.8)	19	10.6 (6.1–18.0)	26	16.3 (10.4–24.6)	0.3250
живе з партнером	299	128	42.5 (35.3–49.9)	115	34.4 (27.8–41.7)	30	13.8 (8.6–21.4)	26	9.3 (6.0–14.2)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	151	71	51.1 (40.7–61.4)	51	29.6 (20.8–40.2)	17	10.6 (5.8–18.5)	12	8.7 (4.4–16.4)	0.5870
неповний робочий день або тимчасово	225	89	39.5 (32.0–47.5)	96	38.1 (30.7–46.2)	20	12.0 (6.9–20.0)	20	10.3 (6.3–16.4)	
безробітний	68	27	34.0 (20.9–50.1)	20	26.4 (14.8–42.6)	8	18.6 (6.8–41.5)	13	21.0 (10.7–37.2)	
інвалідність	39	17	47.4 (25.1–70.8)	15	28.7 (13.4–51.0)	2	10.5 (2.2–38.4)	5	13.4 (4.3–34.9)	
інші	17	9	30.6 (11.0–61.2)	4	32.5 (10.2–67.2)	2	19.0 (4.2–55.7)	2	17.9 (3.8–54.4)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	97	37	35.1 (24.1–47.9)	29	25.2 (16.2–37.1)	12	18.4 (8.5–35.4)	19	21.3 (12.7–33.4)	0.0281
3-10 тис	237	95	39.4 (31.5–47.9)	106	40.8 (32.9–49.3)	23	12.8 (7.6–20.9)	13	6.9 (3.6–13.0)	
10-20 тис	94	44	49.1 (36.6–61.7)	28	28.1 (17.9–41.3)	8	6.7 (2.8–15.3)	14	16.1 (8.7–27.9)	
≥20 тис	34	19	51.4 (31.0–71.4)	9	21.6 (9.2–42.8)	4	18.3 (6.7–41.2)	2	8.6 (2.0–30.9)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	330	143	43.6 (36.8–50.6)	133	36.2 (29.8–43.1)	32	12.4 (7.7–19.2)	22	7.9 (4.8–12.7)	0.0053

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
так	170	70	37.5 (28.8–47.1)	53	26.8 (19.1–36.1)	17	13.4 (7.7–22.3)	30	22.3 (15.1–31.6)	

Таблиця 12.7. Тяжкість симптомів депресії (PHQ-9) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		p-значення
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	
Всього										
Разом	500	213	41.9 (36.4–47.6)	186	33.6 (28.5–39.1)	49	12.7 (8.8–17.9)	52	11.9 (8.7–16.0)	1.0000
Стать										
чоловік	398	168	41.7 (35.7–48.0)	151	34.9 (29.1–41.2)	37	10.8 (7.0–16.1)	42	12.6 (9.0–17.6)	0.3846
жінка	102	45	42.6 (30.2–55.9)	35	29.3 (19.5–41.6)	12	18.7 (9.3–34.3)	10	9.3 (4.3–19.1)	
Вікова категорія 4										
<25	9	5	36.1 (7.4–79.9)	3	23.2 (3.6–70.7)	1	40.7 (5.4–89.2)	0	0.0	0.4292
25-34	92	42	47.0 (35.2–59.2)	34	35.0 (24.3–47.5)	10	9.1 (4.3–18.0)	6	8.9 (3.7–19.9)	
35-44	246	97	39.2 (31.7–47.2)	95	33.5 (26.4–41.4)	27	14.9 (9.2–23.2)	27	12.4 (8.0–18.8)	
45+	153	69	43.4 (32.9–54.6)	54	33.8 (24.4–44.7)	11	8.5 (4.0–17.1)	19	14.2 (8.3–23.4)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	29	15	53.1 (32.2–73.0)	8	21.9 (9.7–42.2)	3	14.5 (4.1–40.0)	3	10.5 (2.2–37.7)	0.6186
3-5	17	8	43.6 (17.2–74.2)	5	14.4 (4.1–39.9)	3	30.3 (6.6–73.0)	1	11.6 (1.4–55.3)	
6-10	38	17	44.2 (26.7–63.2)	13	33.6 (18.1–53.7)	5	11.9 (4.3–28.7)	3	10.4 (3.2–28.6)	
≥11	416	173	40.4 (34.4–46.8)	160	36.0 (30.2–42.3)	38	11.4 (7.5–16.9)	45	12.2 (8.7–16.8)	
Партнерський статус										
живе сам	201	85	40.9 (32.6–49.8)	71	32.1 (24.5–40.8)	19	10.6 (6.1–18.0)	26	16.3 (10.4–24.6)	0.3250

		Результат скринінгу депресії PHQ-9								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
живе з партнером	299	128	42.5 (35.3–49.9)	115	34.4 (27.8–41.7)	30	13.8 (8.6–21.4)	26	9.3 (6.0–14.2)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	151	71	51.1 (40.7–61.4)	51	29.6 (20.8–40.2)	17	10.6 (5.8–18.5)	12	8.7 (4.4–16.4)	0.5870
неповний робочий день або тимчасово	225	89	39.5 (32.0–47.5)	96	38.1 (30.7–46.2)	20	12.0 (6.9–20.0)	20	10.3 (6.3–16.4)	
безробітний	68	27	34.0 (20.9–50.1)	20	26.4 (14.8–42.6)	8	18.6 (6.8–41.5)	13	21.0 (10.7–37.2)	
інвалідність	39	17	47.4 (25.1–70.8)	15	28.7 (13.4–51.0)	2	10.5 (2.2–38.4)	5	13.4 (4.3–34.9)	
інші	17	9	30.6 (11.0–61.2)	4	32.5 (10.2–67.2)	2	19.0 (4.2–55.7)	2	17.9 (3.8–54.4)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	97	37	35.1 (24.1–47.9)	29	25.2 (16.2–37.1)	12	18.4 (8.5–35.4)	19	21.3 (12.7–33.4)	0.0281
3-10 тис	237	95	39.4 (31.5–47.9)	106	40.8 (32.9–49.3)	23	12.8 (7.6–20.9)	13	6.9 (3.6–13.0)	
10-20 тис	94	44	49.1 (36.6–61.7)	28	28.1 (17.9–41.3)	8	6.7 (2.8–15.3)	14	16.1 (8.7–27.9)	
≥20 тис	34	19	51.4 (31.0–71.4)	9	21.6 (9.2–42.8)	4	18.3 (6.7–41.2)	2	8.6 (2.0–30.9)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	330	143	43.6 (36.8–50.6)	133	36.2 (29.8–43.1)	32	12.4 (7.7–19.2)	22	7.9 (4.8–12.7)	0.0053
так	170	70	37.5 (28.8–47.1)	53	26.8 (19.1–36.1)	17	13.4 (7.7–22.3)	30	22.3 (15.1–31.6)	

Таблиця 12.8. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за соціально-демографічними характеристиками

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Всього										
Разом	500	261	50.3 (44.6–56.1)	193	39.7 (34.2–45.5)	37	8.3 (5.6–12.0)	9	1.7 (0.8–3.6)	1.0000

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Стать										
чоловік	398	207	49.6 (43.3–55.9)	155	40.3 (34.3–46.7)	30	8.3 (5.4–12.5)	6	1.8 (0.8–4.3)	0.9654
жінка	102	54	52.6 (39.4–65.5)	38	37.8 (25.6–51.7)	7	8.2 (3.5–18.2)	3	1.4 (0.3–6.5)	
Вікова категорія 4										
<25	9	6	77.0 (29.4–96.4)	3	23.0 (3.6–70.6)	0	0.0	0	0.0	0.5336
25-34	92	50	49.8 (37.7–61.9)	38	45.5 (33.7–57.9)	3	3.4 (1.1–10.4)	1	1.3 (0.2–8.6)	
35-44	246	129	49.0 (41.0–57.1)	91	37.9 (30.1–46.3)	22	11.6 (7.3–18.1)	4	1.4 (0.4–5.0)	
45+	153	76	50.0 (39.2–60.9)	61	40.4 (30.3–51.4)	12	6.9 (3.0–14.9)	4	2.7 (0.9–7.7)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків										
≤2	29	15	48.9 (28.8–69.4)	11	45.1 (25.4–66.4)	2	5.6 (1.3–21.6)	1	0.4 (0.0–3.1)	0.5885
3-5	17	12	74.5 (41.3–92.4)	4	13.8 (3.8–39.5)	1	11.6 (1.4–55.3)	0	0.0	
6-10	38	22	54.1 (35.2–71.9)	13	35.6 (19.7–55.5)	2	7.2 (1.7–25.6)	1	3.2 (0.4–20.7)	
≥11	416	212	48.5 (42.1–54.9)	165	41.3 (35.1–47.8)	32	8.4 (5.5–12.6)	7	1.8 (0.8–4.2)	
Партнерський статус										
живе сам	201	110	54.2 (45.2–62.9)	72	34.7 (26.8–43.7)	15	9.5 (5.1–16.9)	4	1.6 (0.5–5.3)	0.5439
живе з партнером	299	151	48.1 (40.7–55.6)	121	42.6 (35.3–50.2)	22	7.5 (4.6–12.1)	5	1.8 (0.7–4.6)	
Поточний статус зайнятості										
повний робочий день	151	86	58.3 (47.8–68.2)	55	33.6 (24.4–44.1)	6	4.9 (2.0–11.8)	4	3.2 (1.0–9.1)	0.1347
неповний робочий день або тимчасово	225	113	48.7 (40.6–56.8)	93	41.2 (33.5–49.4)	17	9.6 (5.6–15.8)	2	0.6 (0.1–3.2)	

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
безробітний	68	32	41.4 (26.5–57.9)	27	51.3 (34.9–67.4)	8	7.1 (2.7–17.5)	1	0.3 (0.0–2.1)	
інвалідність	39	22	56.3 (33.0–77.1)	11	27.3 (11.6–51.9)	5	12.4 (3.8–33.5)	1	4.0 (0.5–25.1)	
інші	17	8	39.4 (15.2–70.2)	7	42.8 (16.7–73.5)	1	6.7 (0.8–39.8)	1	11.2 (1.3–53.9)	
Категорія місячного доходу										
<3 тис	97	46	45.0 (32.6–58.0)	33	34.7 (22.6–49.3)	13	14.8 (8.0–25.7)	5	5.5 (2.1–13.8)	0.0087
3-10 тис	237	117	46.9 (38.5–55.4)	106	46.9 (38.6–55.4)	12	5.8 (2.8–11.5)	2	0.5 (0.1–2.8)	
10-20 тис	94	54	60.6 (47.5–72.2)	32	30.1 (19.7–43.0)	7	9.2 (3.9–20.4)	1	0.2 (0.0–1.2)	
≥20 тис	34	23	57.9 (36.5–76.7)	9	33.4 (16.8–55.6)	1	3.2 (0.4–21.1)	1	5.4 (0.7–31.5)	
Був позбавлений волі будь-коли										
ні	330	180	53.8 (46.8–60.8)	127	38.8 (32.1–45.9)	21	7.0 (4.2–11.5)	2	0.4 (0.1–2.3)	0.0038
так	170	81	41.1 (32.1–50.7)	66	42.2 (32.9–52.1)	16	11.5 (6.5–19.5)	7	5.1 (2.2–11.5)	

Таблиця 12.9. Тяжкість симптомів тривоги (GAD-7) за обраними підгрупами

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ										
ні	294	145	48.0 (41.3–54.8)	126	43.6 (36.9–50.4)	18	7.0 (4.3–11.2)	5	1.5 (0.6–3.8)	0.0637
так	205	115	57.3 (46.6–67.4)	67	28.2 (20.0–38.1)	19	12.1 (6.5–21.5)	4	2.4 (0.7–8.2)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)										
ні	294	149	49.8 (43.6–56.0)	114	40.0 (34.1–46.3)	25	8.4 (5.6–12.5)	6	1.8 (0.8–3.9)	0.6311
так	205	111	55.1 (47.6–62.3)	79	37.4 (30.6–44.7)	12	6.3 (3.4–11.3)	3	1.2 (0.4–3.9)	
Результат тесту на ВІЛ										

		Результат скринінгу тривоги GAD-7								
	N	мінімальна		легка		помірна		тяжка		
		n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	n	% (ДІ)	p-значення
позитивний	118	60	50.3 (37.1–63.4)	48	40.4 (28.3–53.8)	8	6.3 (2.3–16.0)	2	3.1 (0.8–11.8)	0.7556
негативний	382	201	50.3 (44.0–56.7)	145	39.6 (33.4–46.0)	29	8.7 (5.7–13.0)	7	1.4 (0.6–3.4)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії										
опіоїди	388	209	51.8 (45.0–58.6)	145	38.0 (31.5–44.9)	25	7.6 (4.5–12.4)	9	2.6 (1.2–5.5)	0.0558
стимулятори	90	45	49.5 (37.8–61.2)	37	42.7 (31.7–54.6)	8	7.8 (3.8–15.4)	0	0.0	
опі+стимул	21	7	36.5 (16.1–63.3)	11	48.7 (24.9–73.1)	3	14.9 (4.3–40.2)	0	0.0	
інші	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін’єкційного вживання										
опіоїди	403	210	49.6 (43.1–56.2)	157	39.8 (33.4–46.6)	27	8.1 (5.0–12.8)	9	2.5 (1.2–5.3)	
стимулятори	95	50	51.9 (40.5–63.1)	35	39.3 (28.8–50.9)	10	8.8 (4.6–16.2)	0	0.0	
інші	0	0		0		0		0		

13. Затримання та ув'язнення

Таблиця 13.1. Досвід затримання та перебування у місцях позбавлення волі

	n	%	ДІ
Затриманий поліцією у 2022 році за			
вживання наркотиків	5	1.1	(0.5–2.7)
збут наркотиків	2	0.4	(0.1–1.6)
зберігання наркотиків	11	2.0	(0.9–4.0)
Затриманий поліцією у 2023 році за			
вживання наркотиків	8	1.3	(0.6–3.0)
збут наркотиків	5	0.5	(0.2–1.7)
зберігання наркотиків	9	1.3	(0.5–3.1)
Був зупинений, затриманий чи заарештований поліцією			
так	233	42.3	(36.9–48.0)
Був позбавлений волі будь-коли			
так	170	27.7	(23.1–32.7)
Тривалість позбавлення волі			
≤6м	16	13.2	(7.7–21.9)
6м-2р	29	13.8	(8.3–22.0)
2-4р	76	45.3	(36.0–54.9)
4 роки +	49	27.7	(20.0–37.1)
Час з останнього позбавлення волі			
≤1 рік	18	12.2	(7.2–20.0)
1-3р	27	17.7	(11.0–27.1)
3-5р	21	13.2	(8.0–21.0)
5-10р	43	19.0	(12.9–27.1)
10 років +	61	37.9	(29.1–47.7)

	n	%	ДІ
Під час позбавлення волі вживав наркотики ін'єкційно			
так	84	45.4	(36.0–55.1)




Рис 13.1. Позбавлення волі протягом життя (%)

14. Стигма

Таблиця 14.1. Досвід стигми

	n	%	ДІ
Відчував себе відстороненим від сімейних заходів через вживання наркотиків			
ні	318	64.1	(58.4–69.4)
так, за останні 6м	34	7.7	(4.8–12.2)
так, але 6+ місяців тому	147	28.2	(23.6–33.4)
Відчував зневагу через вживання наркотиків			
ні	291	58.3	(52.5–63.8)
так, за останні 6м	49	11.7	(8.2–16.5)
так, але 6+ місяців тому	159	30.0	(25.2–35.3)
Був шантажований за вживання наркотиків			
ні	428	86.4	(82.0–89.8)
так, за останні 6м	26	5.4	(3.3–8.8)
так, але 6+ місяців тому	44	8.2	(5.6–11.7)
Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)			
ні	433	86.6	(81.7–90.3)
так	64	13.4	(9.7–18.3)
Коли-небудь зазнавав фізичного насильства			
ні	315	64.2	(58.6–69.3)
так	185	35.8	(30.7–41.4)
Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
ні	156	76.8	(67.8–83.8)
так	29	23.2	(16.2–32.2)
Був свідком фізичного насильства протягом останніх 12 місяців			
ні	438	87.2	(83.1–90.5)

		n	%	ДІ
	так	61	12.8	(9.5–16.9)




Рис 14.1. Стигматизація щодо вживання наркотиків протягом останніх 6 місяців або фізичне насильство протягом 12 місяців (%)

Таблиця 14.2. Стигматизація щодо вживання наркотиків за соціально-демографічними характеристиками

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Всього								
Разом	497	64	13.4 (9.7–18.3)	1.0000	185	29	23.2 (16.2–32.2)	1.0000
Стать								
чоловік	395	53	13.5 (9.6–18.7)	0.9610	146	17	20.5 (13.0–30.8)	0.2735
жінка	102	11	13.2 (5.5–28.4)		39	12	30.8 (16.3–50.5)	
Вікова категорія 4								
<25	9	2	2.3 (0.3–14.6)	0.1216	2	2	100.0	0.1117
25-34	92	19	19.5 (11.4–31.2)		29	5	16.7 (6.4–36.9)	
35-44	245	32	14.6 (9.0–22.9)		101	12	19.3 (10.7–32.3)	
45+	151	11	8.3 (3.8–17.1)		53	10	31.4 (17.5–49.6)	
Років з початку ін'єкційного вживання наркотиків								
≤2	28	7	19.5 (7.1–43.5)	0.7101	10	4	32.3 (9.7–68.0)	0.5896
3-5	17	2	6.7 (0.9–35.5)		5	2	40.2 (8.1–83.8)	

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
6-10	38	6	12.3 (4.0–31.8)		9	1	11.2 (1.4–52.5)	
≥11	414	49	13.4 (9.2–19.1)		161	22	22.2 (14.6–32.3)	
Партнерський статус								
живе сам	201	16	10.1 (5.5–17.8)	0.2269	91	13	25.3 (14.6–40.3)	0.6734
живе з партнером	296	48	15.4 (10.4–22.2)		94	16	21.8 (13.3–33.7)	
Поточний статус зайнятості								
повний робочий день	151	15	7.7 (3.8–15.1)	0.2590	53	4	14.9 (5.7–33.8)	0.0538
неповний робочий день або тимчасово	223	35	14.6 (9.7–21.4)		72	18	32.2 (20.7–46.3)	
безробітний	68	9	22.4 (9.3–44.6)		37	2	13.1 (3.3–39.9)	
інвалідність	38	2	8.0 (1.7–30.4)		15	0	0.0	
інші	17	3	11.6 (2.1–45.1)		8	5	57.2 (17.0–89.7)	
Категорія місячного доходу								
<3 тис	96	15	21.3 (10.8–37.5)	0.0437	35	5	23.4 (9.9–45.7)	0.0859
3-10 тис	235	43	15.6 (10.5–22.5)		67	17	34.6 (22.0–49.8)	
10-20 тис	94	4	3.5 (1.0–11.4)		41	5	13.8 (5.3–31.5)	
≥20 тис	34	1	5.4 (0.7–31.5)		23	1	7.3 (0.9–39.4)	
Був позбавлений волі будь-коли								
ні	329	53	15.2 (10.4–21.5)	0.1399	110	24	29.8 (20.3–41.4)	0.0096
так	168	11	8.8 (4.5–16.5)		75	5	8.7 (3.1–22.2)	

Таблиця 14.3. Стигматизація щодо вживання наркотиків за обраними підгрупами

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
Клієнт НУО по роботі з ЛВНІ								

	Зазнав стигматизації протягом останніх 6 місяців (GAM 6.5)				Протягом останніх 12 місяців зазнавав фізичного насильства (серед тих хто зазнавав колись)			
	N	n	% (ДІ)	p-значення	N	n	% (ДІ)	p-значення
ні	291	51	17.0 (12.2–23.4)	0.0000	81	21	30.1 (20.4–41.9)	0.0224
так	205	13	2.7 (1.3–5.4)		104	8	10.6 (4.1–25.0)	
В даний час отримує ЗПТ (з усіх)								
ні	291	35	13.3 (9.3–18.7)	0.6847	109	24	24.7 (17.1–34.4)	0.0036
так	205	29	14.9 (10.0–21.6)		75	5	7.3 (3.0–16.6)	
Результат тесту на ВІЛ								
позитивний	117	8	6.0 (1.8–18.2)	0.1066	37	2	1.9 (0.4–7.8)	0.0000
негативний	380	56	15.1 (10.8–20.8)		148	27	26.0 (18.1–35.8)	
Ін'єкційне вживання за останні 30 днів 4 категорії								
опіоїди	386	43	10.2 (6.2–16.3)		149	22	23.4 (15.2–34.1)	
стимулятори	90	17	18.4 (11.1–28.9)		25	5	21.3 (8.9–42.8)	
опі+стимул	21	4	28.3 (10.5–57.0)		11	2	27.3 (6.3–68.0)	
інші	0	0	0.0		0	0	0.0	
Тип основного наркотику ін'єкційного вживання								
опіоїди	400	45	10.6 (6.7–16.6)		157	24	24.2 (16.1–34.6)	
стимулятори	95	18	19.0 (11.7–29.4)		27	5	20.4 (8.6–41.3)	
інші	0	0			0	0		

15. Вплив повномасштабної війни

Таблиця 15.1. Міграція з лютого 2022 року

	n	%	ДІ
З лютого 2022 року змінив місце проживання			
так, через війну	88	16.1	(12.5–20.6)
так, з інших причин	1	0.2	(0.0–1.3)
ні	411	83.7	(79.2–87.3)
Куди переїхав з лютого 2022			
невідомо	0	0.0	
інша країна	7	15.0	(7.1–29.2)
інша область	31	30.7	(19.9–44.2)
інше місто	39	40.0	(28.0–53.3)
інший район	10	13.9	(6.6–26.9)
інший будинок	1	0.3	(0.0–2.3)
Де жив до лютого 2022 (якщо змінив місце проживання)			

	n	%	ДІ
та сама область	83	90.4	(74.6–96.8)
інша область	4	4.3	(0.8–20.3)
інша країна	2	5.3	(1.2–20.5)



Рис 15.1. Зміна місця проживання з лютого 2022 року (%)




Рис 15.2. Напрямок міграції за сайтами дослідження (%)



Рис 15.3. Проживання до лютого 2022 року (%)




Рис 15.4. Зміни з лютого 2022 року (%)