

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА СТИЧНИМИ ВОДАМИ В УКРАЇНІ

Аналітична довідка, червень 2026

Епідеміологічний нагляд за вмістом вірусів SARS-CoV-2 та грипу в господарсько-побутових стічних водах здійснюється у 22 областях України (за винятком Донецької та Луганської областей) та місті Києві.

На початку 2026 року проведено перегляд кількості та географічного розміщення точок відбору зразків у межах системи епідеміологічного нагляду. За результатами аналізу визначено 60 точок відбору зразків (рис. 1), що забезпечують оптимальне територіальне покриття та репрезентативність даних. Формування мережі точок відбору здійснювалося з урахуванням епідеміологічної доцільності, чисельності населення, охопленого відповідними системами водовідведення, рівня урбанізації територій, а також наявних інфраструктурних та логістичних можливостей для регулярного відбору та транспортування зразків. У середньому на один регіон припадає 2–3 точки відбору, що дозволяє забезпечити належне просторове представлення епідемічної ситуації та створює передумови для отримання порівнюваних і репрезентативних даних для подальшого аналізу та моніторингу циркуляції патогенів.

Відбір зразків стічних вод здійснюється переважно двічі на тиждень (у понеділок та четвер) з дотриманням сталого часового інтервалу між відборами. Такий підхід забезпечує регулярність спостереження, порівнюваність результатів у динаміці та підвищує достовірність аналізу тенденцій циркуляції вірусів у популяції. Водночас у частини регіонів періодичність відбору адаптована з урахуванням логістичних, інфраструктурних та безпекових умов, що впливають на можливість регулярного транспортування зразків і доступ до об'єктів відбору. Зокрема, у Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській та Полтавській областях відбір зразків здійснюється один раз на тиждень, у Херсонській області - один раз на два тижні. У Запорізькій області протягом травня-червня відбір проводився лише в одній точці, що зумовлено обмеженим доступом до об'єкта та дією безпекових обмежень в умовах воєнного стану.




Рисунок 1. Точки відбору проб стічних вод в Україні, N=60, 2026

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ СТИЧНИХ ВОД

Динаміка реєстрації випадків COVID-19 та результатів виявлення SARS-CoV-2 у пробах стічних вод в Україні у 2024–2026 роках (рис. 2) демонструє чіткий взаємозв'язок між циркуляцією вірусу у популяції та результатами епідеміологічного нагляду за стічними водами. Зростання кількості позитивних проб на SARS-CoV-2 у стічних водах корелювало з подальшим підвищенням рівня захворюваності на COVID-19. При цьому в окремі періоди збільшення кількості позитивних знахідок у стічних водах передувало росту офіційно зареєстрованих випадків, що підтверджує потенціал епідеміологічного нагляду за стічними водами як інструменту раннього виявлення епідемічних змін та додаткового компонента системи епідеміологічного нагляду.

Аналіз динаміки середньої концентрації SARS-CoV-2 у стічних водах України у 2025–2026 роках (рис. 3) також свідчить про високу чутливість системи моніторингу до змін інтенсивності циркуляції збудника. Найвищі показники концентрації вірусу у стічних водах реєструвалися у періоди епідемічного підйому захворюваності на COVID-19, після чого спостерігалось поступове зниження концентрації до низьких рівнів у 2026 році. Стабілізація показників упродовж 2026 року узгоджується зі зниженням активності епідемічного процесу та підтверджує ефективність використання епіднагляду за стічними водами для оцінки тенденцій поширення SARS-CoV-2, підтримки системи раннього попередження та прийняття управлінських рішень у сфері громадського здоров'я.




Рисунок 2. Динаміка реєстрації випадків COVID-19 та результатів виявлення SARS-CoV-2 у пробах стічних вод, Україна, тижні 2024-2026 років




Рисунок 3. Динаміка концентрації вірусу SARS-CoV-2 (середня) у стічних водах, Україна, 27 тиждень 2025 року - 26 тиждень 2026 року

Основні підсумки за червень 2026 року. У червні 2026 року було відібрано та досліджено 460 проб господарсько-побутових стічних вод у 22 областях та місті Києві. Найбільшу кількість проб відібрано у Дніпропетровській (81), Рівненській (36) та Харківській (36) областях, найменшу - у Херсонській (2) та Миколаївській (5) областях (рис. 4). Така варіабельність обсягів відбору зумовлена особливостями

організації моніторингу, логістичними можливостями та безпековою ситуацією в окремих регіонах.




Рисунок 4. Кількість відібраних проб стічних вод у розрізі регіонів України, червень 2026 року

У червні 2026 року позитивні результати на SARS-CoV-2 реєструвалися лише у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Чернівецькій областях (рис. 5). Питома вага позитивних проб серед усіх досліджених зразків становила 3,9% (18 проб), що свідчить про зростання інтенсивності циркуляції вірусу порівняно з попереднім місяцем. Зокрема, у порівнянні з травнем 2026 року кількість позитивних проб збільшилася у 2,6 рази (18 у червні проти 7 у травні). Протягом червня кількість позитивних проб за тиждень варіювала від 2 до 8, при середньому значенні 4,5 проб на тиждень.

Водночас у Харківській та Львівській областях відзначалося локальне зростання кількості позитивних проб, що може вказувати на спорадичну циркуляцію SARS-CoV-2 на окремих територіях. У Черкаській та Чернівецькій областях, навпаки, спостерігалось зменшення кількості позитивних знахідок. У більшості інших регіонів результати лабораторного моніторингу залишалися стабільними без реєстрації позитивних проб або суттєвих змін показників (рис. 6).

Позитивних результатів на віруси грипу А/В у пробах стічних вод у червні 2026 року не виявлено. Для порівняння, у травні було зареєстровано 2 позитивні знахідки у 2 областях (рис. 8). Отримані результати узгоджуються із сезонним спадом активності вірусів грипу та завершенням періоду інтенсивної циркуляції респіраторних вірусних інфекцій.




Рисунок 5. Позитивні проби на наявність вірусу SARS-CoV-2 у розрізі регіонів України, червень 2026 року

Зміни динаміки результативності лабораторного тестування у межах епідеміологічного нагляду за стічними водами характеризувалися наступними тенденціями.

У червні 2026 року позитивні результати на наявність SARS-CoV-2 були зафіксовані у 4 областях, в травні – у 3 областях.

Порівняно з травнем, загальна кількість позитивних проб на SARS-CoV-2 збільшилася в 2,6 разів – з 7 у травні до 18 у червні. Відповідно, питома вага позитивних проб серед усіх відібраних зразків зросла з 1,7% до 3,9%.

У 2 областях (Львівській, Харківській) зафіксовано зростання кількості позитивних проб на SARS-CoV-2.

У 2 областях (Черкаській, Чернівецькій) спостерігалось зменшення кількості позитивних проб на SARS-CoV-2.

Стабільний рівень результативності тестування (без змін у кількості позитивних проб) зберігався у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Київ (рис. 6).

Аналіз тижневої динаміки у 2025-2026 роках показав, що в період із липня до початку вересня 2025 року (27-36 тижні) спостерігалось стале щотижневе зростання

кількості позитивних проб на SARS-CoV-2 – з 30 до 105. Натомість із листопада 2025 року (45 тиждень) до середини квітня 2026 року (16 тиждень) відзначалося поступове зниження цього показника – до 2 позитивних проб. У другій половині квітня 2026 року (17-18 тижні) позитивні проби на SARS-CoV-2 не реєструвалися. У травні 2026 року (19-22 тижні) щотижня реєстрували 1–2 позитивні проби, а в червні 2026 року (23-26 тижні) – від 2 до 8 позитивних проб на тиждень. (рис. 7).

Щодо вірусів грипу А/В, у червні позитивних результатів не виявлено, тоді як у травні було зареєстровано 2 позитивних результати у 2 областях (рис. 8).




Рисунок 6. Динаміка позитивних проб на вірус SARS-CoV-2 у розрізі регіонів між червнем і травнем 2026 року




Рисунок 7. Щотижнева динаміка позитивних проб на вірус SARS-CoV-2 у липні 2025 року – червні 2026 року




Рисунок 8. Динаміка позитивних проб на віруси грипу А/В у розрізі регіонів між червнем і травнем 2026 року

За 6 місяців (січень-червень) 2026 року в Україні відібрано та досліджено 2697 проб стічної води на наявність вірусів SARS-CoV-2, грипу А/В. Динаміка результативності дослідження у розрізі регіонів наведена на рис. 9.

За результатами лабораторного аналізу позитивні проби на SARS-CoV-2 виявлено у 171 зразку, що становить 6,3% від загальної кількості досліджених проб, тоді як у 2526 пробах (93,7%) були негативні результати (концентрація РНК SARS-CoV-2 – «0»).

Водночас позитивні результати на віруси грипу А/В виявлено у 116 зразках, що становить 4,3% від загальної кількості досліджених проб, тоді як 2581 проба (95,7%) мали негативний результат.

Отримані результати свідчать про циркуляцію респіраторних вірусів серед населення та підтверджують ефективність використання епідеміологічного нагляду за стічними водами як додаткового інструменту для моніторингу інтенсивності поширення інфекційних хвороб, раннього виявлення змін епідемічної ситуації та своєчасного реагування на потенційні епідемічні загрози.




Рисунок 9. Динаміка загальної кількості проб та позитивних проб на віруси SARS-CoV-2, грипу А/В за січень-червень 2026 року у розрізі регіонів

У Таблиці 1 представлено результати дослідження проб стічних вод на наявність вірусів SARS-CoV-2 та грипу А/В у розрізі регіонів України за січень-червень 2026 року, включаючи кількість точок відбору, кількість досліджених проб та число позитивних результатів.

Таблиця 1. Результати аналізу проб стічних вод, Україна, січень-червень 2026 року

Області/місто	Кількість точок відбору	Кількість відібраних проб	Позитивні результати (абсолютна кількість) на:	
			SARS-CoV-2	віруси грипу А/В
Вінницька	2	104	0	0
Волинська	3	156	1	3
Дніпропетровська	9	468	9	12
Житомирська	2	96	6	6
Закарпатська	2	104	1	0
Запорізька	2	79	0	1
Івано-Франківська	2	104	0	0
Київська	3	76	0	0
Кіровоградська	2	52	0	0
Львівська	4	103	25	4
Миколаївська	1	25	0	0
Одеська	2	100	0	0
Полтавська	3	78	1	0

Рівненська	4	208	7	5
Сумська	1	52	2	14
Тернопільська	2	104	1	2
Харківська	4	208	90	30
Херсонська	1	12	0	0
Хмельницька	2	104	0	10
Черкаська	2	104	8	9
Чернівецька	2	104	12	2
Чернігівська	3	152	4	18
м. Київ	2	104	4	0
Україна, всього	60	2697	171	116

РЕЗУЛЬТАТИ ГЕНОМНОГО НАГЛЯДУ В ОБ'ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ

За червень 2026 року референс-лабораторією з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» проведено геномне секвенування секвеновано 61 зразків стічної води. За результатами досліджень у зразках сумарно ідентифіковано 218 патогенів. Географічний розподіл виявлених збудників охоплює зразки з таких областей: Житомирська (54), Київська (52), Тернопільська (50), Волинська (22), Миколаївська (16), Харківська (9), Сумська (7), Херсонська (6), Львівська (2)

У досліджений зразках було виявлено широкий спектр вірусів, серед яких найчастіше зустрічалися Astrovirus (58), JC polyomavirus (34), Rotavirus A (31), Norovirus GII (23), Human adenovirus F (22), Mamastrovirus 8 (MAstV8) (21), Rotavirus C (14), BK polyomavirus (7), Aichivirus (3), Adenovirus B1 (2), Adenovirus E4 (2), Human adenovirus D (1).

Отримані результати свідчать про активну циркуляцію збудників кишкових вірусних інфекцій у різних регіонах країни та підтверджують доцільність використання епідеміологічного нагляду за стічними водами як інструменту раннього виявлення та моніторингу циркуляції інфекційних агентів серед населення.




Таблиця 2. Розподіл виявлених вірусів у зразках стічних вод по регіонах України, 01.09.2024 - 01.07.2026


Область, місто	Кількість зразків	Кількість виявлених штамів	з них за окремими вірусами																	
			Adenovirus (B1, E4, F)	Aichivirus	Astrovirus	Chikungunya	Coxsackievirus	Seasonal CoV	Influenza A	Influenza B	Metapneumo-virus	Norovirus (GII, GIV)	Parechovirus	Polyomavirus (BK, JC, 6, 7, Merkel cell isolate R17h)	Poliovirus 1	Rotavirus (A, C)	RSV (A, B)	Salivirus	Sapovirus	SARS-CoV-2
Вінницька	86	248	11	11	70			4	3	2		10		42		59		14		22
Волинська	59	143	12	6	50		3		1			11		35	1	18		2		4
Дніпропетровська	69	186	13	4	59				4	1		4		39		40			1	21
Житомирська	179	402	32	2	142				3			30		81		87				25
Закарпатська	9	17		1	1				1			1		10						3
Запорізька	49	137	4		22				2	1		1		35		23				8
Ів.-Франківська	15	20			10									2		4	1			3
Київська	52	191	22	8	54							8		56		42				1
Кіровоградська	38	99	1	1	35		1		4			4		25		10		2		16
Львівська	50	86	2	6	22	1	1		12					7	1	8				28
Миколаївська	33	74	8	1	34				1			4		9		20				13
Одеська	14	38	1		13				3					2		11				8
Полтавська	36	110	9	2	31				8			11		8		31		4		6
Рівненська	41	127	5	2	28		1					7		41		23	2	4		14
Сумська	9	21	4		9				1			2		3		7				2
Тернопільська	135	320	15	11	135		2	1	9		2	24		111		40	3	1	2	14
Харківська	46	122	8	2	40	1	2		13	2		5		19		23				16
Херсонська	10	16		1	5				2					3		8				3

Хмельницька	28	101	14	2	25	1			7			5		31		1		1		14
Черкаська	94	261	14	8	82		3	8	18	4		8		36		54		5	3	18
Чернівецька	44	123	3	4	26				3	5				21		29	11	5		16
Чернігівська	130	306	3	6	93				7			21	1	68	1	96			1	9
м. Київ	56	184	13	3	50	1			11			13		35		37				21
Україна, всього	1261	3381	194	81	1036	4	13	13	113	15	2	146	1	719	3	671	17	38	7	285


Щотижнева динаміка реєстрації випадків COVID-19 та виявлення SARS-CoV-2 за результатами досліджень проб стічних вод в окремих регіонах України, 21 тиждень 2025 року - 26 тиждень 2026 року




Закарпатська область




Запорізька область




Івано-Франківська область




Київська область




Одеська область




Тернопільська область




Черкаська область



Чернівецька область



Чернігівська область



**Щотижнева динаміка концентрації вірусу SARS-CoV-2 (середня) у стічних водах в окремих регіонах України,
27 тиждень 2025 року – 26 тиждень 2026 року**











