

**Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики
(НТГЕІ)**

ПОЗИЦІЯ № 05-01/2022-1

**Щодо рекомендації МОЗ України стосовно заходів імунізації у
відповідь на спалах поліомієліту**

1. Позиція НТГЕІ щодо рекомендацій стосовно вибору типу вакцини для профілактики поліомієліту під час проведення додаткових заходів імунізації у відповідь на спалах поліомієліту.

- НТГЕІ наголошує на важливості рутинної вакцинації проти поліомієліту відповідно до календаря щеплень чинного в Україні, важливості усунення недоліків щодо рутинної вакцинації проти поліомієліту та інших вакцинокерованих інфекцій, вакцинація для профілактики яких передбачено чинним календарем щеплень.

- НТГЕІ звертається до медичних працівників, публічних персон, батьків та опікунів дітей долучитися до підтримки вакцинації проти поліомієліту в Україні аби кожна дитина була захищена проти поліомієліту. В умовах спалаху поліомієліту в Україні, що зумовлений ВСПВ 2 типу, кожна дитина, яка не отримала профілактичних щеплень проти поліомієліту, ризикує захворіти на паралітичну форму хвороби з незворотніми наслідками - мати пожиттєвий параліч, смерть.

- НТГЕІ вважає, що реєстрація нових випадків виділення ВСПВ 2 типу від осіб, які не є епідеміологічно пов'язаними, є підставою для проведення додаткових заходів імунізації з використанням оральної поліомієлітної вакцини, що містить вірус поліомієліту типу 2. Введення оральної поліомієлітної вакцини, що містить вірус поліомієліту типу 2 дитині, яка підлягає щепленню в рамках додаткової компанії з імунізації, можливе лише після отримання дитиною двох доз інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ). Дози ІПВ, дітям з порушеним календарем щеплень, можуть бути введені з мінімальним інтервалом у 28 днів.

- НТГЕІ рекомендує наступну пріоритезацію в обранні оральної поліомієлітної вакцини, яка містить вірус поліомієліту типу 2, для використання в додаткових заходах імунізації у відповідь на спалах поліомієліту в Україні:

1. моновалентна нова оральна поліомієлітна вакцина типу 2 (nOPV2);
2. тривалентна ОПВ (tOPV);
3. моновалентна оральна поліомієлітна вакцина типу 2 (mOPV2).

- Вакцинація дітей оральною поліомієлітною вакциною, яка містить вірус поліомієліту типу 2, в додаткових заходах імунізації у відповідь на спалах поліомієліту в Україні, можлива лише у дітей, які отримали дві дози ІПВ.