

МОДУЛЬ 3

Профілактика вірусних гепатитів

Тема 3.1

Вакцинація проти вірусного гепатиту В. Попередження передачі від матері до дитини.

Надута-Скринник О.К.

к.мед.н.

незалежний експерт

Ми поговоримо про:

- 1** Роль вакцинації в елімінації гепатиту В
- 2** Особливості щеплення у різних групах відповідно до Національного календаря
- 3** Попередження передачі ВГВ від матері до дитини
- 4** Рекомендації ВООЗ щодо національних стратегій запобігання перинатальної передачі

Комплексний підхід до ліквідації передачі ВГВ

Попередження передачі ВГВ від матері до дитини

Попередження інфікування в дитинстві

Профілактика інфікування підлітків та дорослих

90-95%

Ефективність щеплення проти ВГВ протягом 24 годин
після народження, якщо слідуєть принаймні
ще дві дози вакцини

Групи ризику

- Особи, які часто потребують переливання крові
- Пацієнти на діалізі та після трансплантації
- Люди, що живуть з ВІЛ
- Люди, що перебувають у в'язниці
- Люди, що вживають наркотики ін'єкційно
- Чоловіки, що мають секс із чоловіками
- Особи, що мають секс із різними сексуальними партнерами
- Медичні працівники та інші особи, що мають ризик інфікування під час роботи

**Вакцинації для профілактики гепатиту В
підлягають усі новонароджені**

Стандартна схема щеплення проти ВГВ

0 (перша доба) – 1-6 місяці життя

Мати новонародженого **HBsAg-** (негативна):

2–4–6–18 місяців + КПК, АКДС, ІПВ (ОПВ)
2–4–9 місяців

Мати новонародженого **HBsAg+** (позитивна):

0 (перша доба) + специфічний імуноглобулін проти гепатиту В
(разом, але не пізніше 1 тижня життя)

1–6 місяців життя

Щеплення дітей з порушенням Календаря

Дитина не отримала
щеплення проти гепатиту
1 дозою при народженні



Провести щеплення в
амбулаторних умовах в будь-
якому віці

Вакцинація розпочинається
пізніше 2 місяців життя
комбінованою вакциною



Інтервал між щепленнями 1
місяць

**Вакцинація проти гепатиту В вважається
завершеною при отриманні
щонайменше трьох щеплень.**

Щеплення за станом здоров'я

- хронічні ураження печінки
- трансплантація органів і тканин
- гемодіаліз у дітей
- переливання крові (для реципієнта)

Щеплення за епідемічними показами

- Медичні працівники та студенти навчальних закладів, які контактують з кров'ю, її препаратами та здійснюють парентеральні маніпуляції
- Особи, які контактували з хворими на гепатит В
- Реципієнти донорської крові та її препаратів
- Діти в дитячих будинках та будинках дитини
- Члени родин, у яких є хворі на гепатит В та носії вірусу гепатиту В
- Пацієнти з хронічними захворюваннями печінки
- Пацієнти, які підлягають плановому оперативному втручанню

Попередження передачі від матері до дитини

Первинна серія:

Доза народження

+

Дві-три дози для завершення


Доза для народження

може бути надана навіть **при низькій вазі** при народженні
та **недоношеним дітям**

в цих умовах вона не рахується як частина первинної серії із
трьох доз

Національні стратегії запобігання перинатальній передачі

- Високе та своєчасне охоплення новонароджених
- Кваліфікована медична допомога матері та дитині
- Збільшення кількості дітей народжених в ЗОЗ
- Інформаційно-пропагандистські стратегії забезпечення вакциною немовлят, що народилися поза межами ЗОЗ
- Усунення хибних протипоказань, розвіювання «антивакцинних міфів»



**Охоплення щепленнями проти вірусного гепатиту В дітей до року
3 доза, 2017 рік**