

## Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.07.2018 р.\*

За період 1987-2018 (6 міс.) рр.\* в Україні офіційно зареєстровано 324 434 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 106 642 випадків захворювання на СНІД та 46 579 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

За даними сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ в Україні, за 6 місяців 2018 р. обстежено на ВІЛ-інфекцію 1 248 044 громадян України проти 1 220 385 за 6 місяців 2017 р. Кількість ВІЛ-позитивних результатів за 6 місяців 2018 р. зменшилась до 10 989 проти 11 665 за аналогічний період 2017 року.

Поширеність ВІЛ серед громадян України (код 100) склала 0,88% проти 0,96% за 6 місяців 2017 року. Найвища поширеність ВІЛ встановлена серед таких контингентів осіб, які обстежувались на ВІЛ-інфекцію:

- особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими особами (код 101) (10,7%);
- особи, які перебували у місцях позбавлення волі (код 112) (3,04%);
- особи, обстежені анонімно (код 114) (1,8%);
- особи з клінічними ознаками захворювань (код 113) (1,8%);
- ЛВІН (код 102) (1,09%).

Поширеність ВІЛ серед іноземців та осіб без громадянства (код 200) становила за 6 місяців 2018 р. 0,6% та зменшилась проти показника відповідного періоду 2017 р. (0,8%).

За 6 місяців 2018 р. в Україні відмічається зменшення кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян – взято на облік 8 816 ВІЛ-інфікованих осіб, що на 0,6% нижче, ніж за аналогічний період 2017 р. (8 871 осіб). Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні знизився на 0,5% та склав 20,8 на 100 тис. населення проти 20,9 у відповідний період 2017 р.

Перевищують показник по країні рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва.

Суттєве зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 6 міс. 2018 р., проти відповідного періоду 2017 р., зареєстровано у Чернівецькій (темп приросту +42,8%), Рівненській (темп приросту +25,5%), Вінницькій (темп приросту +22,0%), Закарпатській (темп приросту +18,5%), Хмельницькій (темп приросту +16,1%) областях.

У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції продовжує зростати частка осіб із статевим (гомо- та гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ. За 6 місяців 2018 р. цей показник досяг 65,7% проти 63,7% за відповідний період минулого року та 59,8% за 6 міс 2016 року. Частка осіб, які інфікувались ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, становила 21,0% проти 22,0% у минулому році та 22,2% за 6 міс 2016 року. Актуальність даного шляху зберігається у Харківській, Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях та у м. Києві.

Протягом першого півріччя 2018 р. зареєстровано 4 438 нових випадків СНІДу, у порівнянні з 4 687 випадками за відповідний період минулого року. Рівень захворюваності на СНІД в країні склав 10,5 на 100 тис. населення проти 11,0 за 6 місяців 2017 р.

Зростання рівнів захворюваності на СНІД за 6 місяців 2018 р. проти відповідних показників за аналогічний період минулого року відбулось у 12 регіонах, найвищі темпи зростання зареєстровано у Чернівецькій (темп приросту +141,1%), Рівненській (темп приросту +42,6%), та Закарпатській (темп приросту +40,3%) областях. Перевищують показник по Україні рівні захворюваності на СНІД Одеської, Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей.

У 13 регіонах країни за 6 місяців 2018 р. зареєстровано зниження захворюваності на СНІД, у порівнянні з відповідними показниками минулого року. Найбільш суттєво захворюваність на СНІД знизилась у Запорізькій та Івано-Франківській областях (-34,9% та -33,8%, відповідно).

За 6 місяців 2018 р. зареєстровано 1 571 випадків смерті від СНІДу проти 1 496 випадків за відповідний період минулого року. Показники смертності від СНІДу становили 3,8 та 3,5 на 100 тис. населення, відповідно. Темп зростання показника смертності від СНІДу склав +9,3%.

Збільшення регіональних показників смертності від СНІДу, у порівнянні з відповідними показниками минулого року, відмічається у 12 регіонах. Високі темпи приросту показника смертності від СНІДу зареєстровано у Вінницькій (+170,7%), Чернівецькій (+105,2%), Кіровоградській (+78,3%), Рівненській (+72,2%), Одеській (+31,3%) областях.

Показники смертності від СНІДу у Дніпропетровської, Донецької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей та м. Києва перевищують показник по Україні.

Основною причиною смерті у хворих на СНІД залишається коінфекція ТБ/ВІЛ, яка протягом першого півріччя 2018 р. стала причиною смерті у кожному другому випадку смерті від СНІДу (801 померлих; 51,0% від загальної кількості померлих від СНІДу – 1571 хворих).

Станом на 01.07.2018 р., у ЗОЗ служби СНІДу під медичним наглядом перебувало 144 268 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 45 792 хворих з діагнозом СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції становив 340,1 на 100 тис. населення що на 2,1% вище показника за відповідний період минулого року (333,3). Показник поширеності СНІДу становив 108,0 на 100 тис. населення та зріс проти показника відповідного періоду минулого року (98,1) на 4,5%. Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались в Одеській (914,2 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (851,3), Миколаївській (780,5), Київській (429,5), Херсонській (421,5), Чернігівській (403,9), Донецькій (330,8) областях та у м. Києві (467,2).

*\*без урахування статистичних даних АР Крим з 2014 року та частини території проведення антитерористичної операції з 2015 року*