


## Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні станом на 01.10.2016 року<sup>1</sup>

За період 1987-2016 (9 міс.) рр. серед громадян України зареєстровано 292 153 ВІЛ-інфіковані особи, у тому числі 90 095 випадків захворювання на СНІД та 40 554 випадки смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

Станом на 01.10.2016 р., у ЗОЗ служби профілактики та боротьби зі СНІДом під медичним наглядом перебувало 132 714 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 37 912 хворих з діагнозом СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції становив 312,4 на 100 тис. населення та на 4,6% був вище інтенсивного показника за відповідний період минулого року (298,7). Показник поширеності СНІДу становив 89,2 на 100 тис. населення та зріс проти показника відповідного періоду минулого року (77,4) на 15,3%.


Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у Одеській (865,8 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (797,5), Миколаївській (713,8), Херсонській (392,7) областях та м. Києві (432,6) (рис. 1).



**Рисунок 1.** Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу за даними медичного нагляду по регіонах України станом на 01.10.2016 р. (в показниках на 100 тис. населення)

<sup>1</sup> Офіційні дані про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені ВІЛ, по Україні не містять статистичні дані тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь з 2014 року та частини території проведення антитерористичної операції з 2015 року.

За 9 місяців 2016 р. в Україні відмічається незначне зростання кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян – взято на облік 11 795 ВІЛ-інфікованих осіб, що на 1% більше, ніж за аналогічний період 2015 р. (11 680 осіб). Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні зріс на 1,4% та склав 27,6 на 100 тис. населення проти 27,2 у відповідний період 2015 р. (рис. 2).



**Рисунок 2.** Захворюваність на ВІЛ-інфекцію по регіонах України за 9 місяців 2015 р. та 9 місяців 2016 р. (в показниках на 100 тис. населення)

Перевищують середній показник по країні рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Київській, Херсонській, Черкаській областях та м. Києві.

У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції частка осіб із статевим (гомо- та гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ зросла (темп приросту +1,4%). За 9 місяців 2016 р. цей показник досяг 60,2% проти 59,4% за відповідний період минулого року. Зокрема, питома вага осіб, інфікованих гомосексуальним шляхом, склала за 9 місяців 2016 р. 2,7% проти 2,2%, відповідно (темп приросту +19,5%). Частка осіб, які інфікувались ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, зросла та склала 21,7% проти 21,0% у минулому році (темп приросту +3,4%).

Протягом 9 місяців 2016 р. зареєстровано 6 050 нових випадків СНІДу проти 6 237 випадків за відповідний період минулого року (темپ зниження -3,0%). Рівень захворюваності на СНІД в країні склав 14,2 на 100 тис. населення та знизився на 2,6% проти показника відповідного періоду 2015 р. (14,5).

У 13 регіонах за 9 місяців 2016 р. зареєстровано зниження рівнів захворюваності на СНІД, у порівнянні з відповідними показниками минулого року. Найбільш суттєво захворюваність на СНІД знизилась у Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Чернівецькій областях. Значне зниження даного показника за 9 місяців 2016 р. у Луганській області обумовлене відсутністю даних від частини території проведення АТО. Зниження захворюваності на СНІД у Івано-Франківській області зареєстровано внаслідок некоректного звітування.

Зростання рівнів захворюваності на СНІД за 9 місяців 2016 р. проти відповідних показників за аналогічний період минулого року відбулось у 11 регіонах. Перевищують середній показник по Україні показники захворюваності на СНІД Одеської, Дніпропетровської, Миколаївської, Київської, Запорізької, Чернігівської та Черкаської областей.

За 9 місяців 2016 р. зареєстровано 2 097 випадків смерті від СНІДу проти 2 168 випадків за відповідний період минулого року (темپ зниження -3,3%). Показники смертності від СНІДу становили 4,9 та 5,1 на 100 тис. населення, відповідно. Темп зниження показника смертності від СНІДу склав -2,9%.

Разом з тим, у 12 регіонах відмічається збільшення регіональних показників смертності від СНІДу, у порівнянні з відповідними показниками минулого року. Високі темпи приросту показника смертності від СНІДу зареєстровано у Донецькій (+30,5%), Київській (+25,9%), Кіровоградській (+28,1%), Рівненській (+23,5%), Сумській (+228%) та Херсонській (+49%) областях. Показники смертності від СНІДу Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Чернігівської областей перевищують середній показник по Україні.

Аналіз причин смерті ВІЛ-інфікованих осіб за 9 місяців 2016 р. показав, що серед усіх 3 453 померлих, найбільше хворих (2 157 померлих; 62,5%) померло за причинами, безпосередньо пов'язаними з ВІЛ-інфекцією, з них 97,2% (2 097 осіб) померли від СНІДу.

Серед інших летальних випадків, не пов'язаних з ВІЛ-інфекцією (1273 померлих; 36,9%): внаслідок ТБ, не пов'язаного з ВІЛ-інфекцією (63 випадки; 5%), від вірусних гепатитів В/С та цирозу печінки вірусної етіології (203; 15,9%), внаслідок інших захворювань (803; 63,1%) та інших причин (204; 16%). Причини смерті 23 померлих (0,6%) залишились невідомими.

Основною ко-інфекцією та причиною смерті у хворих на СНІД залишається ТБ, який протягом 9 місяців 2016 р. став причиною смерті у кожному другому випадку смерті від СНІДу (1 045 померлих; 50% від кількості померлих від СНІДу).

Частка ЛВІН серед померлих осіб з ВІЛ-позитивним статусом склала 41,8%. Померло 40 дітей з діагнозом ВІЛ-інфекції віком до 14 років.