


## Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.10.2017 р.\*

За період 1987-2017 (9 міс.) рр серед громадян України зареєстровано 310 680 ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі 99 694 з діагнозом СНІДу, 43 958 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

Станом на 01.10.2017 р., у ЗОЗ служби СНІДу під медичним наглядом перебувало 139 394 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 42 666 хворих з діагнозом СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції становив 329,6 на 100 тис. населення та на 5,5% був вище інтенсивного показника за відповідний період минулого року (312,4). Показник поширеності СНІДу становив 100,9 на 100 тис. населення та зріс проти показника відповідного періоду минулого року (89,2) на 13,1%. Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у Одеській (876,4 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (841,6), Миколаївській (767,4), Херсонській (416,2), Київській (396,8), Чернігівській (390,2) областях та у м. Києві (435,6) (рис.).



**Рисунок.** Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу за даними медичного нагляду по регіонах України станом на 01.10.2017 р.

За 9 місяців 2017 р. в Україні відмічається зростання кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян – взято на облік 13 256 ВІЛ-інфікованих осіб, що на 12,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 р. (11 795 осіб). Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні зріс на 12,9% та склав 31,2 на 100 тис. населення проти 27,6 у відповідний період 2016 р.

Перевищують середній показник по країні рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва.

Суттєве зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 9 міс. 2017 р., проти відповідного періоду 2016 р., зареєстровано у Вінницькій (темپ приросту +40,0%), Дніпропетровській (+44,7%), Кіровоградській (+40,7%) та Хмельницькій (+36,2%) областях.

У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції продовжує зростати частка осіб із статевим (гомо- та гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ. За 9 місяців 2017 р. цей показник досяг 63,5% проти 60,2% за відповідний період минулого року. Частка осіб, які інфікувались ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, становила 21,5%.

Протягом 9 місяців 2017 р. зареєстровано 6 797 нових випадків СНІДу, у порівнянні з 6 050 випадками за відповідний період минулого року. Рівень захворюваності на СНІД в країні зріс на 12,8% та склав 16,0 на 100 тис. населення проти відповідного показника за 9 місяців 2016 р. (14,2). Зростання рівнів захворюваності на СНІД за 9 місяців 2017 р. проти відповідних показників за аналогічний період минулого року відбулось у 14 регіонах, найвищі темпи зростання зареєстровано у Херсонській та Львівській областях (+74,7% та +53,4%, відповідно). Перевищують середній показник по Україні показники захворюваності на СНІД Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. У Тернопільській та Чернівецькій областях зареєстровано суттєве зниження захворюваності на СНІД (-61,3% та -41,8%, відповідно).

За 9 місяців 2017 р. зареєстровано 2 248 випадків смерті від СНІДу проти 2 097 випадків за відповідний період минулого року. Показники смертності від СНІДу становили 5,3 на 100 тис. населення та 4,9, відповідно. Темп зростання показника смертності від СНІДу склав 7,7%.

Збільшення регіональних показників смертності від СНІДу, у порівнянні з відповідними показниками минулого року, відмічається у 16 регіонах країни. Високі темпи приросту показника смертності від СНІДу зареєстровано у Закарпатській (55,6%), Одеській (60,7%), Сумській (62,9%), Харківській (39,8%) областях та м. Києві (38,1%).

Показники смертності від СНІДу Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей та м. Києва перевищують середній показник по Україні.

Основною ко-інфекцією та причиною смерті у хворих на СНІД залишається ТБ, який протягом 9 місяців 2017 р. став причиною смерті у кожному другому випадку смерті від СНІДу (1 145 померлих; 50,9% від кількості померлих від СНІДу).

*\*без урахування статистичних даних АР Крим з 2014 року та частини території проведення антитерористичної операції з 2015 року*