

# **Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)**

## **ПОЗИЦІЯ № 11-04/2024-1**

**(офіційна заява, згідно з протокольним рішенням НТГЕІ від 11.04.2024 року  
№ 32)**

### **Щодо рекомендації МОЗ України з вакцинації проти COVID-19 в Україні.**

**Дані рекомендації НТГЕІ мають рекомендований характер**

- НТГЕІ зауважує, що головною метою вакцинації та введення бустерних доз вакцини проти COVID-19 залишається попередження тяжких випадків COVID-19, особливо серед визначених груп ризику, захист системи охорони здоров'я. Тому НТГЕІ наголошує на важливості вакцинації раніше не вакцинованих осіб, які належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.
- Первинна вакцинація проти COVID-19 - курс щеплення, що передбачає отримання однієї дози вакцини проти COVID-19 для вакцин на векторній чи мРНК платформі, двох доз - при використанні вакцин на платформі інактивованого вірусу (за гомо/гетерологічною схемою). Додаткова доза вакцини проти COVID-19, що рекомендована для окремих груп осіб, зараховується до первинної вакцинації.
- Для первинної вакцинації та ревакцинації (бустерних доз) може бути використана будь-яка з доступних вакцин проти COVID-19. При наявності вибору вакцини, перевагу надавати вакцині, що адаптована під варіант Omicron з пріоритезацією осіб, які належать до групи високого пріоритету.
- Вважати дані рекомендації як тимчасові і такі, що можуть бути змінені у випадку надходження оновлених даних.

<b>Групи ВИСОКОГО пріоритету</b>		
<b>Цільова група населення</b>	<b>Вакцинація нещеплених проти COVID-19 осіб</b>	<b>Ревакцинація осіб, які отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19</b>
<p>Особи віком понад 75 років</p> <p>Особи літнього віку (понад 60 років) з супутніми станами, що підвищують ризик важкого перебігу COVID-19</p>	<p>Одноразове введення вакцини.</p> <p>При застосуванні інактивованих вірусних вакцин проти COVID-19 в рамках первинної серії імунізації необхідно введення двох доз.</p>	<p>Через 6-12 міс. після введення попередньої дози вакцини</p>
<p>Особи віком понад 60 років</p> <p>Інші дорослі з важкої формою ожиріння або супутніми станами, що підвищують ризик важкого перебігу COVID-19</p>	<p>Одноразове введення вакцини.</p> <p>При застосуванні інактивованих вірусних вакцин проти COVID-19 в рамках первинної серії імунізації необхідно введення двох доз вакцин.</p>	<p>Через 12 міс. після введення попередньої дози вакцини, але може бути введена раніше за бажанням особи при відсутності дефіциту вакцини для щеплення інших осіб віком понад 75 років, вагітних, осіб з тяжкою імуносупресією; інтервал до введення наступної бустерної дози має складати щонайменше 6 місяців від введення попередньої дози вакцини</p>

<b>Групи ПОМІРНОГО пріоритету</b>		
<b>Цільова група населення</b>	<b>Вакцинація нещеплених проти COVID-19 осіб</b>	<b>Ревакцинація осіб, які отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19</b>
<p>Здорові дорослі</p> <p>Діти у віці від 6 міс. до 17 років з ожирінням важкого ступеня або з супутніми станами, що підвищують ризик важкого перебігу COVID-19</p>	<p>Одноразове введення вакцини</p> <p>При застосуванні інактивованих вакцин проти COVID-19 в рамках первинної серії імунізації необхідно введення двох доз.</p>	<p>Не рекомендується в рамках рутинної вакцинації, але може бути введена за бажанням особи при відсутності дефіциту вакцини для щеплення інших осіб віком понад 75 років, вагітних, осіб з тяжкою імуносупресією; інтервал до введення наступної бустерної дози має складати щонайменше 6 місяців від введення попередньої дози вакцини.</p>

<b>Групи НИЗЬКОГО пріоритету</b>		
<b>Цільова група населення</b>	<b>Вакцинація нещеплених проти COVID-19 осіб</b>	<b>Ревакцинація осіб, які отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19</b>
Здорові діти віком від 6 міс. до 17 років	Дітям у віці 5 років і старше рекомендується одноразова вакцинація; дітям в віці від 6 міс. до 4 років рекомендується введення двох доз вакцини	Не рекомендується в рамках рутинної вакцинації але може бути введена за бажанням особи при відсутності дефіциту вакцини для щеплення інших осіб віком понад 75 років, вагітних, осіб з тяжкою імуносупресією; інтервал до введення наступної бустерної дози має складати щонайменше 6 місяців від введення попередньої дози вакцини.

<b>Підгрупи населення, мають певні передумови до проведенню вакцинації</b>		
<b>Цільова група населення</b>	<b>Імунізація нещеплених проти COVID-19 осіб</b>	<b>Ревакцинація осіб, які отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19</b>
Особи з помірними або важкими імунодефіцитними станами (дорослі і діти віком понад 6 міс.)	Введення однієї або двох доз вакцини, що передбачено інструкцією вакцини до використання для первинної вакцинації, з введенням додаткової дози вакцини	Через 6-12 міс. після введення попередньої дози; оптимальний інтервал залежить від пори року - введення бустерної дози оптимально здійснити перед початком сезону зростання захворюваності на COVID-19.
Вагітні	Одноразова вакцинація протягом кожної вагітності незалежно від попередньою історії вакцинації; оптимально вакцинацію варто провести в другому триместрі вагітності, інакше вакцинація може бути проведена в будь-якому триместрі вагітності	
Працівники охорони здоров'я, які безпосередньо контактують з пацієнтами	Одноразова вакцинація	Через 12 міс. після введення попередньої дози, але може бути введена раніше за бажанням особи при відсутності дефіциту вакцини для щеплення інших осіб віком понад 75 років, вагітних, осіб з тяжкою імуносупресією; інтервал до введення бустерної дози має складати щонайменше 6 місяців від введення попередньої дози вакцини