

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

ПОЗИЦІЯ № 19-01/2024-2

(офіційна заява, згідно з протокольним рішенням НТГЕІ від 19.01.2024 року № 31)

Щодо рекомендації МОЗ України стосовно заходів з імунопрофілактики.

Дані рекомендації НТГЕІ мають рекомендований характер.

Рекомендації НТГЕІ щодо оцінки епідеміологічної доцільності та економічної ефективності введення до календаря профілактичних щеплень як обов'язкових за віком в умовах України щеплень від папіломавірусної інфекції

- НТГЕІ вважає, що впровадження до Національної програми імунопрофілактики універсальної вакцинації проти ВПЛ інфекції сприятиме зменшенню тягаря раку шийки матки, а також інших патологій, що асоційовані з вакцинними серотипами ВПЛ.
- НТГЕІ рекомендує визначити цільовою групою для впровадження універсальної вакцинації проти ВПЛ інфекції дівчат віком 12-13 років.
- НТГЕІ вважає, що наразі є переконливі докази подібної ефективності одноступінчастої схеми вакцинації проти ВПЛ інфекції серед осіб віком до 15 років при порівнянні з дводозною схемою вакцинації. НТГЕІ вважає малоімовірним, що погляди щодо одноступінчастої схеми вакцинації зміняться в найближчі кілька років.
- НТГЕІ наголошує, що в умовах обмежених ресурсів перевагу необхідно надавати першочерговій вакцинації проти ВПЛ інфекції дівчатам, які живуть з ВІЛ та дітям з історією сексуального насильства. В останньому випадку вакцину проти ВПЛ слід вводити якомога раніше, починаючи з 9 років. Вакцинація дівчат, які живуть з ВІЛ, має проводитися за тридозною схемою.
- При достатніх ресурсах вакцинація проти ВПЛ-інфекції може бути поширена на хлопчиків та дівчат віком понад ≥ 15 років.
- Дана позиція є тимчасовою і може бути змінена після додаткової консультації та оцінки ефективності програм вакцинації проти ВПЛ інфекції в країнах, які вже впровадили вакцинацію проти ВПЛ інфекції, також з урахуванням надходження додаткових даних щодо ресурсної можливості впровадження вакцинації проти ВПЛ інфекції в Україні.